

ΕΡΓΟ:

Έργο Αγωγού EastMed



Τίτλος Εγγράφου:	Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων
Υπότιτλος Εγγράφου	Παράρτημα 8Η- Μελέτη Βάσης για την Πανίδα
Αρ. εγγράφου Έργου:	PERM-GREE-ESIA-A08_0012_0_Annex8G

	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED		 	
	Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων		Αρ. Εγγρ: PERM-GREE-ESIA-A08_0012_0_Annex8G Αναθ. : 00 Σελ.: 2 από 106	

Στοιχεία εγγράφου	
Τίτλος Εγγράφου	Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων
Υπότιτλος Εγγράφου	Παράρτημα 8Η - Μελέτη Βάσης για την Πανίδα
Εταιρεία	IGI Poseidon
Συγγραφέας	Ecomed
Έργο	Εργο Αγωγού EastMed
Αριθμός Εγγράφου Έργου	PERM-GREE-ESIA-A08_0012_0_Annex8G
Ημερομηνία	03/06/2022
Αναθεώρηση	00

Ιστορικό εγγράφου					
Αναθεώρηση	Συντάκτης	Έλεγχος από	Έγκριση από	Ημερομηνία	Έκδοση
00	ECOMED	ASPROFOS, ERM	IGI POSEIDON	03/06/2022	Για υποβολή στις Υπηρεσίες

Για τον Φορέα του Έργου

Digitally signed by: RESTELLI MATTEO
Location: Milan
Date: 07/06/2022 17:02:51





Digitally signed by
Michail Folas
Date: 2022.06.07
19:42:15 +03'00'

Για τον Περιβαλλοντικό Μελετητή

Signed by DANIELE ZOLI

Date: 06/06/2022 14:32:54 UTC



FILIPPOS
MARKOS
SPANIDIS

Digitally signed by FILIPPOS
MARKOS SPANIDIS
DN: cn=FILIPPOS MARKOS
SPANIDIS, c=GR,
email=pspani@asprofos.gr
Date: 2022.06.03 14:38:43 +03'00'

dimitrios
hourmouziadis

Digitally signed by dimitrios
hourmouziadis
DN: cn=dimitrios hourmouziadis,
c=GR,
email=dhourmouziadis@asprofos.gr
Date: 2022.06.03 14:03:51 +03'00'

GEORGIOS
VALAIS

Digitally signed by GEORGIOS
VALAIS
DN: cn=GEORGIOS VALAIS,
c=GR, email=gvalais@asprofos.gr
Date: 2022.06.03 13:13:18 +03'00'

Παράρτημα 8Η- Μελέτη Βάσης για την Πανίδα

	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED	 	
		Αρ. Εγγρ: PERM-GREE-ESIA-A08_0012_0 Annex8G	
	Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων	Αναθ. : 00	
		Σελ.: 3 από 106	

Πίνακας περιεχομένων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 Η ΜΕΛΕΤΗ ΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΙΔΑ.....	5
8 Η.1. Μεθοδολογία για τους Πίνακες των Ειδών	6
8 Η.1.1. Πανίδα (Είδη θηλαστικών, αμφιβίων και ερπετών)	6
8 Η.1.2. Πληθυσμοί ψαριών	6
8 Η.1.3. Ασπόνδυλα	7
8 Η.2. Αποτελέσματα	9

Κατάλογος πινάκων

Πίνακας Η-1 Είδη θηλαστικών, αμφιβίων και ερπετών που υπάρχουν και αναμένονται στην περιοχή μελέτης	10
Πίνακας Η-2 Είδη ψαριών του γλυκού νερού που υπάρχουν και αναμένονται στην Περιοχή μελέτης	51
Πίνακας Η-3 Θαλάσσια είδη ψαριών που υπάρχουν και αναμένονται στην Περιοχή μελέτης	58
Πίνακας Η-4 Ασπόνδυλα που υπάρχουν και αναμένονται στην Περιοχή μελέτης	99

	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων	  Αρ. Εγγρ: PERM-GREE-ESIA- A08_0012_0 Annex8G Αναθ. : 00 Σελ.: 4 από 106
---	--	--

Ακρωνύμια

Ακρωνύμιο	Περιγραφή
CITES	Σύμβαση για το Διεθνές Εμπόριο των Ειδών της Άγριας Πανίδας και Χλωρίδας που Κινδυνεύουν με Εξαφάνιση (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)
DMS	Λεπτομερής Θαλάσσια Έρευνα (Detail Marine Survey)
Eionet	Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πληροφοριών και Παρατηρήσεων για το Περιβάλλον (European Environment Information and Observation Network)
EMODnet	Ευρωπαϊκό Δίκτυο Θαλάσσιων Παρατηρήσεων και Δεδομένων
GBIF	Παγκόσμιος Μηχανισμός Πληροφοριών για τη Βιοποικιλότητα (Global Biodiversity Information Facility)
ΦΕΚ	Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως
IUCN	Διεθνής Ένωση Προστασίας της Φύσης (International Union for Conservation of Nature)
LF	Θέση Προσאיγιάλωσης (LandFall)
ΠΔ	Προεδρικό Διάταγμα
RAC/SPA	Regional Activity Centre for Specially Protected Areas

 IGI Poseidon	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED	 
	Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων	Αρ. Εγγρ: PERM-GREE-ESIA- A08_0012_0 Annex8G Αναθ. : 00 Σελ.: 5 από 106

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 Η ΜΕΛΕΤΗ ΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΙΔΑ

	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED	 	
	Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων	Αρ. Εγγρ: PERM-GREE-ESIA- A08_0012_0 Annex8G	Αναθ. : 00 Σελ.: 6 από 106

8 Η.1. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ

8 Η.1.1. Πανίδα (Είδη θηλαστικών, αμφίβιων και ερπετών)

Κατάλογος ειδών:

Χρησιμοποιήθηκαν οι ακόλουθες βάσεις δεδομένων και αναφορές:

- 4η Εθνική Έκθεση για την κατάσταση διατήρησης και τις τάσεις για όλους τους ελληνικούς τύπους οικοτόπων και ειδών που απαριθμούνται στα παραρτήματα (I, II, IV, V) της οδηγίας για τους οικοτόπους (92/43/ΕΟΚ)
- Παγκόσμιος Μηχανισμός Πληροφοριών για τη Βιοποικιλότητα (GBIF)
- Κατάλληλες Εκτιμήσεις
- Κεντρικό αποθετήριο δεδομένων Eionet και
- Πηγές από RAC/SPA, IUCN, MAVA.

Κατάσταση προστασίας:

Για την οριοθέτηση του καθεστώτος προστασίας και απειλής θα τηρηθεί η πρόβλεψη της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας. Όλα τα είδη θα ταξινομηθούν σε κατηγορίες προστασίας με βάση τη συμπερίληψή τους: α) στα παραρτήματα της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, β) στην Κόκκινη Λίστα Απειλούμενων Ειδών της IUCN, γ) στη Σύμβαση της Βέρνης για τη διατήρηση της ευρωπαϊκής άγριας ζωής και των φυσικών οικοτόπων, δ) στη Σύμβαση της Βόννης για τη διατήρηση των αποδημητικών ειδών της άγριας πανίδας, ε) στο Προεδρικό Διάταγμα 67/1981 και στ) στη Σύμβαση για το Διεθνές Εμπόριο των Ειδών της Άγριας Πανίδας και Χλωρίδας που Κινδυνεύουν με Εξαφάνιση (CITES)

8 Η.1.2. Πληθυσμοί ψαριών

Κατάλογος ειδών:

Χρησιμοποιήθηκαν οι ακόλουθες βάσεις δεδομένων και αναφορές:

- 4η Εθνική Έκθεση για την κατάσταση διατήρησης και τις τάσεις για όλους τους ελληνικούς τύπους οικοτόπων και ειδών που απαριθμούνται στα παραρτήματα (I, II, IV, V) της οδηγίας για τους οικοτόπους (92/43/ΕΟΚ)
- Παγκόσμιος Μηχανισμός Πληροφοριών για τη Βιοποικιλότητα (GBIF)
- Κατάλληλες Εκτιμήσεις
- Κεντρικό αποθετήριο δεδομένων Eionet
- Πηγές από RAC/SPA, IUCN, MAVA

	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED		 
	Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων		Αρ. Εγγρ: PERM-GREE-ESIA- A08_0012_0 Annex8G Αναθ. : 00 Σελ.: 7 από 106

- Βάση δεδομένων της πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Δικτύου Θαλάσσιων Παρατηρήσεων και Δεδομένων (EMODnet) για τους οικοτόπους του θαλάσσιου βυθού, που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και
- Εκθέσεις που εκπονήθηκαν για το Έργο:
 - Μελέτη της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και της κατάστασης διατήρησης των θαλάσσιων λειμώνων για την ανάπτυξη του αγωγού EASTMED στο υπεράκτιο τμήμα και στις χερσαίες τοποθεσίες εκφόρτωσης.

Κατάσταση προστασίας:

Για την οριοθέτηση του καθεστώτος προστασίας και απειλής θα τηρηθεί η πρόβλεψη της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας. Όλα τα είδη θα ταξινομηθούν σε κατηγορίες προστασίας με βάση τη συμπερίληψή τους: α) στα παραρτήματα της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, β) στην Κόκκινη Λίστα Απειλούμενων Ειδών της IUCN, γ) στη Σύμβαση της Βέρνης για τη διατήρηση της ευρωπαϊκής άγριας ζωής και των φυσικών οικοτόπων, δ) στη Σύμβαση της Βόννης για τη διατήρηση των αποδημητικών ειδών της άγριας πανίδας, ε) στο Προεδρικό Διάταγμα 67/1981 και στ) στη Σύμβαση για το Διεθνές Εμπόριο των Ειδών της Άγριας Πανίδας και Χλωρίδας που Κινδυνεύουν με Εξαφάνιση (CITES).

8 Η.1.3. Ασπόνδυλα

Κατάλογος ειδών:

Χρησιμοποιήθηκαν οι ακόλουθες βάσεις δεδομένων και αναφορές:

- 4^η Εθνική Έκθεση για την κατάσταση διατήρησης και τις τάσεις για όλους τους ελληνικούς τύπους οικοτόπων και ειδών που απαριθμούνται στα παραρτήματα (I, II, IV, V) της οδηγίας για τους οικοτόπους (92/43/ΕΟΚ)
- Παγκόσμιος Μηχανισμός Πληροφοριών για τη Βιοποικιλότητα (GBIF)
- Κατάλληλες Εκτιμήσεις
- Κεντρικό αποθετήριο δεδομένων Eionet και
- Πηγές από RAC/SPA, IUCN, MAVΑ.

Κατάσταση προστασίας:

Για την οριοθέτηση του καθεστώτος προστασίας και απειλής θα τηρηθεί η πρόβλεψη της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας. Όλα τα είδη θα ταξινομηθούν σε κατηγορίες προστασίας με βάση τη συμπερίληψή τους: α) στα παραρτήματα της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, β) στην Κόκκινη Λίστα Απειλούμενων Ειδών της IUCN, γ) στη Σύμβαση της Βέρνης για τη διατήρηση της ευρωπαϊκής άγριας ζωής και των φυσικών οικοτόπων, δ) στη Σύμβαση της Βόννης για τη διατήρηση των αποδημητικών

 IGI Poseidon	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED	 
	Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων	Αρ. Εγγρ: PERM-GREE-ESIA- A08_0012_0 Annex8G Αναθ. : 00 Σελ.: 8 από 106

ειδών της άγριας πανίδας, ε) στο Προεδρικό Διάταγμα 67/1981 και στ) στη Σύμβαση για το Διεθνές Εμπόριο των Ειδών της Άγριας Πανίδας και Χλωρίδας που Κινδυνεύουν με Εξαφάνιση (CITES)

	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED		 
	Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων		Αρ. Εγγρ: PERM-GREE-ESIA- A08_0012_0 Annex8G
			Αναθ. : 00 Σελ.: 9 από 106

8 Η.2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει τα είδη πανίδας που υπάρχουν και αναμένονται στην Περιοχή Μελέτης. Πιο συγκεκριμένα:

- Πίνακας Η-1 Είδη θηλαστικών, αμφιβίων και ερπετών που υπάρχουν και αναμένονται στην περιοχή μελέτης
- Πίνακας Η-2 Είδη ψαριών του γλυκού νερού που υπάρχουν και αναμένονται στην Περιοχή μελέτης
- Πίνακας Η-3 Θαλάσσια είδη ψαριών που υπάρχουν και αναμένονται στην Περιοχή μελέτης και
- Πίνακας Η-4 Ασπόνδυλα που υπάρχουν και αναμένονται στην Περιοχή μελέτης.

Πίνακας Η-1 Είδη θηλαστικών, αμφιβίων και ερπετών που υπάρχουν και αναμένονται στην περιοχή μελέτης

Είδος		Κατάσταση προστασίας							Οικολογία	Παρουσία εντός της Περιοχής Μελέτης	Ευαίσθητες Οικολογικές Περίοδοι	Περιοχές έργου									
Επιστημονική ονομασία	Κοινή ονομασία	Προεδρικό Διάταγμα 67/1981	Σύμβαση της Βέρνης	Σύμβαση της Βόννης	Σύμβαση της Βαρκελώνης	Οδηγία 92/43/ΕΟΚ	IUCN/Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων ζώων της Ελλάδας	CITES				Πελοπόννησος (Χερσαία Ζώνη)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)	Πατραϊκός Κόλπος	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια Ζώνη & LF5)	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Χερσαία Ζώνη)	Κρήτη (Χερσαία Ζώνη)	Νότιο Αιγαίο Πέλαγος	Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)	Νότιο Κρητικό Πέλαγος
									Αμφίβια												
<i>Bufo viridis</i>	Πράσινος φρύνος		II			V	LC/LC		Ο <i>Bufo viridis</i> είναι ένα από τα πιο πολυτοπικά αμφίβια της Παλαιαρκτικής Ζώνης. Ζει στις ζώνες των δασών, των δασικών στεπών, των στεπών, των ημιερήμων και των ερήμων. Είναι πιο ανεκτικός σε ξηρές συνθήκες από πολλά άλλα αμφίβια. Κατοικεί τόσο σε υγρές βαλτώδεις περιοχές όσο και σε ξηρές ερήμους διαφορετικών τύπων. Στη δασική ζώνη, το είδος τείνει να ζει σε ανοιχτές περιοχές και θαμνώδεις εκτάσεις, συχνά μακριά από υδάτινα σώματα, ενώ στα νότια ξηρά τμήματα της οροσειράς κατοικεί κυρίως σε υγρές τοποθεσίες όπως οάσεις, όχθες αρδευτικών τάφρων και λίμνες.	Είναι ευρέως κατανεμημένο είδος μεταξύ των οικοτόπων, κυρίως σε ανοίγματα και κοντά σε νερό	Χειμερία νάρκη, αναπαραγωγή	*					*				
<i>Hyla arborea</i>	Ευρωπαϊκός δενδροβάτραχος		II			IV	LC/LC		Προτιμά τις υγρές περιοχές με πυκνή βλάστηση. Απαντάται από τη στάθμη της θάλασσας έως μεγάλα υψόμετρα. Κυρίως νυκτόβιο, αλλά μπορεί να εμφανιστεί δραστήριο και την ημέρα μερικές φορές. Ζευγαρώνει νωρίς την άνοιξη και	Μεσογειακά φυλλοβόλα δάση, Μικτά δάση, Δάση κατακλυζόμενων πεδιάδων, Αγροδασικές εκτάσεις	Χειμερία νάρκη, αναπαραγωγή	*					*				



Είδος		Κατάσταση προστασίας							Οικολογία	Παρουσία εντός της Περιοχής Μελέτης	Ευαίσθητες Οικολογικές Περίοδοι	Περιοχές έργου									
Επιστημονική ονομασία	Κοινή ονομασία	Προεδρικό Διάταγμα 67/1981	Σύμβαση της Βέρνης	Σύμβαση της Βόννης	Σύμβαση της Βαρκελώνης	Οδηγία 92/43/ΕΟΚ	IUCN/Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων ζώων της Ελλάδας	CITES				Πελοπόννησος (Χερσαία Ζώνη)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)	Πατραϊκός Κόλπος	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια Ζώνη & LF5)	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Χερσαία Ζώνη)	Κρήτη (Χερσαία Ζώνη)	Νότιο Αιγαίο Πέλαγος	Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)	Νότιο Κρητικό Πέλαγος
									μερικές φορές τα θηλυκά γεννούν περισσότερα από 1500 αυγά συνολικά, σε πολλούς αυγοθαλάμους,												
<i>Pelobates syriacus</i>	Πηλοβάτης		II			IV	LC/NE		Προτιμά τους υγρούς, ανοικτούς οικοτόπους, όπως καλλιεργούμενες εκτάσεις, παράκτιες περιοχές με αμμόλοφους, εποχιακές λίμνες κ.λπ., συνήθως από τη στάθμη της θάλασσας έως τα 2000 μέτρα πάνω από τη στάθμη της θάλασσας (στη Μέση Ανατολή). Αυτός ο φρύνος είναι νυκτόβιος και τρυπώνει βαθιά σε μαλακά εδάφη μέχρι ένα μέτρο κάτω από την επιφάνεια όπου κρύβεται κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ζευγαρώνει την άνοιξη και τα θηλυκά μπορούν να γεννήσουν έως και 4000 αυγά συνολικά.	Λίμνες, Γεωργικές περιοχές	Χειμερία νάρκη, αναπαραγωγή	*					*				
<i>Pelophylax kurtmuelleri</i>	Ελληνικός βαλτοβάτραχος					V	LC/LC		Ένας ντροπαλός βάτραχος που συνήθως πετάγεται μέσα από το νερό. Πηδάει μέσα στο νερό όταν νιώσει ότι απειλείται. Τρέφεται κυρίως με ασπόνδυλα. Ζευγαρώνει την άνοιξη και τα θηλυκά γεννούν στο νερό περισσότερα από 10000 αυγά συνολικά σε συστάδες μερικών εκατοντάδων.	Λίμνες, Αγροδασικές περιοχές	Χειμερία νάρκη, αναπαραγωγή	*					*				

Είδος		Κατάσταση προστασίας										Περιοχές έργου									
		Προεδρικό Διάταγμα 67/1981	Σύμβαση της Βέρνης	Σύμβαση της Βόννης	Σύμβαση της Βαρκελώνης	Οδηγία 92/43/ΕΟΚ	IUCN/Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων ζώων της Ελλάδας	CITES				Πελοπόννησος (Χερσαία Ζώνη)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)	Πατραϊκός Κόλπος	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια Ζώνη & LF5)	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Χερσαία Ζώνη)	Κρήτη (Χερσαία Ζώνη)	Νότιο Αιγαίο Πέλαγος	Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)	Νότιο Κρητικό Πέλαγος
Επιστημονική ονομασία	Κοινή ονομασία								Οικολογία	Παρουσία εντός της Περιοχής Μελέτης	Ευαίσθητες Οικολογικές Περίοδοι										
<i>Rana dalmatina</i>	Ευκίνητος βάτραχος	-	II	-	-	IV	LC/NE		Προτιμά το υγρά φυλλοβόλα δάση και συνήθως να βρίσκεται κοντά σε νερό σε υψόμετρα έως 1700 μέτρα πάνω από τη στάθμη της θάλασσας. Ένας πολύ ευκίνητος βάτραχος με μακριά πίσω πόδια που τον βοηθούν να κάνει πραγματικά μεγάλα άλματα. Ζευγαρώνει στις αρχές της άνοιξης ή στα τέλη του χειμώνα και τα θηλυκά γεννούν στο νερό αρκετές χιλιάδες αυγά συνολικά σε συστάδες μερικών εκατοντάδων.	Δάση κατακλυζόμενων πεδιάδων	Χειμερία νάρκη, αναπαραγωγή	*					*				
<i>Rana graeca</i>	Ελληνικός βάτραχος	-	III	-	-	IV	LC/NE		Προτιμά ορεινές, δασικές και σχετικά δροσερές περιοχές με μόνιμα ρέοντα νερά, όπου θα πηδήξει όταν νιώσει ότι απειλείται. Απαντάται σε υψόμετρα που ξεκινούν από τα 200 έως και τα 2000 μέτρα. Μπορεί να είναι δραστήριος τόσο την ημέρα όσο και τη νύχτα. Τα θηλυκά γεννούν τα αυγά τους στο νερό σε ομάδες μερικών εκατοντάδων.	Δάση κατακλυζόμενων πεδιάδων Μεσογειακά δάση φυλλοβόλων Μεσογειακά δάση κωνοφόρων Μικτά δάση Αγροδασικές περιοχές	Χειμερία νάρκη, αναπαραγωγή	*					*				
									Θηλαστικά												
<i>Barbastella barbastellus</i>	Μπαρμπαστελλός	-	I, II	II	-	II, IV	NT/EN		Τα μπαρμπαστελλός φωλιάζουν σε σχισμές ή πίσω από τον χαλαρό φλοιό των δέντρων όλο το χρόνο, γενικά σε ώριμα δάση φυλλοβόλων,	Μεσογειακά δάση φυλλοβόλων, Μικτά δάση, Οικισμοί, Περιοχές με αραιή βλάστηση.	Αναπαραγωγή	*					*				

Είδος		Κατάσταση προστασίας							Οικολογία	Παρουσία εντός της Περιοχής Μελέτης	Ευαίσθητες Οικολογικές Περίοδοι	Περιοχές έργου									
Επιστημονική ονομασία	Κοινή ονομασία	Προεδρικό Διάταγμα 67/1981	Σύμβαση της Βέρνης	Σύμβαση της Βόννης	Σύμβαση της Βαρκελώνης	Οδηγία 92/43/ΕΟΚ	IUCN/Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων ζώων της Ελλάδας	CITES				Πελοπόννησος (Χερσαία Ζώνη)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)	Πατραϊκός Κόλπος	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια Ζώνη & LF5)	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Χερσαία Ζώνη)	Κρήτη (Χερσαία Ζώνη)	Νότιο Αιγαίο Πέλαγος	Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)	Νότιο Κρητικό Πέλαγος
									καθώς και σε σχισμές βράχων και μέσα σε ανθρώπινα κτίρια.												
Canis aureus	Χρυσό τσακάλι	-	-	-	-	V	LC/EN	III	Τα χρυσά τσακάλια απαντώνται σε κοιλάδες, δίπλα σε ποτάμια και τους παραποτάμους τους, κανάλια και λίμνες.	Δάση κατακλυζόμενων πεδιάδων, Ποτάμια, Λίμνες, Αγροδοσκομικές περιοχές.	Αναπαραγωγή	*									
Delphinus delphis	Κοινό δελφίνι	NAI	II	I, II	II	II, IV	LC/EN	II	Το είδος απαντάται στο εσωτερικό Ιόνιο Πέλαγος, τον Κορινθιακό Κόλπο, το Θρακικό Πέλαγος, τις Βόρειες Σποράδες, το Βορειοανατολικό Αιγαίο (μεταξύ των ελληνικών νησιών και των τουρκικών ακτών), τον Θερμαϊκό κόλπο, τον Ευβοϊκό κόλπο, τον Παγασητικό, τον Σαρωνικό, τα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες. Το συναντάμε κυρίως σε περιοχές βάθους έως 200 μέτρων και κοντά στην ακτή.	Το είδος είναι πολύ σπάνιο ή απουσιάζει νότια του παράλληλου 36°: παρά τις εντατικές προσπάθειες αναζήτησης στη βορειοανατολική Κρήτη, τη νοτιοδυτική Κρήτη και γύρω από το νησί της Καρπάθου.	Περίοδος αναπαραγωγής την άνοιξη (Μάρτιος έως Μάιος) και το φθινόπωρο (Σεπτέμβριος έως Νοέμβριος).		*		*		*				
Dryomys nitedula	Δενδρομυωξός	-	III	-	-	IV	-	-	Οι δενδρομυωξοί απαντώνται σε πυκνά δάση, συνήθως σε δάση φυλλοβόλων και μικτά δάση, καθώς και σε υψώματα μέχρι τα όρια της δασικής ζώνης. Οι δενδρομυωξοί χρησιμοποιούν καλλιεργούμενες εκτάσεις όπως κήπους και επίσης βραχώδεις λειμώνες. Επιλέγουν πυκνούς θάμνους ή χαμηλότερα	Μεσογειακά δάση φυλλοβόλων, Μεσογειακά δάση κωνοφόρων, Μικτά δάση	Αναπαραγωγή	*				*					



Είδος		Κατάσταση προστασίας							Οικολογία	Παρουσία εντός της Περιοχής Μελέτης	Ευαίσθητες Οικολογικές Περίοδοι	Περιοχές έργου									
Επιστημονική ονομασία	Κοινή ονομασία	Προεδρικό Διάταγμα 67/1981	Σύμβαση της Βέρνης	Σύμβαση της Βόννης	Σύμβαση της Βαρκελώνης	Οδηγία 92/43/ΕΟΚ	IUCN/Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων ζώων της Ελλάδας	CITES				Πελοπόννησος (Χερσαία Ζώνη)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)	Πατραϊκός Κόλπος	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια Ζώνη & LF5)	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Χερσαία Ζώνη)	Κρήτη (Χερσαία Ζώνη)	Νότιο Αιγαίο Πέλαγος	Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)	Νότιο Κρητικό Πέλαγος
									κλαδιά δέντρων στα οποία φτιάχνουν τη φωλιά τους.												
<i>Eptesicus serotinus</i>	Τρανονυχτερίδα	-	II	II	-	IV	LC/LC	-	Απαντάται στα όρια των δασών, σε υδροβιότοπους και σε κεντρικούς δρόμους, σε απόσταση περίπου 12 χλμ μακριά από τα καταφύγια τους. Ζει σε δέντρα, σχισμές βράχων, σπίτια, γέφυρες κ.λπ.	Ευρέως εξαπλωμένο είδος μεταξύ των τύπων οικοτόπων	Αναπαραγωγή	*			*						
<i>Erinaceus roumanicus</i>	Ρουμανικός σκαντζόχοιρος	-	-	-	-	-	LC/NE	-	Είδος που αφθονεί σε όλη την Ευρώπη και δραστηριοποιείται σπάνια τον χειμώνα. Τρέφεται συνήθως με έντομα, μικρά σπονδυλωτά, φρούτα και ξηρούς καρπούς. Όταν νιώσει κίνδυνο, κουλουριάζεται προβάλλοντας τα αγκάθια τους σχηματίζοντας μια μπάλα.	Ευρέως κατανεμημένο είδος, κυρίως εκτός των δασών.	Αναπαραγωγή	*									
<i>Felis silvestris</i>	Αγριόγατα	-	II	-	-	IV	LC/NE	II	Οι αγριόγατες απαντώνται κυρίως σε δάση φυλλοβόλων. Απαντώνται επίσης στα δάση κωνοφόρων, αλλά αυτά αποτελούν συνήθως οριακά ενδιαιτήματα. Περιορίζονται στη βόρεια εξάπλωσή τους από το βάθος του χιονιού και απαντώνται συνήθως σε περιοχές με χαμηλούς ανθρώπινους πληθυσμούς. Οι ευρωπαϊκές αγριόγατες δεν μπορούν να επιβιώσουν σε περιοχές όπου το	Μεσογειακά φυλλοβόλα δάση, Δάση κατακλυζόμενων πεδιάδων, Αγροδασικές εκτάσεις	Αναπαραγωγή					*					

Είδος		Κατάσταση προστασίας							Οικολογία	Παρουσία εντός της Περιοχής Μελέτης	Ευαίσθητες Οικολογικές Περίοδοι	Περιοχές έργου									
Επιστημονική ονομασία	Κοινή ονομασία	Προεδρικό Διάταγμα 67/1981	Σύμβαση της Βέρνης	Σύμβαση της Βόννης	Σύμβαση της Βαρκελώνης	Οδηγία 92/43/ΕΟΚ	IUCN/Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων ζώων της Ελλάδας	CITES				Πελοπόννησος (Χερσαία Ζώνη)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)	Πατραϊκός Κόλπος	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια Ζώνη & LF5)	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Χερσαία Ζώνη)	Κρήτη (Χερσαία Ζώνη)	Νότιο Αιγαίο Πέλαγος	Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)	Νότιο Κρητικό Πέλαγος
									βάθος του χιονιού τον χειμώνα είναι πάνω από 20 cm για περισσότερες από 100 ημέρες. Αφθονούν σε τοπία όπου κυριαρχεί το ανθρώπινο στοιχείο, όπου η βόσκηση είναι η κυρίαρχη μορφή γεωργίας και, ως εκ τούτου, η χρήση της γης δεν είναι εντατική. Αφθονούν επίσης σε θαμνώδεις εκτάσεις, παραποτάμιους οικοτόπους και παράκτιες περιοχές.												
Grampus griseus	Γράμπος	-	II	I, II	II	IV	LC/VU	I, II	Απαντάται σε όλες τις ελληνικές θάλασσες (σε βάθη 200 – 1700 μέτρων και σε απόσταση 1-32 χλμ από την ακτή).	Περιπαράλια ζώνη της τοποθεσίας LF3. Το είδος μπορεί να είναι παρόν σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές με βαθέα ύδατα ή απότομο υποθαλάσσιο ανάγλυφο κατά μήκος της όδευσης του αγωγού, αλλά η συχνότητα εντοπισμού του μπορεί να είναι χαμηλή. Μπορεί να απαντηθεί στην περιοχή μελέτης καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.	Εποχιακές μεταναστεύσεις μεταξύ τόπων διαθήρισης (Ιούνιος-Αύγουστος) και διαχείμασης (Δεκέμβριος-Φεβρουάριος).		*					*	*		
Hypsugo savii	Βουνονυχτερίδα	-	-	II	-	-	LC/LC	-	Νυκτόβιο είδος νυχτερίδας που απαντάται στη Βορειοδυτική Αφρική, την περιοχή της Μεσογείου και τη	Αγροδασικές περιοχές. Χαμηλής πυκνότητας δομημένες περιοχές /	Αναπαραγωγή	*					*	*			



Είδος		Κατάσταση προστασίας								Οικολογία	Παρουσία εντός της Περιοχής Μελέτης	Ευαίσθητες Οικολογικές Περίοδοι	Περιοχές έργου								
		Προεδρικό Διάταγμα 67/1981	Σύμβαση της Βέρνης	Σύμβαση της Βόννης	Σύμβαση της Βαρκελώνης	Οδηγία 92/43/ΕΟΚ	IUCN/Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων ζώων της Ελλάδας	CITES					Πελοπόννησος (Χερσαία Ζώνη)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)	Πατραϊκός Κόλπος	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια Ζώνη & LF5)	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Χερσαία Ζώνη)	Κρήτη (Χερσαία Ζώνη)	Νότιο Αιγαίο Πέλαγος	Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)
Επιστημονική ονομασία	Κοινή ονομασία								Μέση Ανατολή. Τρέφεται τη νύχτα με ιπτάμενα έντομα. Το καλοκαίρι τριγυρίζει κάτω από τον φλοιό, σε τρύπες σε δέντρα, σε παλιά κτίρια και σε σχισμές βράχων, αλλά τον χειμώνα προτιμά να κουρνιάζει σε μέρη όπου η θερμοκρασία είναι πιο ομοιόμορφη όπως σπηλιές, υπόγειοι θόλοι και βαθιές ρωγμές σε βράχους.	Οικισμοί, Περιοχές με αραιή βλάστηση, Σκληρόφυλλη βλάστηση, Δάση κατακλυζόμενων πεδιάδων (Παρόχθιο δάσος/Ποταμιαίο δάσος), Μεσογειακά δάση φυλλοβόλων, Μεσογειακά δάση κωνοφόρων, Μικτά δάση											
<i>Lutra lutra</i>	Ευρωπαϊκή ενυδρίδα	ΝΑΙ	I, II	-	-	II, IV	NT/EN	I	Απαντάται σε καθαρές μάζες γλυκού νερού όπως λίμνες, ρυάκια, ποτάμια, κανάλια και νερόλακους, εφόσον μπορεί να βρει επαρκή τροφή.	Δάση κατακλυζόμενων πεδιάδων, Ποτάμια, Λίμνες.	Αναπαραγωγή	*			*						
<i>Martes foina</i>	Πετροκούναβο		III				LC/NE		Το πετροκούναβο είναι κυρίως νυκτόβιο ζώο, αν και σε πολύ μικρότερο βαθμό από τον ευρωπαϊκό αγριόγατο. Είναι ιδιαίτερα δραστήριο τις νύχτες με φεγγάρι. Ως πιο χερσαίο από το δενδροκούναβο, το πετροκούναβο είναι λιγότερο δενδρόβιο στις συνήθειές του, αν και είναι έμπειρος ορειβάτης σε περιοχές με πυκνά δάση. Είναι ικανός κολυμβητής και μπορεί περιστασιακά να είναι δραστήριος κατά τις ώρες της ημέρας, ιδιαίτερα	Ευρέως εξαπλωμένο	Αναπαραγωγή	*									

Είδος		Κατάσταση προστασίας										Περιοχές έργου								
Επιστημονική ονομασία	Κοινή ονομασία	Προεδρικό Διάταγμα 67/1981	Σύμβαση της Βέρνης	Σύμβαση της Βόννης	Σύμβαση της Βαρκελώνης	Οδηγία 92/43/ΕΟΚ	IUCN/Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων ζώων της Ελλάδας	CITES				Πελοπόννησος (Χερσαία Ζώνη)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)	Πατραϊκός Κόλπος	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια Ζώνη & LF5)	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Χερσαία Ζώνη)	Κρήτη (Χερσαία Ζώνη)	Νότιο Αιγαίο Πέλαγος	Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)
									το καλοκαίρι, όταν οι νύχτες είναι μικρότερης διάρκειας. Συνήθως κυνηγάει στο έδαφος. Κατά τη διάρκεια έντονων χιονοπτώσεων, το πετροκούναβο κινείται μέσα στα μονοπάτια που δημιουργούνται από λαγούς ή χιονοπέδιλα.											
Meles meles	Ευρωπαϊκός ασβός	-	III	-	-	-	LC/NE	-	Απαντάται σε δάση φυλλοβόλων και μικτά δάση, ξέφωτα, αγριόδεντρα, βοσκοτόπια και θάμνους, καθώς και σε μεσογειακές άγριες θαμνώδεις εκτάσεις. Έχει προσαρμοστεί στη ζωή σε προαστιακές περιοχές και αστικά πάρκα, αν και όχι στον βαθμό που έχουν προσαρμοστεί οι κόκκινες αλεπούδες. Στις ορεινές περιοχές εμφανίζεται μέχρι υψόμετρο 2.000 μέτρων. Είναι ιδιαίτερα ευπροσάρμοστο και περιστασιακά παμφάγο, ενώ η διατροφή του περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα ζώων και φυτών.	Περιοχές με σύνθετες καλλιέργειες, Αγροδασικές περιοχές, Δάση κατακλυζόμενων πεδιάδων, (Παρόχθιο δάσος/Ποταμιαίο δάσος), Μικτά δάση, Μεταβατικοί δασώδεις θάμνοι-δασικές εκτάσεις, Σκληρόφυλλη βλάστηση	Αναπαραγωγή	*								
Monachus monachus	Μεσογειακή φώκια	NAI	II	I, II	II	II*, IV	EN/CR	I	Το είδος είναι ευρέως εξαπλωμένο σε όλη την παράκτια και νησιωτική Ελλάδα	Μπορεί να απαντηθεί στην περιοχή μελέτης καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. [Field Recording]	Εποχή αναπαραγωγής το φθινόπωρο, Σεπτέμβριος-Νοέμβριος. Μπορεί να		*		*		*	*	*	

Είδος		Κατάσταση προστασίας										Περιοχές έργου										
Επιστημονική ονομασία	Κοινή ονομασία	Προεδρικό Διάταγμα 67/1981	Σύμβαση της Βέρνης	Σύμβαση της Βόννης	Σύμβαση της Βαρκελώνης	Οδηγία 92/43/ΕΟΚ	IUCN/Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων ζώων της Ελλάδας	CITES				Οικολογία	Παρουσία εντός της Περιοχής Μελέτης	Ευαίσθητες Οικολογικές Περίοδοι	Πελοπόννησος (Χερσαία Ζώνη)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)	Πατραϊκός Κόλπος	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια Ζώνη & LF5)	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Χερσαία Ζώνη)	Κρήτη (Χερσαία Ζώνη)	Νότιο Αιγαίο Πέλαγος
										- Δύο σπήλαια δυνητικά κατάλληλα για ανάπαυση του είδους έχουν εντοπιστεί εντός της Περιοχής μελέτης βόρεια της Μονεμβασιάς και το άλλο νότια της LF3. - Συγκρότημα θαλάσσιων σπηλαίων ανάπαυσης 1.300 μέτρα ανατολικά της θέσης προσαιγιάλωσης του Αθερινόλακκου 1 συγκρότημα σπηλαίων ανάπαυσης @ Κρήτη: (Χ: 35.00838,Υ: 26.14397 1 σπήλαιο ανάπτυξης νεογνών @ Κουφονήσι: (Χ:34.93262, Υ: 26.12606 1 σπήλαιο ανάπαυσης @ Κουφονήσι: (Χ:34.93250, Υ: 26.12535. Μπορεί να απαντηθεί στην περιοχή μελέτης	απαντηθεί στην Περιοχή μελέτης καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.											

Είδος		Κατάσταση προστασίας							Οικολογία	Παρουσία εντός της Περιοχής Μελέτης	Ευαίσθητες Οικολογικές Περίοδοι	Περιοχές έργου									
Επιστημονική ονομασία	Κοινή ονομασία	Προεδρικό Διάταγμα 67/1981	Σύμβαση της Βέρνης	Σύμβαση της Βόννης	Σύμβαση της Βαρκελώνης	Οδηγία 92/43/ΕΟΚ	IUCN/κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων ζώων της Ελλάδας	CITES				Πελοπόννησος (Χερσαία Ζώνη)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)	Πατραϊκός Κόλπος	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια Ζώνη & LF5)	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Χερσαία Ζώνη)	Κρήτη (Χερσαία Ζώνη)	Νότιο Αιγαίο Πέλαγος	Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)	Νότιο Κρητικό Πέλαγος
										καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.											
<i>Muscardinus avellanarius</i>	Βουνομυωξός	-	III	-	-	IV	LC/DD	-	Ο βουνομυωξός απαντάται συνήθως σε δάση φυλλοβόλων, αλλά κατοικεί επίσης σε θαμνοστοιχίες και θάμνους.	Μεσογειακά φυλλοβόλα δάση, Μικτά δάση, Αγροδασικές εκτάσεις	Αναπαραγωγή	*			*						
<i>Mustela nivalis</i>	Νυφίτσα	-	III	-	-	-	LC/NE	-	Απαντάται σε χωράφια, ανοιχτά δάση, θαμνώδεις ή βραχώδεις περιοχές, πάρκα και κήπους και σε όλα τα υψόμετρα. Η νυφίτσα τρέφεται κυρίως με τρωκτικά που μοιάζουν με ποντίκια, συμπεριλαμβανομένων ποντικών, χάμστερ, γερβίλων και άλλων. Συνήθως δεν επιτίθεται σε ενήλικα χάμστερ και αρουραίους. Σπανίως τρέφεται με βατράχους, ψάρια, μικρά πουλιά και αυγά πουλιών.	Αρδευόμενη γη, Μόνιμες καλλιέργειες, Αμπελώνες, Φυτείες οπωροφόρων δένδρων και μούρων, Ελαιώνες, Περιοχές με σύνθετες καλλιέργειες, Αγροδασικές περιοχές, Λιβάδια, Μεταβατικοί δασώδεις θάμνοι-δασικές εκτάσεις, Περιοχές με αραιή βλάστηση	Αναπαραγωγή	*			*						
<i>Myocastor coypus</i>	Μυοκάστορας	-	-	-	-	-	LC/NA	-	Ο μυοκάστορας ήρθε στην Ευρώπη από την υποτροπική Νότια Αμερική για τη γούνα του. Έχει προσαρμοστεί σε ημιυδρόβιο τρόπο ζωής και ζει μέσα σε πολύπλοκα λαγούμια, τα οποία σκάβει στις όχθες των λιμνών και των ποταμών.	Λίμνες	Αναπαραγωγή				*						

Είδος		Κατάσταση προστασίας							Οικολογία	Παρουσία εντός της Περιοχής Μελέτης	Ευαίσθητες Οικολογικές Περίοδοι	Περιοχές έργου									
Επιστημονική ονομασία	Κοινή ονομασία	Προεδρικό Διάταγμα 67/1981	Σύμβαση της Βέρνης	Σύμβαση της Βόννης	Σύμβαση της Βαρκελώνης	Οδηγία 92/43/ΕΟΚ	IUCN/Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων ζώων της Ελλάδας	CITES				Πελοπόννησος (Χερσαία Ζώνη)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)	Πατραϊκός Κόλπος	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια Ζώνη & LF5)	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Χερσαία Ζώνη)	Κρήτη (Χερσαία Ζώνη)	Νότιο Αιγαίο Πέλαγος	Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)	Νότιο Κρητικό Πέλαγος
<i>Myotis aurascens</i>	Μουστακομυωτίδα	-	II	-	-	IV	LC/DD	-	Απαντάται σε τοπία κατακλυζόμενων πεδιάδων και ανοιχτές εκτάσεις που μοιάζουν με στέπα, σε υψόμετρο έως 2000 μέτρων. Διατηρούν μικτές αποικίες νεογνών με τις βαλκανικές νυχτερίδες. Τα θηλυκά κυοφορούν στις αρχές Ιουνίου. Οι γεννήσεις γίνονται από τα μέσα έως τα τέλη Ιουνίου.	Λιβάδια, Δάση κατακλυζόμενων πεδιάδων	Αναπαραγωγή	*					*	*			
<i>Myotis bechsteinii</i>	Μυωτίδα του Bechstein	-	I, II	II	-	II, IV	NT/NT	-	Κουρνιάζουν στις τρύπες των δέντρων, συνήθως σε τρύπες από δρυοκολάπτες. Η μυωτίδα του Bechstein έχει επίσης καταγραφεί ότι μπαίνει σε τεχνητές φωλιές, αλλά σπάνια φιλοξενείται σε ανθρώπινα κτίρια. Κατά τη διάρκεια του χειμώνα, οι μυωτίδες του Bechstein πέφτουν σε χειμερία νάρκη μέσα στο υπέδαφος και σε τρύπες στα δέντρα. Το ζευγάρωμα πραγματοποιείται το φθινόπωρο και την άνοιξη και, σε περίπτωση καθυστερημένης γονιμοποίησης, τα νεογνά (ένα ανά θηλυκό) γεννιούνται νωρίς το επόμενο καλοκαίρι.	Δάση, αγροδασικές περιοχές.	Χειμερία νάρκη, αναπαραγωγή	*					*				
<i>Nyctalus lasiopterus</i>	Μεγάλος νυκτοβάτης	-	-	II	-	IV	VU/VU	-	Ο μεγάλος νυκτοβάτης είναι μια νυχτερίδα που κατοικεί στα δέντρα όλο το χρόνο. Απαντάται σε όλα τα	Δάση, Αγροδασικές περιοχές.	Χειμερία νάρκη, αναπαραγωγή	*					*				

Είδος		Κατάσταση προστασίας							Οικολογία	Παρουσία εντός της Περιοχής Μελέτης	Ευαίσθητες Οικολογικές Περίοδοι	Περιοχές έργου									
Επιστημονική ονομασία	Κοινή ονομασία	Προεδρικό Διάταγμα 67/1981	Σύμβαση της Βέρνης	Σύμβαση της Βόννης	Σύμβαση της Βαρκελώνης	Οδηγία 92/43/ΕΟΚ	IUCN/Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων ζώων της Ελλάδας	CITES				Πελοπόννησος (Χερσαία Ζώνη)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)	Πατραϊκός Κόλπος	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια Ζώνη & LF5)	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Χερσαία Ζώνη)	Κρήτη (Χερσαία Ζώνη)	Νότιο Αιγαίο Πέλαγος	Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)	Νότιο Κρητικό Πέλαγος
									δάση φυλλοβόλων της Ευρώπης από την Ιβηρική Χερσόνησο έως την περιοχή του Βοσπόρου στην Τουρκία												
Nyctalus leisleri	Μικρονυκτοβάτης	-	-	II	-	IV	LC/LC	-	Απαντάται συνήθως σε δάση, τόσο κωνοφόρων όσο και φυλλοβόλων, αλλά έχει επίσης προσαρμοστεί σε πάρκα και αστικές περιοχές και συχνά κουρνιάζει σε κτίρια. Οι νυχτερίδες εμφανίζονται αμέσως μετά τη δύση του ηλίου για να αναζητήσουν τροφή σε ιπτάμενα έντομα, όπως ο σκόρος και τα σκαθάρια. Πετούν ευθεία και γρήγορα με ρηχές καταδύσεις, συχνά στο επίπεδο των δέντρων. Μερικές φορές αναζητούν τροφή γύρω από τα φώτα των δρόμων, παγιδεύοντας τα έντομα που τους ελκύουν.	Μεσογειακά δάση φυλλοβόλων Μεσογειακά δάση κωνοφόρων Μικτά δάση, Χαμηλής πυκνότητας κατοικημένες περιοχές / Οικισμοί	Αναπαραγωγή	*			*						
Nyctalus noctula	Νυχτοβάτης	-	-	II	-	IV	LC/DD	-	Ο νυχτοβάτης είναι ένα μεταναστευτικό είδος, όπου τα είδη που μεταναστεύουν είναι τα θηλυκά και όχι τα αρσενικά. Η περίοδος ζευγαρώματος είναι στα τέλη του καλοκαιριού στις περιοχές που διαχειμάζουν και τα θηλυκά αποθηκεύουν το σπέρμα στη μήτρα κατά τη διάρκεια της χειμερίας	Μεταβατικοί δασώδεις θάμνοι-δασικές εκτάσεις Σκληρόφυλλη βλάστηση	Χειμερία νάρκη, αναπαραγωγή	*			*						



Είδος		Κατάσταση προστασίας							Οικολογία	Παρουσία εντός της Περιοχής Μελέτης	Ευαίσθητες Οικολογικές Περίοδοι	Περιοχές έργου									
Επιστημονική ονομασία	Κοινή ονομασία	Προεδρικό Διάταγμα 67/1981	Σύμβαση της Βέρνης	Σύμβαση της Βόννης	Σύμβαση της Βαρκελώνης	Οδηγία 92/43/ΕΟΚ	IUCN/Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων ζώων της Ελλάδας	CITES				Πελοπόννησος (Χερσαία Ζώνη)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)	Πατραϊκός Κόλπος	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια Ζώνη & LF5)	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Χερσαία Ζώνη)	Κρήτη (Χερσαία Ζώνη)	Νότιο Αιγαίο Πέλαγος	Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)	Νότιο Κρητικό Πέλαγος
									νάρκης μέχρι τη γονιμοποίηση την άνοιξη.												
<i>Physeter macrocephalus</i>	Φουσητήρας		II	I, II	II	IV	VU/EN	I	Το είδος απαντάται κατά μήκος της Ελληνικής Τάφρου (από τα νησιά του δυτικού Ιονίου και την Πελοπόννησο νότια της Κρήτης και νοτιοανατολικά της Ρόδου), στο Μυρτώο Πέλαγος και σε περιοχές του Αιγαίου με απότομες πλαγιές και μεγάλα βάθη – ιδιαίτερα στην περιοχή μεταξύ των Βόρειων Σποράδων και της Χαλκιδικής.	Πιθανώς εμφανίζεται στον Πατραϊκό Κόλπο, στο Νότιο Αιγαίο και στις παράκτιες ζώνες των τοποθεσιών LF3 και LF4. Όσον αφορά το Νότιο Κρητικό Πέλαγος, μπορεί να εμφανιστεί σε ολόκληρη τη διαδρομή του αγωγού, αν και είναι απίθανο να θεαθεί σε αυτήν την περιοχή, καθώς απαντάται συχνότερα κατά μήκος της Ελληνικής Τάφρου, στα δυτικά.	Εποχή αναπαραγωγής και γεννήσεις την άνοιξη (Μάρτιος-Μάιος) και το φθινόπωρο (Σεπτέμβριος-Νοέμβριος) αντίστοιχα.		*		*		*		*		
<i>Pipistrellus kuhlii</i>	Λευκονυχτερίδα		II	II		IV	LC/LC		Η λευκονυχτερίδα είναι μια αρκετά μικρή νυχτερίδα η γούνα της οποίας ποικίλλει σε χρώμα από απαλό μπεζ έως ώχρα. Εκτός από τα αυτιά της καφεκόκκινου χρώματος, αυτό το είδος συνήθως εμφανίζει μια λευκή αιχμή μεταβλητού πλάτους στην ελεύθερη άκρη της μεμβράνης του φτερού και της ουράς. Η οδοντοφυΐα του είδους την κάνει να ξεχωρίσει από τις άλλες νυχτερίδες.	Αγροδιασικές περιοχές, Χαμηλής πυκνότητας κατοικημένες περιοχές / Οικισμοί	Χειμερία νάρκη, αναπαραγωγή	*					*	*			

Είδος		Κατάσταση προστασίας							Οικολογία	Παρουσία εντός της Περιοχής Μελέτης	Ευαίσθητες Οικολογικές Περίοδοι	Περιοχές έργου									
	Κοινή ονομασία	Προεδρικό Διάταγμα 67/1981	Σύμβαση της Βέρνης	Σύμβαση της Βόννης	Σύμβαση της Βαρκελώνης	Οδηγία 92/43/ΕΟΚ	IUCN/Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων ζώων της Ελλάδας	CITES				Πελοπόννησος (Χερσαία Ζώνη)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)	Πατραϊκός Κόλπος	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια Ζώνη & LF5)	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Χερσαία Ζώνη)	Κρήτη (Χερσαία Ζώνη)	Νότιο Αιγαίο Πέλαγος	Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)	Νότιο Κρητικό Πέλαγος
Επιστημονική ονομασία	Κοινή ονομασία								Η λευκονυχτερίδα αφθονεί στη λεκάνη της Μεσογείου και μπορεί να απαντηθεί συχνά τόσο σε γεωργικούς όσο και σε αστικούς οικοτόπους. Συχνά επισκέπτεται ανθρώπινους οικισμούς και κουρνιάζει σε σχισμές δέντρων/βράχων και σε κενά και κελάρια κτιρίων. Είναι ένα πολύ ευκίνητο είδος, το οποίο τρέφεται με μύγες, κουνούπια, σκώρους και άλλα έντομα ενώ ίπταται. Η λευκονυχτερίδα μπορεί να γίνει μη αποδημητική.												
Pipistrellus nathusii	Νυχτερίδα του Ναθούσιους		II	II		IV	LC/DD		Η νυχτερίδα του Ναθούσιους είναι μικρή (άνοιγμα φτερών 220-250 mm) και συνήθως ομοιόμορφου καφέ χρώματος με σκούρο ρύγχος, αυτιά και φτερά. Μοιάζει αρκετά με τα άλλα είδη νυχτερίδας με εξαίρεση το 5ο δάχτυλό της που τείνει να είναι μακρύτερο (π.χ. από 43 mm). Αν και είναι πιο αργή από την P. ripistrellus, η P. nathusius πετάει και αυτή γρήγορα, το οποίο τη βοηθά να αναζητήσει τροφή. Η διατροφή αυτού του είδους αποτελείται κυρίως από ιπτάμενα έντομα, όπως	Δάση κατακλυζόμενων πεδιάδων, (Παρόχθιο δάσος/Ποταμιαίο δάσος), Μικτά δάση	Χειμερία νάρκη, αναπαραγωγή	*						*			



Είδος		Κατάσταση προστασίας							Οικολογία	Παρουσία εντός της Περιοχής Μελέτης	Ευαίσθητες Οικολογικές Περίοδοι	Περιοχές έργου									
Επιστημονική ονομασία	Κοινή ονομασία	Προεδρικό Διάταγμα 67/1981	Σύμβαση της Βέρνης	Σύμβαση της Βόννης	Σύμβαση της Βαρκελώνης	Οδηγία 92/43/ΕΟΚ	IUCN/Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων ζώων της Ελλάδας	CITES				Πελοπόννησος (Χερσαία Ζώνη)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)	Πατραϊκός Κόλπος	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια Ζώνη & LF5)	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Χερσαία Ζώνη)	Κρήτη (Χερσαία Ζώνη)	Νότιο Αιγαίο Πέλαγος	Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)	Νότιο Κρητικό Πέλαγος
									σκνίπες που δεν δαγκώνουν, κουνούπια και μαύρες μύγες. Προτιμά τους οικοτόπους που βρίσκονται σε παραποτάμια δάση, μικτές δασικών εκτάσεων και συνήθως κοντά σε υδάτινα σώματα. Το καλοκαίρι η P. nathusius κουρνιάζει σε τρύπες μέσα σε δέντρα, κτίρια και φωλιές νυχτερίδων, ενώ τον χειμώνα προτιμά να διαχειμάζει σε σχισμές που βρίσκονται σε γκρεμούς και στις εισόδους σπηλαίων. Η νυχτερίδα του Ναθούσιους μεταναστεύει σε μεγάλες αποστάσεις, συνήθως από τη βορειοανατολική προς τη νοτιοδυτική Ευρώπη, κατά μήκος της ακτής ή των κοιλάδων των ποταμών.												
Pipistrellus pipistrellus	Νανονυχτερίδα		III	II		IV	LC/DD		Η νανονυχτερίδα είναι μια μικρή νυχτερίδα σκούρου καφέ χρώματος χωρίς γούνα στη μεμβράνη της ουράς της και άνοιγμα φτερών 180-240 mm. Είναι ευκίνητη και ίπταται ακανόνιστα, ενώ χρησιμοποιεί την τεχνική Hawking για να θηράξει μικρά έντομα. Αυτό το είδος αναζητά την τροφή της σε ευρύ φάσμα	Χαμηλής πυκνότητας κατοικημένες περιοχές / Οικισμοί, Αγροδασικές περιοχές, Μεταβατικοί δασώδεις θάμνοι-δασικές εκτάσεις, Λίμνες		*					*				

Είδος		Κατάσταση προστασίας							Οικολογία	Παρουσία εντός της Περιοχής Μελέτης	Ευαίσθητες Οικολογικές Περίοδοι	Περιοχές έργου									
Επιστημονική ονομασία	Κοινή ονομασία	Προεδρικό Διάταγμα 67/1981	Σύμβαση της Βέρνης	Σύμβαση της Βόννης	Σύμβαση της Βαρκελώνης	Οδηγία 92/43/ΕΟΚ	IUCN/Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων ζώων της Ελλάδας	CITES				Πελοπόννησος (Χερσαία Ζώνη)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)	Πατραϊκός Κόλπος	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια Ζώνη & LF5)	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Χερσαία Ζώνη)	Κρήτη (Χερσαία Ζώνη)	Νότιο Αιγαίο Πέλαγος	Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)	Νότιο Κρητικό Πέλαγος
									οικοτόπων, όπως ανοιχτά δάση, πάνω από υγροτόπους, γεωργικές εκτάσεις, ημιερήμους και αστικές περιοχές. Η P. ripistrellus κρύβεται συχνά μέσα σε ρωγμές σε κτίρια και δέντρα, αλλά μπορεί επίσης να διαχειμάσει σε υπόγειους χώρους κατά τη διάρκεια των πολύ ψυχρών χειμώνων. Η P. ripistrellus είναι ένα ελάχιστα αποδημητικό είδος, ο τόπος διαχείμασης και διαθέρισης της οποίας βρίσκεται συχνά σε απόσταση μόλις 20 χλμ. Ωστόσο, έχουν καταγραφεί και μεταναστεύσεις μεγάλων αποστάσεων.												
Pipistrellus pygmaeus	Μικρονυχτερίδα		II	II		IV	LC/DD		Η μικρονυχτερίδα είναι ελαφρώς μικρότερη από την P. ripistrellus και με άνοιγμα φτερών 190-230 mm. Η ραχιαία γούνα της είναι καστανοκόκκινη, ενώ το ρύγχος και τα αυτιά της είναι κοντά και χλωμά. Ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι το έντονα κυρτό μέτωπό της. Πρόκειται για ένα είδος που απαντάται σε μεγάλο βαθμό σε πεδινά και παρόχθια δάση. Κουρνιάζει συνήθως σε κοιλότητες	Δάση κατακλυζόμενων πεδιάδων, Χαμηλής πυκνότητας κατοικημένες περιοχές / Οικισμοί, Αγροδασικές περιοχές	Χειμερία νάρκη, αναπαραγωγή	*						*			



Είδος		Κατάσταση προστασίας										Περιοχές έργου										
Επιστημονική ονομασία	Κοινή ονομασία	Προεδρικό Διάταγμα 67/1981	Σύμβαση της Βέρνης	Σύμβαση της Βόννης	Σύμβαση της Βαρκελώνης	Οδηγία 92/43/ΕΟΚ	IUCN/Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων ζώων της Ελλάδας	CITES				Οικολογία	Παρουσία εντός της Περιοχής Μελέτης	Ευαίσθητες Οικολογικές Περίοδοι	Πελοπόννησος (Χερσαία Ζώνη)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)	Πατραϊκός Κόλπος	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια Ζώνη & LF5)	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Χερσαία Ζώνη)	Κρήτη (Χερσαία Ζώνη)	Νότιο Αιγαίο Πέλαγος
									μέσα σε τοίχους ή επενδύσεις τοίχων σε σπίτια, καθώς και σε τρύπες μέσα σε δέντρα. Δεν γνωρίζουμε πολλά για τους τόπους διαχείμασης της, αν και πιστεύεται ότι χρησιμοποιεί τις κοιλότητες δέντρων. Είναι ευκίνητη και ίπταται πάνω από υδάτινες επιφάνειες ή γύρω από μικρά ξέφωτα στα δάση. Όπως και η P. ripistrellus, τρέφεται με υδρόβιες σκνίπες, προνύμφες και μύγες.													
<i>Plecotus kolombatovici</i>	Μεσογειακή νυχτερίδα					IV	LC/DD		Η P. kolombatovici, η οποία θεωρείται το μικρότερο είδος Plecotus στην Ευρώπη, καθιερώθηκε πρόσφατα ως πλήρες είδος. Το πρόσωπο και το πηγούνι της είναι πλήρως καλυμμένα με γούνα και διαθέτει καφέ γούνα στη ράχη. Το είδος απαντάται σε καρστικές περιοχές κατά μήκος των ακτών της ανατολικής Μεσογείου. Επίσης κατοικεί σε αγροτικά τοπία και κουρνιάζει μέσα σε σπηλιές, ρωγμές τοίχων και σχισμές βράχων. Είναι ευκίνητη και μπορεί να κάνει ελιγμούς σε περιορισμένους χώρους για να παγιδεύσει τη λεία της (π.χ. σκόρος).	Χαμηλής πυκνότητας κατοικημένες περιοχές / Οικισμοί, Αγροδασικές περιοχές, Εκτάσεις με αραιή βλάστηση	Χειμερία νάρκη, αναπαραγωγή	*						*	*			



Είδος		Κατάσταση προστασίας							Οικολογία	Παρουσία εντός της Περιοχής Μελέτης	Ευαίσθητες Οικολογικές Περίοδοι	Περιοχές έργου									
Επιστημονική ονομασία	Κοινή ονομασία	Προεδρικό Διάταγμα 67/1981	Σύμβαση της Βέρνης	Σύμβαση της Βόννης	Σύμβαση της Βαρκελώνης	Οδηγία 92/43/ΕΟΚ	IUCN/Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων ζώων της Ελλάδας	CITES				Πελοπόννησος (Χερσαία Ζώνη)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)	Πατραϊκός Κόλπος	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια Ζώνη & LF5)	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Χερσαία Ζώνη)	Κρήτη (Χερσαία Ζώνη)	Νότιο Αιγαίο Πέλαγος	Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)	Νότιο Κρητικό Πέλαγος
<i>Plecotus macrobullaris</i>	Αλπική νυχτερίδα					IV	LC/VU		Κατοικεί ως επί το πλείστον σε απόκρημνα ορεινά εδάφη, έως υψόμετρο 2.800 μέτρα, αλλά μπορεί να φτάσει και μέχρι τη στάθμη της θάλασσας σε ορισμένες τοποθεσίες.	Περιοχές με αραιή βλάστηση, Λιβάδια	Χειμερία νάρκη, αναπαραγωγή	*					*				
<i>Stenella coeruleoalba</i>	Ζωνοδέλφινο		II	II	II	IV	LC/VU	II	Το είδος ζει σε όλα τα ανοιχτά ύδατα βάθους άνω των 450-500 μέτρων. Ένα από τα πιο κοινά κητώδη των ελληνικών θαλασσών. Απαντάται σε όλα τα πελαγικά νερά, αλλά και σε παράκτιες περιοχές με βαθιά νερά ή απότομη κλίση.	Πιθανώς να απαντηθεί σε ολόκληρη τη διαδρομή του αγωγού, αν και είναι πιο πιθανό να απαντηθεί σε υπεράκτιες περιοχές.	Περίοδος αναπαραγωγής το φθινόπωρο (Σεπτέμβριος-Νοέμβριος) στη Μεσόγειο.		*			*		*		*	
<i>Sus scrofa</i>	Αγριόχοιρος						LC/NE		Οι αγριόχοιροι μπορεί να απαντηθούν σε διάφορους οικοτόπους. Μπορεί να ζουν σε χλοώδεις σαβάνες, δασώδη δάση, γεωργικές περιοχές, θαμνώδεις εκτάσεις και ελώδεις βάλτους. Χρειάζονται μια κοντινή πηγή νερού και ένα καταφύγιο (πυκνή βλάστηση) για να προστατευτούν και να κρυφτούν από τους θηρευτές τους. Ευδοκιμούν σε διάφορα κλίματα, αλλά γενικά αποφεύγουν την υπερβολική ζέστη ή το κρύο. Σε μέρη που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν δριμείες θερμοκρασίες και αυξημένες χιονοπτώσεις, η	Ευρέως εξαπλωμένο	Αναπαραγωγή	*						*			

Είδος		Κατάσταση προστασίας							Οικολογία	Παρουσία εντός της Περιοχής Μελέτης	Ευαίσθητες Οικολογικές Περίοδοι	Περιοχές έργου									
Επιστημονική ονομασία	Κοινή ονομασία	Προεδρικό Διάταγμα 67/1981	Σύμβαση της Βέρνης	Σύμβαση της Βόννης	Σύμβαση της Βαρκελώνης	Οδηγία 92/43/ΕΟΚ	IUCN/κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων ζώων της Ελλάδας	CITES				Πελοπόννησος (Χερσαία Ζώνη)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)	Πατραϊκός Κόλπος	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια Ζώνη & LF5)	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Χερσαία Ζώνη)	Κρήτη (Χερσαία Ζώνη)	Νότιο Αιγαίο Πέλαγος	Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)	Νότιο Κρητικό Πέλαγος
									πυκνότητα του πληθυσμού μπορεί να περιοριστεί λόγω των πηγών αναζήτησης τροφής. Όταν το χιόνι είναι βαθύ και το έδαφος παγωμένο, η ικανότητά τους να αναζητήσουν τροφή σε ρίζες και φύλλα περιορίζεται.												
Tadarida teniotis	Νυχτονόμος	-	-	II	-	IV	LC/LC	-	Ο νυχτονόμος είναι μια μεγάλη, στιβαρή νυχτερίδα με άνοιγμα φτερών 400-450 mm, μακριά πλατιά αυτιά και βελούδινη μαύρη-γκρι γούνα. Ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι η ουρά της, που εκτείνεται πέρα από τη μεμβράνη και έχει αισθητηριακή λειτουργία. Αυτό το είδος απαντάται σε ορεινές και αστικές περιοχές και είναι γνωστό ότι αναζητά την τροφή της ενώ ίπταται γρήγορα. Τρέφεται με ιπτάμενα έντομα, όπως σκώρο, σφιγγίδες, εποχιακά δίπτερα, νευρόπτερα και σκαθάρια. Η T. teniotis είναι γνωστό ότι είναι ελάχιστα αποδημητική και κατοικεί στις σχισμές βράχων σε γκρεμούς, σπηλιές και γέφυρες τόσο το καλοκαίρι όσο και τον χειμώνα.	Χαμηλής πυκνότητας κατοικημένες περιοχές / Οικισμοί, Εκτάσεις με αραιή βλάστηση	Χειμερία νάρκη, αναπαραγωγή	*				*	*				

Είδος		Κατάσταση προστασίας							Οικολογία	Παρουσία εντός της Περιοχής Μελέτης	Ευαίσθητες Οικολογικές Περίοδοι	Περιοχές έργου										
	Κοινή ονομασία	Προεδρικό Διάταγμα 67/1981	Σύμβαση της Βέρνης	Σύμβαση της Βόννης	Σύμβαση της Βαρκελώνης	Οδηγία 92/43/ΕΟΚ	IUCN/Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων ζώων της Ελλάδας	CITES				Πελοπόννησος (Χερσαία Ζώνη)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)	Πατραϊκός Κόλπος	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια Ζώνη & LF5)	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Χερσαία Ζώνη)	Κρήτη (Χερσαία Ζώνη)	Νότιο Αιγαίο Πέλαγος	Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)	Νότιο Κρητικό Πέλαγος	
Επιστημονική ονομασία																						
Επιστημονική ονομασία	Κοινή ονομασία	Προεδρικό Διάταγμα 67/1981	Σύμβαση της Βέρνης	Σύμβαση της Βόννης	Σύμβαση της Βαρκελώνης	Οδηγία 92/43/ΕΟΚ	IUCN/Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων ζώων της Ελλάδας	CITES	Οικολογία	Παρουσία εντός της Περιοχής Μελέτης	Ευαίσθητες Οικολογικές Περίοδοι	Πελοπόννησος (Χερσαία Ζώνη)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)	Πατραϊκός Κόλπος	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια Ζώνη & LF5)	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Χερσαία Ζώνη)	Κρήτη (Χερσαία Ζώνη)	Νότιο Αιγαίο Πέλαγος	Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)	Νότιο Κρητικό Πέλαγος	
<i>Tursiops truncatus</i>	ΡΙΝΟΔΕΛΦΙΝΟ	ΝΑΙ	II	II	II	II, IV	LC/VU	II	Το είδος απαντάται σε όλες τις παράκτιες περιοχές, τα στενά και τους κόλπους της Ελλάδας, καθώς και γύρω και μεταξύ των νησιών του Ιονίου και από το Θρακικό έως το Λιβυκό Πέλαγος. Ένας απομονωμένος πληθυσμός βρίσκεται στον Αμβρακικό Κόλπο.	Πιθανώς να απαντηθεί σε ολόκληρη τη διαδρομή του αγωγού, αν και είναι πιο πιθανό να απαντηθεί σε παράκτιες περιοχές.	Αναπαραγωγική περίοδος κυρίως την άνοιξη (Μάρτιος-Μάιος).		*		*			*		*		
<i>Vespertilio murinus</i>	Παρδαλονυχτερίδα	-	II	II	-	IV	LC/DD	-	Η παρδαλονυχτερίδα είναι μια μεσαίου μεγέθους (άνοιγμα φτερών 270-310 mm), στιβαρή νυχτερίδα με σκούρο καφέ ρύγχος και μεμβράνη και κοντά πλατιά αυτιά. Η μακριά γούνα της είναι εμφανώς δίχρωμη με σκούρα καφέ βάση και ασημί λευκές άκρες, η οποία προσδίδει σε αυτό το είδος μια μόνιμα «παγωμένη» εμφάνιση. Το είδος αυτό απαντάται τόσο σε αστικές, ορεινές όσο και σε αγροτικές περιοχές. Είναι γνωστό ότι κουρνιάζει σε σχισμές κτιρίων και δέντρων κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Κατά τη διάρκεια του χειμώνα, προτιμά τις ρωγμές στα κτίρια σε σχέση με τις υπόγειες κρύπτες.	Ευρέως εξαπλωμένο	Χειμερία νάρκη, αναπαραγωγή							*				

Είδος		Κατάσταση προστασίας							Οικολογία	Παρουσία εντός της Περιοχής Μελέτης	Ευαίσθητες Οικολογικές Περίοδοι	Περιοχές έργου									
Επιστημονική ονομασία	Κοινή ονομασία	Προεδρικό Διάταγμα 67/1981	Σύμβαση της Βέρνης	Σύμβαση της Βόννης	Σύμβαση της Βαρκελώνης	Οδηγία 92/43/ΕΟΚ	IUCN/κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων ζώων της Ελλάδας	CITES				Πελοπόννησος (Χερσαία Ζώνη)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)	Πατραϊκός Κόλπος	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια Ζώνη & LF5)	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Χερσαία Ζώνη)	Κρήτη (Χερσαία Ζώνη)	Νότιο Αιγαίο Πέλαγος	Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)	Νότιο Κρητικό Πέλαγος
									Έχει γρήγορο και ευκίνητο πέταγμα που θυμίζει το είδος Nyctalus και κυνηγάει συνήθως σμήνη από σκνίπτες και άλλα μικρά έντομα. Αυτό το είδος προτιμά να αναζητά τροφή σε ανοιχτούς χώρους και να χρησιμοποιεί εναέριες τεχνικές hawking. Πρόκειται για αποδημητικό είδος με καταγεγραμμένη απόσταση 1 780 χλμ.												
Vulpes vulpes	Κόκκινη αλεπού	-	-	-	-	-	LC/NE	-	Η κόκκινη αλεπού είναι ένα ευρέως διαδεδομένο, παμφάγο θηλαστικό που ζει σε διάφορα είδη οικοτόπων. Αν και είναι αυτόχθονο είδος στα υπεραιωνόβια δάση της Ευρώπης, οι κόκκινες αλεπούδες απαντώνται πλέον στους περισσότερους τύπους οικοτόπων, συμπεριλαμβανομένων τοπίων που έχουν τροποποιηθεί σημαντικά από τον άνθρωπο. Στην πραγματικότητα, οι κόκκινες αλεπούδες μπορεί να κατοικούν σχεδόν σε οποιοδήποτε περιβάλλον όπου μπορούν να βρουν αρκετή τροφή. Το πλεονέκτημά τους αυτό	Διαδεδομένο	Αναπαραγωγή	*						*			



Είδος		Κατάσταση προστασίας							Οικολογία	Παρουσία εντός της Περιοχής Μελέτης	Ευαίσθητες Οικολογικές Περίοδοι	Περιοχές έργου								
Επιστημονική ονομασία	Κοινή ονομασία	Προεδρικό Διάταγμα 67/1981	Σύμβαση της Βέρνης	Σύμβαση της Βόννης	Σύμβαση της Βαρκελώνης	Οδηγία 92/43/ΕΟΚ	IUCN/Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων ζώων της Ελλάδας	CITES				Πελοπόννησος (Χερσαία Ζώνη)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)	Πατραϊκός Κόλπος	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια Ζώνη & LF5)	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Χερσαία Ζώνη)	Κρήτη (Χερσαία Ζώνη)	Νότιο Αιγαίο Πέλαγος	Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)
									τους επέτρεψε να επεκταθούν σε μεγάλη εμβέλεια.											
<i>Ziphius cavirostris</i>	Ζιφιός	-	II	I, II	II	IV	LC/DD	II	Το είδος απαντάται συχνά στην ανατολική Μεσόγειο και καταδύεται σε βάθη έως και 1950 μέτρα, με αποτέλεσμα να χαρακτηρίζεται ως τροφοδότης εξαιρετικά βαθέων υδάτων. Εικάζεται ότι αυτό το αρπακτικό μπορεί να είναι υπεύθυνο για τα ενδείξεις αυλάκωσης που παρατηρούνται στα ηφαίστεια ιλύος νότια της Ελληνικής Τάφρου νότια της Κρήτης. Αν αυτό αποδειχθεί σωστό, το είδος είναι πιθανό να είναι τακτικός τροφοδότης βαθέων υδάτων σε ηφαίστεια ιλύος σε όλη την ανατολική Μεσόγειο.	Μπορεί να απαντηθεί σε όλο το τμήμα OSS4 στον Πατραϊκό Κόλπο. Το είδος είναι λιγότερο πιθανό να απαντηθεί στην περιοχή μελέτης των OSS3/OSS3N και OSS2/OSS2N. Μπορεί να απαντηθεί στη ζώνη Nearshore της τοποθεσίας LF4. Το είδος είναι λιγότερο πιθανό να απαντηθεί στην περιπαράλια ζώνη της τοποθεσίας LF3.	Αναπαραγωγική περίοδος όλο τον χρόνο.		*	*	*			*	*	
<i>Pseudorca crassidens</i>	Ψευδόρκα	-	II	-	II	IV	NT/NE	II	Οι ψευδόρκες απαντώνται συνήθως σε τροπικές περιοχές, αλλά και σε εύκρατες θάλασσες, καθώς έχουν εντοπιστεί και στη Μεσόγειο. Επισκέπτονται τα παράκτια νερά αλλά προτιμούν να παραμένουν σε βαθύτερα νερά. Είναι γνωστό ότι καταδύονται σε βάθος έως και 2.000 μέτρα.	Το είδος είναι λιγότερο πιθανό να απαντηθεί στην περιοχή μελέτης.	Περίοδος αναπαραγωγής όλο τον χρόνο με σημεία κορύφωσης στις αρχές του χειμώνα (Νοέμβριος-Δεκέμβριος) και στις αρχές της άνοιξης		*		*			*	*	

Είδος		Κατάσταση προστασίας							Οικολογία	Παρουσία εντός της Περιοχής Μελέτης	Ευαίσθητες Οικολογικές Περίοδοι	Περιοχές έργου									
Επιστημονική ονομασία	Κοινή ονομασία	Προεδρικό Διάταγμα 67/1981	Σύμβαση της Βέρνης	Σύμβαση της Βόννης	Σύμβαση της Βαρκελώνης	Οδηγία 92/43/ΕΟΚ	IUCN/Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων ζώων της Ελλάδας	CITES				Πελοπόννησος (Χερσαία Ζώνη)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)	Πατραϊκός Κόλπος	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια Ζώνη & LF5)	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Χερσαία Ζώνη)	Κρήτη (Χερσαία Ζώνη)	Νότιο Αιγαίο Πέλαγος	Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)	Νότιο Κρητικό Πέλαγος
											(Μάρτιος-Απρίλιος).										
<i>Balaenoptera acutorostrata</i>	Ρυγχοφάλαινα	NAI	II	-	II	IV	LC/NE	I	Οι ρυγχοφάλαινες έχουν παγκόσμια εξάπλωση, απαντώνται σε όλους τους ωκεανούς και σε ορισμένες γειτονικές θάλασσες. Φαίνεται να προτιμούν τις ψυχρότερες περιοχές από τις τροπικές. Αν και δεν θεωρούνται «παράκτιες», αυτές οι φάλαινες σπάνια απομακρύνονται σε απόσταση άνω των 169 χιλιομέτρων από την ξηρά. Επίσης συνήθως εισέρχονται σε εκβολές ποταμών, όρμους, φιόρδ και λιμνοθάλασσες. Είναι επίσης γνωστό ότι μπορεί να φτάσουν και μέχρι πολικά στρώματα πάγου από άλλα είδη <i>rorqual</i> .	Το είδος είναι λιγότερο πιθανό να απαντηθεί στην περιοχή μελέτης.	Η περίοδος αναπαραγωγής είναι μεγάλη, από τον Δεκέμβριο έως τον Μάιο έως όλο το χρόνο σε πιο εύκρατες περιοχές. Οι μήνες κορύφωσης των γεννήσεων είναι ο Δεκέμβριος και ο Ιούνιος.		*		*			*		*	
									Ερπετά												
<i>Ablepharus kitaibelii</i>	Αβλέφαρος	-	II	-	-	IV	LC/LC	-	Το <i>A. kitaibelii</i> είναι ένα ντροπαλό είδος, που ζει κάτω από πέτρες και προτιμά τα ξηρά μέρη, όπως νότιες πλαγιές, χωράφια και λιβάδια. Εμφανίζεται στο λυκόφως και κυνηγά έντομα και μικρά σαλιγκάρια. Κατοικεί συνήθως στο έδαφος και αντιπαθεί να αναρριχάται.	Περιοχές με αραιή βλάστηση, Λιβάδια	Χειμέρια νάρκη	*					*				

Είδος		Κατάσταση προστασίας							Οικολογία	Παρουσία εντός της Περιοχής Μελέτης	Ευαίσθητες Οικολογικές Περίοδοι	Περιοχές έργου									
Επιστημονική ονομασία	Κοινή ονομασία	Προεδρικό Διάταγμα 67/1981	Σύμβαση της Βέρνης	Σύμβαση της Βόννης	Σύμβαση της Βαρκελώνης	Οδηγία 92/43/ΕΟΚ	IUCN/Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων ζώων της Ελλάδας	CITES				Πελοπόννησος (Χερσαία Ζώνη)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)	Πατραϊκός Κόλπος	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια Ζώνη & LF5)	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Χερσαία Ζώνη)	Κρήτη (Χερσαία Ζώνη)	Νότιο Αιγαίο Πέλαγος	Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)	Νότιο Κρητικό Πέλαγος
<i>Algyroides moreoticus</i>	Σαύρα του Μοριά	ΝΑΙ	II	-	-	IV	NT/NT	-	Η σαύρα του Μοριά είναι ενδημικό είδος της Πελοποννήσου και των αναφερόμενων Ιονίων Νήσων. Ζει σε σχετικά υγρούς και σκιερούς οικοτόπους και παρατηρείται συχνά να λιάζεται σε ξύλα ή κορμούς δέντρων αργά το απόγευμα. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, το είδος αυτό συνήθως κρύβεται.	Περιοχές με αραιή βλάστηση, Μεταβατικοί δασώδεις θάμνοι-δασικές εκτάσεις, Σκληρόφυλλη βλάστηση	Χειμέρια νάρκη	*									
<i>Algyroides nigropunctatus</i>	Σαύρα του Ιονίου	ΝΑΙ	II			IV	LC/LC		Οφείλει την κοινή ονομασία της στον λαμπερό μπλε λαιμό των αρσενικών την εποχή του ζευγαρώματος. Μερικές φορές έχουν και τα θηλυκά μπλε λαιμό που είναι λιγότερο φωτεινός. Το υπόλοιπο σώμα της είναι ανοιχτό καφέ έως πιο σκούρο καφέ, η κοιλιά της είναι λευκή έως κιτρινωπή. Οι φυσικοί οικοτόποι της A. nigropunctatus είναι θαμνώδης βλάστηση μεσογειακού τύπου, βραχώδεις περιοχές, καλλιεργήσιμη γη, βοσκοτόπια, φυτείες, αγροτικοί κήποι και αστικές περιοχές. Τρέφεται με έντομα, σκουλήκια και άλλα μικρά ασπόνδυλα. Της αρέσει να αναρριχάται.	Περιοχές με αραιή βλάστηση, Χαμηλής πυκνότητας κατοικημένες περιοχές / Οικισμοί, Περιοχές με σύνθετες καλλιέργειες, Αγροδασικές εκτάσεις	Χειμέρια νάρκη					*					
<i>Caretta caretta</i>	Καρέτα καρέτα	ΝΑΙ	I, II	I, II	II	II,IV	VU/EN	I	Μεταναστευτικό είδος. Περνά από δύο οικολογικές φάσεις, την	Πιθανό να απαντηθεί στο σύνολο της περιοχής	Περίοδοι φωλεοποίησης		*	*	*	*		*	*	*	

Είδος		Κατάσταση προστασίας							Οικολογία	Παρουσία εντός της Περιοχής Μελέτης	Ευαίσθητες Οικολογικές Περίοδοι	Περιοχές έργου									
Επιστημονική ονομασία	Κοινή ονομασία	Προεδρικό Διάταγμα 67/1981	Σύμβαση της Βέρνης	Σύμβαση της Βόννης	Σύμβαση της Βαρκελώνης	Οδηγία 92/43/ΕΟΚ	IUCN/Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων ζώων της Ελλάδας	CITES				Πελοπόννησος (Χερσαία Ζώνη)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)	Πατραϊκός Κόλπος	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια Ζώνη & LF5)	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Χερσαία Ζώνη)	Κρήτη (Χερσαία Ζώνη)	Νότιο Αιγαίο Πέλαγος	Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)	Νότιο Κρητικό Πέλαγος
									«ωκεάνια», στην οποία ζει στην ανοιχτή θάλασσα και τρέφεται με πελαγικούς οργανισμούς και τη «νεριτική», στην οποία συχνάζει στα παράκτια νερά και τρέφεται με βενθικούς οργανισμούς.	μελέτης. Τα υπάρχοντα δεδομένα αποκαλύπτουν ωστόσο ότι οι χελώνες καρέτα-καρέτα φαίνεται να αφθονούν περισσότερο στις ακόλουθες θαλάσσιες περιοχές: Ιόνιο Πέλαγος, Ζάκυνθος και δυτική Πελοπόννησος, Αμβρακικός κόλπος, Μεσσηνιακός κόλπος, Αργολικός κόλπος, Λακωνικός κόλπος, Σαρωνικός κόλπος, Κρήτη, νοτιοανατολικό Αιγαίο, βόρειο Αιγαίο (Margaritoulis et Panagopoulou, “Sea Turtles in the Mediterranean: Distribution, Threats and Conservation Priorities, 2010”). Τοποθεσίες φωλεοποίησης σε παραλίες, 50m και 450 – 500m από την θέση προσαιγιάλωσης LF3	και εκκόλαψης (Μάιος – Σεπτέμβριος)										

Είδος		Κατάσταση προστασίας							Οικολογία	Παρουσία εντός της Περιοχής Μελέτης	Ευαίσθητες Οικολογικές Περίοδοι	Περιοχές έργου										
Επιστημονική ονομασία	Κοινή ονομασία	Προεδρικό Διάταγμα 67/1981	Σύμβαση της Βέρνης	Σύμβαση της Βόννης	Σύμβαση της Βαρκελώνης	Οδηγία 92/43/ΕΟΚ	IUCN/Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων ζώων της Ελλάδας	CITES				Πελοπόννησος (Χερσαία Ζώνη)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)	Πατραϊκός Κόλπος	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια Ζώνη & LF5)	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Χερσαία Ζώνη)	Κρήτη (Χερσαία Ζώνη)	Νότιο Αιγαίο Πέλαγος	Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)	Νότιο Κρητικό Πέλαγος	
<i>Chalcides ocellatus</i>	Λιακόνι	-	II	-	-	IV	-	-	Πολύ ευκίνητο και απαντάται συνήθως σε άνυδρες περιοχές. Τα θηλυκά του είδους γεννούν 2-6 ζωντανά νεογνά με ζωοτοκία. Το <i>Chalcides ocellatus</i> θεωρείται γενικευμένο είδος και μπορεί να απαντηθεί σε διάφορα περιβάλλοντα, όπως γεωργικές εκτάσεις και ερήμους με χαλίκια γύρω από τις ακτές της Μεσογείου. Η κύρια τακτική διαφυγής του από τα αρπακτικά είναι να κρύβεται πίσω από τη βλάστηση, πιθανότατα επειδή δεν μπορεί να τρέχει πολύ γρήγορα. Το λιακόνι είναι κυρίως εντομοφάγο. Στην άγρια φύση, έχει καταγραφεί ότι τρώει διάφορα είδη εντόμων, όπως ακρίδες, γρύλους, μυρμήγκια, σκαθάρια, ισόποδα, αράχνες, χιλιόποδα και προνύμφες εντόμων. Ωστόσο, είναι επίσης γνωστό ότι τρώει περιστασιακά μικρές σαύρες, συμπεριλαμβανομένων των νεογνών τους, καθώς οι ουρές νεογνών σαυρών είναι συχνό εύρημα στο περιεχόμενο του στομάχου του <i>Chalcides ocellatus</i> .	Αρδευόμενη γη, Μόνιμες καλλιέργειες, Περιοχές με σύνθετες καλλιέργειες, Αγροδασικές περιοχές, Περιοχές με αραιή βλάστηση	Χειμέρια νάρκη	*						*				



Είδος		Κατάσταση προστασίας										Περιοχές έργου									
Επιστημονική ονομασία	Κοινή ονομασία	Προεδρικό Διάταγμα 67/1981	Σύμβαση της Βέρνης	Σύμβαση της Βόννης	Σύμβαση της Βαρκελώνης	Οδηγία 92/43/ΕΟΚ	IUCN/Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων ζώων της Ελλάδας	CITES				Πελοπόννησος (Χερσαία Ζώνη)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)	Πατραϊκός Κόλπος	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια Ζώνη & LF5)	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Χερσαία Ζώνη)	Κρήτη (Χερσαία Ζώνη)	Νότιο Αιγαίο Πέλαγος	Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)	Νότιο Κρητικό Πέλαγος
Chelonia mydas	Πράσινη θαλασσοχελώνα	NAI	I, II	I, II	II	II, IV	EN/EN	I	Άκρως μεταναστευτικό είδος, με μεγάλη σύνδεση τόσο ως προς την περιοχή φωλεοποίησης όσο και ως προς την περιοχή σίτισης, στην οποία πηγαίνει ακολουθώντας την ίδια διαδρομή.	Πιθανώς να απαντηθεί στην περιοχή μελέτης, αν και σε πολύ μικρότερη πυκνότητα από τις χελώνες καρέτα καρέτα. Περιοχή αναζήτησης τροφής (αναπτυξιακός βιότοπος) νεογνών, που τρέφονται με θαλάσσια χόρτα, έχει καταγραφεί στη νότια Πελοπόννησο (Λακωνικός κόλπος). Περαιτέρω, τα δεδομένα προσάραξης δείχνουν συχνότερη παρουσία ενήλικων πράσινων θαλασσοχελωνών στο νοτιοανατολικό Αιγαίο (ιδίως στα ύδατα γύρω από τη Ρόδο) (Margaritoulis et Panagopoulou, “Sea Turtles in the Mediterranean: Distribution, Threats and Conservation Priorities, 2010”).	Αναπαραγωγική περίοδος Μάιος–Αύγουστος.		*	*	*	*		*	*	*	

Είδος		Κατάσταση προστασίας							Οικολογία	Παρουσία εντός της Περιοχής Μελέτης	Ευαίσθητες Οικολογικές Περίοδοι	Περιοχές έργου									
Επιστημονική ονομασία	Κοινή ονομασία	Προεδρικό Διάταγμα 67/1981	Σύμβαση της Βέρνης	Σύμβαση της Βόννης	Σύμβαση της Βαρκελώνης	Οδηγία 92/43/ΕΟΚ	IUCN/κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων ζώων της Ελλάδας	CITES				Πελοπόννησος (Χερσαία Ζώνη)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)	Πατραϊκός Κόλπος	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια Ζώνη & LF5)	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Χερσαία Ζώνη)	Κρήτη (Χερσαία Ζώνη)	Νότιο Αιγαίο Πέλαγος	Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)	Νότιο Κρητικό Πέλαγος
<i>Coronella austriaca</i>	Ασινόφιδο	NAI	II	-	-	IV	LC/LC	-	Ημερόβιο, ντροπαλό και μυστικοπαθές φίδι που αποφεύγει τις υψηλές θερμοκρασίες. Μερικές φορές, εάν οι θερμοκρασίες είναι υψηλές, μπορεί να κυκλοφορεί και τη νύχτα. Απαντάται σε υψόμετρα που ξεκινούν συνήθως από 200 μέτρα και ξεπερνούν τα 2.500 μέτρα. Κινείται κυρίως στο έδαφος, αλλά σκαρφαλώνει και σε θάμνους και κοντά δέντρα. Τρέφεται κυρίως με σαύρες, αλλά και με μικρά θηλαστικά, μικρά φίδια, αυγά ερπετών και φωλιές. Αναπαράγεται συνήθως τον Απρίλιο και τα θηλυκά γεννούν 2-19 απογόνους. Δαγκώνει αν παγιδευτεί και παράγει μια δύσοσμη έκκριση από τους πρωκτικούς αδένες, ως μέσο άμυνας. Ακίνδυνο είδος φιδιού.	Ευρέως εξαπλωμένο.	Χειμέρια νάρκη	*									
<i>Dermochelys coriacea</i>	Δερματοχελώνα	NAI	II	I, II	II	IV	VU/CR	I	Δεν αναπαράγεται στη Μεσόγειο και ως εκ τούτου θεωρείται «είδος επισκέπτης» από τον Ατλαντικό.	Πιθανή παρουσία στην περιοχή μελέτης. Ως είδος επισκέπτη στη Μεσόγειο από τον Ατλαντικό, απαντάται επίσης στις ελληνικές θάλασσες αλλά όχι συχνά. Δεν είναι γνωστές	Αναπαραγωγική περίοδος Μάιος–Αύγουστος.	*		*		*		*	*	*	

Είδος		Κατάσταση προστασίας										Περιοχές έργου									
Επιστημονική ονομασία	Κοινή ονομασία	Προεδρικό Διάταγμα 67/1981	Σύμβαση της Βέρνης	Σύμβαση της Βόννης	Σύμβαση της Βαρκελώνης	Οδηγία 92/43/ΕΟΚ	IUCN/Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων ζώων της Ελλάδας	CITES				Πελοπόννησος (Χερσαία Ζώνη)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)	Πατραϊκός Κόλπος	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια Ζώνη & LF5)	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Χερσαία Ζώνη)	Κρήτη (Χερσαία Ζώνη)	Νότιο Αιγαίο Πέλαγος	Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)	Νότιο Κρητικό Πέλαγος
										συγκεκριμένες θαλάσσιες περιοχές πέρα από 11 δείγματα που καταγράφηκαν στο Αιγαίο Πέλαγος (συμπεριλαμβανομένου του Παγασητικού Κόλπου και του Κορινθιακού Κόλπου), όλα βορειότερα των 38ο Β Ν Margaritoulis, 1986											
<i>Dolichophis caspius</i>	Έφιος	-	II	-	-	IV	LC/LC	-	Κοινό είδος οχιάς που απαντάται στα Βαλκάνια και σε περιοχές της Ανατολικής Ευρώπης. Αρπακτικό που τρέφεται με διάφορα σπονδυλωτά. Η διατροφή του μπορεί να περιλαμβάνει μικρά θηλαστικά, σαύρες, πουλιά και άλλα φίδια. Αν και δεν είναι δηλητηριώδες, ο εφίος θεωρείται «άγριο» και επιτίθεται με μεγάλη ταχύτητα και χωρίς προειδοποίηση. Λόγω της ικανότητάς του να καταναλώνει τρωκτικά που μπορεί να βλάψουν τις καλλιέργειες, θεωρείται ως ένα φυσικό παρασιτοκτόνο.	Ευρέως εξαπλωμένο	Χειμέρια νάρκη							*			
<i>Elaphe quatuorlineata</i>	Λαφιάτης	NAI	I, II	-	-	II, IV	NT/LC	-	Απαντάται σε οικοτόπους με βλάστηση, πέτρινους τοίχους, αραιές	Ευρείας εμβέλειας	Χειμέρια νάρκη	*					*				

Είδος		Κατάσταση προστασίας							Οικολογία	Παρουσία εντός της Περιοχής Μελέτης	Ευαίσθητες Οικολογικές Περίοδοι	Περιοχές έργου									
Επιστημονική ονομασία	Κοινή ονομασία	Προεδρικό Διάταγμα 67/1981	Σύμβαση της Βέρνης	Σύμβαση της Βόννης	Σύμβαση της Βαρκελώνης	Οδηγία 92/43/ΕΟΚ	IUCN/Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων ζώων της Ελλάδας	CITES				Πελοπόννησος (Χερσαία Ζώνη)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)	Πατραϊκός Κόλπος	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια Ζώνη & LF5)	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Χερσαία Ζώνη)	Κρήτη (Χερσαία Ζώνη)	Νότιο Αιγαίο Πέλαγος	Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)	Νότιο Κρητικό Πέλαγος
									δασικές εκτάσεις, στα όρια δασών και ερημικά κτίρια. Τον χειμώνα, περνά τον χρόνο του σε ερημικά λαγούμια τρωκτικών σε ομάδες των τεσσάρων έως επτά. Η συμπεριφορά του είναι γενικά πιο ήρεμη από εκείνη άλλων φιδιών (συρίζει ή επιτίθεται σπάνια) και δραστηριοποιείται συνήθως το πρωί και αργά το απόγευμα. Είναι εξαιρετικός ορειβάτης και σκαρφαλώνει συχνά στις κορυφές των δέντρων												
<i>Emys orbicularis</i>	Στικτή νεροχελώνα	ΝΑΙ	II	-	-	II, IV	NT/NT	-	Η <i>E. orbicularis</i> προτιμά να ζει σε υγροτόπους που περιβάλλονται από μεγάλο ποσοστό φυσικού, δασώδους τοπίου. Τρέφεται επίσης σε ορεινά περιβάλλοντα. Συνήθως θεωρείται ημι-υδρόβια, καθώς μπορεί να κινείται στην ξηρά σε αποστάσεις έως 1 km (0,62 mi) και περιστασιακά μπορεί να βρεθεί έως και 4 km (2,5 mi) μακριά από το νερό.	Λίμνες, Δάση κατακλυζόμενων πεδιάδων, εσωτερικά έλη	Αναπαραγωγή	*						*			
<i>Eryx jaculus</i>	Ερημόφιδο	-	III	-	-	IV	LC/LC	II	Κυρίως νυχτόβιο φίδι. Μπορεί επίσης να το δει κανείς την ημέρα την άνοιξη και το φθινόπωρο. Έχει χαρακτηριστική αμβλεία ουρά. Αναζητά το θήραμά του σε στοές	Εκτάσεις με αραιά βλάστηση, καλλιεργήσιμες εκτάσεις	Χειμέρια νάρκη	*						*			

Είδος		Κατάσταση προστασίας							Οικολογία	Παρουσία εντός της Περιοχής Μελέτης	Ευαίσθητες Οικολογικές Περίοδοι	Περιοχές έργου									
		Προεδρικό Διάταγμα 67/1981	Σύμβαση της Βέρνης	Σύμβαση της Βόννης	Σύμβαση της Βαρκελώνης	Οδηγία 92/43/ΕΟΚ	IUCN/Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων ζώων της Ελλάδας	CITES				Πελοπόννησος (Χερσαία Ζώνη)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)	Πατραϊκός Κόλπος	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια Ζώνη & LF5)	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Χερσαία Ζώνη)	Κρήτη (Χερσαία Ζώνη)	Νότιο Αιγαίο Πέλαγος	Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)	Νότιο Κρητικό Πέλαγος
Επιστημονική ονομασία	Κοινή ονομασία								τρωκτικών, ενώ επίσης κάνει ενέδρες κάτω από την άμμο ή χαλαρά εδάφη όπου μπορεί να κρυφτεί ιδιαίτερα επιδέξια. Τρέφεται κυρίως με τρωκτικά, αλλά και σαύρες, νεοσσούς και μερικές φορές με μεγάλα ασπόνδυλα. Αναπαράγεται από τον Απρίλιο έως τον Μάιο και τα θηλυκά γεννούν 5-20 απογόνους μήκους περίπου 12-15 cm. Είναι το μοναδικό φίδι στην Ευρώπη. Ακίνδυνο είδος φιδιού.												
<i>Hellenolacerta graeca</i>	Ελληνική σαύρα	ΝΑΙ	II	-	-	IV	NT/VU	-	Η ελληνική σαύρα είναι ενδημική στη νότια Ελλάδα, όπου απαντάται μόνο στην περιοχή της Πελοποννήσου, σε υψόμετρα έως και 1.600 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, αλλά συνήθως σε περιοχές με υψόμετρο από 300 έως 700 μέτρα. Απαντάται συνήθως κοντά σε ρυάκια και λίμνες, σε ελαφρά δάση, στις παρυφές των αγρών που συνορεύουν με δασικές εκτάσεις και σε σκιερές περιοχές με βράχια ή πέτρες (βραχώδεις βιότοποι με αρκετή υγρασία). Η ελληνική σαύρα είναι ευκίνητο είδος και σκαρφαλώνει σε βράχους, τοίχους,	Δάση κατακλυζόμενων πεδιάδων, Λίμνες, Περιοχές με αραιή βλάστηση, Μεταβατικοί δασώδεις θάμνοι-δασικές εκτάσεις	Χειμέρια νάρκη	*									

Είδος		Κατάσταση προστασίας							Οικολογία	Παρουσία εντός της Περιοχής Μελέτης	Ευαίσθητες Οικολογικές Περίοδοι	Περιοχές έργου									
Επιστημονική ονομασία	Κοινή ονομασία	Προεδρικό Διάταγμα 67/1981	Σύμβαση της Βέρνης	Σύμβαση της Βόννης	Σύμβαση της Βαρκελώνης	Οδηγία 92/43/ΕΟΚ	IUCN/Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων ζώων της Ελλάδας	CITES				Πελοπόννησος (Χερσαία Ζώνη)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)	Πατραϊκός Κόλπος	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια Ζώνη & LF5)	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Χερσαία Ζώνη)	Κρήτη (Χερσαία Ζώνη)	Νότιο Αιγαίο Πέλαγος	Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)	Νότιο Κρητικό Πέλαγος
									στηθαία και κορμούς δέντρων, αλλά αποφεύγει να παραμένει για παρατεταμένες περιόδους στον ήλιο. Αν και προτιμά να αναρριχάται, μερικές φορές αναζητά τροφή στο έδαφος. Το θηλυκό γεννά μία μόνο ομάδα έως και έξι αυγών, μέσα σε κάποια σχισμή ή απομονωμένη περιοχή, και τα αυγά χρειάζονται περίπου έξι εβδομάδες για να εκκολαφθούν. Όταν η σαύρα θυμώσει μπορεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, να εκτοξεύσει οξύ στα άλλα ζώα που την ενοχλούν.												
<i>Hierophis gemonensis</i>	Δεντρογαλιά	ΝΑΙ	III	-	-	IV	LC/LC	-	Μη δηλητηριώδες. Συνολικό μήκος έως 100 cm, συνήθως λιγότερο και σπάνια έως 130 cm. Απαντάται σε ποικίλους οικοτόπους σε υψόμετρα έως και 1.400 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας. Ημερόβιο, γρήγορο και πολύ δραστήριο φίδι. Κυνηγάει συνήθως στο έδαφος αλλά σκαρφαλώνει και σε θάμνους και μικρά δέντρα. Τρέφεται με μικρά τρωκτικά, ερπετά, μικρά πουλιά και μεγάλα ασπόνδυλα. Αναπαράγεται την άνοιξη και τα θηλυκά γεννούν 3-	Ευρέως εξαπλωμένο	Χειμέρια νάρκη	*						*			

Είδος		Κατάσταση προστασίας							Οικολογία	Παρουσία εντός της Περιοχής Μελέτης	Ευαίσθητες Οικολογικές Περίοδοι	Περιοχές έργου									
Επιστημονική ονομασία	Κοινή ονομασία	Προεδρικό Διάταγμα 67/1981	Σύμβαση της Βέρνης	Σύμβαση της Βόννης	Σύμβαση της Βαρκελώνης	Οδηγία 92/43/ΕΟΚ	IUCN/Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων ζώων της Ελλάδας	CITES				Πελοπόννησος (Χερσαία Ζώνη)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)	Πατραϊκός Κόλπος	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια Ζώνη & LF5)	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Χερσαία Ζώνη)	Κρήτη (Χερσαία Ζώνη)	Νότιο Αιγαίο Πέλαγος	Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)	Νότιο Κρητικό Πέλαγος
									10 αυγά. Μπορεί να δαγκώσει αν εγκλωβιστεί. Ακίνδυνο είδος φιδιού.												
<i>Lacerta trilineata</i>	Τρανόσαυρα	NAI	II	-	-	IV	LC/LC	-	Η <i>Lacerta trilineata</i> είναι η μεγαλύτερη πράσινη σαύρα. Ζει σε περιοχές με πυκνή βλάστηση σε απόσταση τουλάχιστον 1.500 μέτρα από τη στάθμη της θάλασσας έως τα βουνά. Τα νεογνά της εμφανίζουν συχνά ανοιχτόχρωμες πλάγιες γραμμές στη ράχη και μια ανοιχτόχρωμη γραμμή στη σπονδυλική στήλη. Τα ενήλικα ωστόσο φίδια δεν έχουν αυτή τη γραμμή στη σπονδυλική στήλη. Η ανοιχτόχρωμη αυτή γραμμή είναι επίσης αυτό που κάνει τα νεαρά είδη <i>Lacerta trilineata</i> να ξεχωρίζουν από άλλα μικρά <i>Lacertids</i> (π.χ. είδη <i>Podarcis</i>).	Σκληρόφυλλη βλάστηση, Αγροδασικές περιοχές, Δάση κατακλυζόμενων πεδιάδων (Παρόχθιο δάσος/Ποταμιαίο δάσος), Μεσογειακά δάση φυλλοβόλων, Μεσογειακά δάση κωνοφόρων, Μικτά δάση	Χειμέρια νάρκη	*					*				
<i>Lacerta viridis</i>	Πράσινη σαύρα	NAI	II	-	-	IV	LC/LC	-	Συχνά απαντάται να λιάζεται σε βράχους ή στο γρασίδι ή βρίσκει καταφύγιο ανάμεσα στους θάμνους. Απαντάται σε υψόμετρα έως και 2.200 m (7.218 πόδια) πάνω από τη στάθμη της θάλασσας και ο τυπικός βιότοπός της είναι οι πυκνές θαμνώδεις εκτάσεις σε ανοιχτά δάση, οι φράχτες, τα όρια	Ευρέως εξαπλωμένη σε εκτάσεις με πυκνή θαμνώδη βλάστηση	Χειμέρια νάρκη							*			

Είδος		Κατάσταση προστασίας							Οικολογία	Παρουσία εντός της Περιοχής Μελέτης	Ευαίσθητες Οικολογικές Περίοδοι	Περιοχές έργου									
Επιστημονική ονομασία	Κοινή ονομασία	Προεδρικό Διάταγμα 67/1981	Σύμβαση της Βέρνης	Σύμβαση της Βόννης	Σύμβαση της Βαρκελώνης	Οδηγία 92/43/ΕΟΚ	IUCN/Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων ζώων της Ελλάδας	CITES				Πελοπόννησος (Χερσαία Ζώνη)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)	Πατραϊκός Κόλπος	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια Ζώνη & LF5)	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Χερσαία Ζώνη)	Κρήτη (Χερσαία Ζώνη)	Νότιο Αιγαίο Πέλαγος	Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)	Νότιο Κρητικό Πέλαγος
									αγροτεμαχίων, τα αναχώματα και τα αλσύλλια. Στα βορειότερα μέρη απαντάται σε θαμνώδεις ερείδες και στα νότια προτιμά τις υγρές τοποθεσίες.												
<i>Mauremys rivulata</i>	Γραμμωτή νεροχελώνα	NAI	III	-	-	II, IV	LC/LC	-	Η <i>Mauremys rivulata</i> απαντάται σε μεγάλους πληθυσμούς σχεδόν σε οποιοδήποτε μόνιμο όγκο γλυκών υδάτων εντός της εμβέλειάς της. Ζει και σε αρδευτικά κανάλια και είναι αρκετά ανεκτική στο υφάλμυρο νερό	Λίμνες, ποτάμια, γεωργικές περιοχές, εσωτερικά έλη	Αναπαραγωγή	*			*						
<i>Mediodactylus kotschy</i>	Κυρτοδάκτυλος	NAI	II	-	-	IV	LC/LC	-	Απαντάται σε ξηρές και πετρώδεις περιοχές (συχνά σε κτίρια). Ημερόβιο ερπετό σε περιόδους σχετικά χαμηλών θερμοκρασιών, αλλά νυκτόβιο κατά τις υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού.	Ευρέως εξαπλωμένη, επομένως είναι πιθανό να βρεθεί εντός της Περιοχής μελέτης.	Χειμέρια νάρκη	*			*	*		*			
<i>Natrix tessellata</i>	Λιμνόφιδο	NAI	II	-	-	IV	LC/LC	-	Ζει μόνο σε υγροτόπους και ποτάμια, περνώντας το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας κυνηγώντας μέσα στο νερό. Εμφανίζεται σε υψόμετρα έως 2.200 μέτρα, αλλά συνήθως χαμηλότερα από 1.000 μέτρα. Είναι κυρίως ημερόβιο, αν και μερικές φορές δραστηριοποιείται τη νύχτα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Αλλάζει πολλά χρώματα και σχέδια. Κολυμπά πολύ επιδέξια και γρήγορα. Τρέφεται	Ποτάμια, λίμνες	Χειμέρια νάρκη	*			*						

Είδος		Κατάσταση προστασίας							Οικολογία	Παρουσία εντός της Περιοχής Μελέτης	Ευαίσθητες Οικολογικές Περίοδοι	Περιοχές έργου									
Επιστημονική ονομασία	Κοινή ονομασία	Προεδρικό Διάταγμα 67/1981	Σύμβαση της Βέρνης	Σύμβαση της Βόννης	Σύμβαση της Βαρκελώνης	Οδηγία 92/43/ΕΟΚ	IUCN/Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων ζώων της Ελλάδας	CITES				Πελοπόννησος (Χερσαία Ζώνη)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)	Πατραϊκός Κόλπος	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια Ζώνη & LF5)	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Χερσαία Ζώνη)	Κρήτη (Χερσαία Ζώνη)	Νότιο Αιγαίο Πέλαγος	Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)	Νότιο Κρητικό Πέλαγος
									αποκλειστικά με ψάρια και αμφίβια. Ζευγαρώνει την άνοιξη και το καλοκαίρι τα θηλυκά γεννούν 5-25 αυγά. Αν πιαστεί και νιώσει ότι απειλείται, εκκρίνει ένα πολύ δύσοσμο υγρό και συρίζει. Συχνά προσποιείται ότι είναι νεκρό γυρίζοντας ανάποδα, με ανοιχτό το στόμα και τη γλώσσα να προεξέχει. Είναι εξαιρετικά σπάνιο να δαγκώσει, εάν το χειριστούμε σωστά. Εντελώς ακίνδυνο είδος φιδιού.												
<i>Ophiomorus punctatissimus</i>	Οφιόμορος		II			IV	LC/LC		Άποδη σαύρα με συνολικό μήκος (συμπεριλαμβανομένης της ουράς) έως 18 cm. Αποφεύγει τις υψηλές θερμοκρασίες και συνήθως κινείται κάτω από βράχους, πέτρες και κορμούς όπου κυνηγά μικρά ασπόνδυλα. Προτιμά οικοτόπους με χαμηλή βλάστηση, έως 900 μέτρα από τη στάθμη της θάλασσας. Τα θηλυκά γεννούν 2-4 αυγά.	Περιοχές με αραιή βλάστηση, Λιβάδια, Αγροδοασικές περιοχές	Χειμέρια νάρκη	*									
<i>Platycephus najadum</i>	Σαΐτα		III			IV	LC/LC		Εμφανίζεται σε ξηρά και ξηρικά περιβάλλοντα σε ένα ευρύ φάσμα οικοτόπων: σε βραχώδεις εκτάσεις, σε δάση, θάμνους και γεωργικές εκτάσεις από τη στάθμη της θάλασσας έως τα 2.000 μέτρα	Ευρέως εξαπλωμένο	Χειμέρια νάρκη	*					*				

Είδος		Κατάσταση προστασίας							Οικολογία	Παρουσία εντός της Περιοχής Μελέτης	Ευαίσθητες Οικολογικές Περίοδοι	Περιοχές έργου									
Επιστημονική ονομασία	Κοινή ονομασία	Προεδρικό Διάταγμα 67/1981	Σύμβαση της Βέρνης	Σύμβαση της Βόννης	Σύμβαση της Βαρκελώνης	Οδηγία 92/43/ΕΟΚ	IUCN/κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων ζώων της Ελλάδας	CITES				Πελοπόννησος (Χερσαία Ζώνη)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)	Πατραϊκός Κόλπος	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια Ζώνη & LF5)	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Χερσαία Ζώνη)	Κρήτη (Χερσαία Ζώνη)	Νότιο Αιγαίο Πέλαγος	Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)	Νότιο Κρητικό Πέλαγος
									υψόμετρο. Εμφανίζεται συνήθως σε χωράφια και πατημένη στον δρόμο.												
<i>Podarcis cretensis</i>	Κρητική κολισαύρα	NAI	II			IV	EN/VU		Απαντάται σε ένα ευρύ φάσμα τύπων οικοτόπων, σε υψόμετρο έως 1.000 μέτρα. Εντοπίζεται κυρίως στο έδαφος.	Ευρέως εξαπλωμένη, επομένως είναι πιθανό να βρεθεί εντός της Περιοχής μελέτης.	Χειμέρια νάρκη					*		*			
<i>Podarcis erhardii</i>	Αιγαιόσαυρα		II			IV	LC/LC		Η αιγαιόσαυρα ζει σε ξηρά ή βραχώδη μέρη με πυκνούς, χαμηλούς θάμνους. Αναρριχάται πολύ επιδέξια. Τρώει αρθρόποδα, ιδιαίτερα έντομα. Ζευγαρώνει την άνοιξη και γεννά αυγά στις αρχές του καλοκαιριού. Οι νεαρές σαύρες εκκολάπτονται τον Σεπτέμβριο και έχουν μέγεθος 3 cm.	Μεταβατικοί δασώδεις θάμνοι-δασικές εκτάσεις, Σκληρόφυλλη βλάστηση	Χειμέρια νάρκη	*				*					
<i>Podarcis muralis</i>	Τοιχόσαυρα		II			IV	LC/LC		Προτιμά βραχώδη περιβάλλοντα, συμπεριλαμβανομένων των αστικών περιοχών, όπου μπορεί να τρέχει ανάμεσα σε βράχους, μπάζα, συντρίμια και κτίρια. Στο νότιο τμήμα της εμβέλειάς της εμφανίζεται συνήθως σε υγρούς ή ημί-υγρούς οικοτόπους, σε αντίθεση με ξηρότερους οικοτόπους στον βορρά.	Χαμηλής πυκνότητας κατοικημένες περιοχές / Οικισμοί, Εκτάσεις με αραιή βλάστηση	Χειμέρια νάρκη	*				*					
<i>Podarcis peloponnesiaca</i>	Γουστέρα της Αργολίδας		II			IV	LC/LC		Η γουστέρα της Αργολίδας αντικαθιστά σε μεγάλο βαθμό την ελληνική σαύρα στην περιοχή της	Χαμηλής πυκνότητας δομημένες περιοχές / Οικισμοί, Οπωροφόρα	Χειμέρια νάρκη	*									

Είδος		Κατάσταση προστασίας								Οικολογία	Παρουσία εντός της Περιοχής Μελέτης	Ευαίσθητες Οικολογικές Περίοδοι	Περιοχές έργου									
Επιστημονική ονομασία	Κοινή ονομασία	Προεδρικό Διάταγμα 67/1981	Σύμβαση της Βέρνης	Σύμβαση της Βόννης	Σύμβαση της Βαρκελώνης	Οδηγία 92/43/ΕΟΚ	IUCN/κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων ζώων της Ελλάδας	CITES					Πελοπόννησος (Χερσαία Ζώνη)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)	Πατραϊκός Κόλπος	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια Ζώνη & LF5)	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Χερσαία Ζώνη)	Κρήτη (Χερσαία Ζώνη)	Νότιο Αιγαίο Πέλαγος	Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)	Νότιο Κρητικό Πέλαγος
									Πελοποννήσου. Είναι ευκίνητο είδος και σκαρφαλώνει σε βράχους, τοίχους και κορμούς δέντρων. Συχνά κουρνιάζει σε υπερυψωμένα σημεία και μπορεί να κάνει μεγάλα άλματα μεταξύ των βράχων. Αναζητά συνήθως την τροφή της στο έδαφος. Τα αρσενικά προστατεύουν την περιοχή τους κατά την περίοδο αναπαραγωγής και είναι πολύ επιθετικά αυτή την περίοδο. Τα θηλυκά γεννούν συνήθως δύο ομάδες έως έξι αυγών, σε ρωγμές ή απομονωμένα σημεία, και τα αυγά χρειάζονται περίπου έξι εβδομάδες για να εκκολαφθούν, ενώ τα νεογνά έχουν μήκος περίπου 3,5 cm (1,4 in).	δέντρα και φυτείες μούρων, Ελαιώνες, Περιοχές με σύνθετες καλλιέργειες,, Αγροδασικές εκτάσεις, Εκτάσεις με αραιή βλάστηση												
<i>Podarcis taurica</i>	Βαλκανόσαυρα		II			IV	LC/LC		Εμφανίζεται σε διάφορους οικοτόπους, αλλά φαίνεται να προτιμά τις ανοιχτές, ηλιόλουστες περιοχές συνήθως έως και 800 μέτρα πάνω από τη στάθμη της θάλασσας, αν και μπορεί να εντοπιστεί σε υψόμετρο έως και 2.350 μέτρα. Κατοικεί κυρίως στο έδαφος που σκαρφαλώνει σπάνια. Τρέφεται με ασπόνδυλα. Τα θηλυκά γεννούν 2-10 αυγά συνήθως δύο φορές τον χρόνο.	Ευρέως εξαπλωμένη, κυρίως σε ανοιχτές περιοχές οικοτόπων	Χειμέρια νάρκη	*						*				

Είδος		Κατάσταση προστασίας										Περιοχές έργου								
		Προεδρικό Διάταγμα 67/1981	Σύμβαση της Βέρνης	Σύμβαση της Βόννης	Σύμβαση της Βαρκελώνης	Οδηγία 92/43/ΕΟΚ	IUCN/Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων ζώων της Ελλάδας	CITES				Πελοπόννησος (Χερσαία Ζώνη)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)	Πατραϊκός Κόλπος	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια Ζώνη & LF5)	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Χερσαία Ζώνη)	Κρήτη (Χερσαία Ζώνη)	Νότιο Αιγαίο Πέλαγος	Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)
Επιστημονική ονομασία	Κοινή ονομασία								Οικολογία	Παρουσία εντός της Περιοχής Μελέτης	Ευαίσθητες Οικολογικές Περίοδοι									
<i>Pseudopus apodus</i>	Τυφλίτης		II			IV	LC/LC		Η P. apodus κατοικεί στην ύπαιθρο, όπως σε λιβάδια με χαμηλή βλάστηση ή αραιά δασώδεις λόφους. Καταναλώνει αρθρόποδα και μικρά θηλαστικά. Το αγαπημένο του θήραμα είναι τα σαλιγκάρια και οι γυμνοσάλιαγκες, γεγονός που μπορεί να εξηγήσει γιατί είναι ιδιαίτερα δραστήριο στην υγρασία, αν και προτιμά τους ξηρούς οικοτόπους.	Αρδευόμενη γη, Αγροδασικές περιοχές, Λιβάδια, Μεταβατικοί δασώδεις θάμνοι-δασικές εκτάσεις	Χειμέρια νάρκη	*					*			
<i>Telescopus fallax</i>	Αγιόφιδο	NAI	II	-	-	IV	LC/LC	-	Απαντάται σε δάση, θαμνώδεις εκτάσεις, βραχώδεις περιοχές (π.χ. βράχια στην ενδοχώρα, κορυφές βουνών), τεχνητές/χερσαίες εκτάσεις	Ευρέως εξαπλωμένη, επομένως είναι πιθανό να βρεθεί εντός της Περιοχής μελέτης.	Χειμέρια νάρκη	*					*	*		
<i>Testudo graeca</i>	Ελληνική χελώνα	NAI	II	-	-	II,IV	VU/LC	II	Απαντάται σε διάφορους οικοτόπους. Η ελληνική χελώνα είναι ένα πολύ μακρόβιο ζώο, με διάρκεια ζωής άνω των 125 ετών, ενώ σύμφωνα με ορισμένες μη επαληθευμένες αναφορές, μπορεί να ζήσει έως και 200 χρόνια	Ευρείας εμβέλειας	Χειμερία νάρκη, αναπαραγωγή	*								
<i>Testudo hermanni</i>	Μεσογειακή χελώνα	NAI	I, II	-	-	II, IV	NT/VU	II	Νωρίς το πρωί, τα ζώα εγκαταλείπουν τα νυχτερινά τους καταφύγια, τα οποία είναι συνήθως μέσα σε κοιλώματα που προστατεύονται από χοντρούς θάμνους ή φράχτες, για να λιαστούν στον ήλιο και να ζεσταθούν. Στη	Αγροδασικές περιοχές, Αρδευόμενη γη, Γεωργικές εκτάσεις, Λιβάδια, Μεταβατικοί δασώδεις θάμνοι-δασικές εκτάσεις	Χειμερία νάρκη, αναπαραγωγή	*					*			



Είδος		Κατάσταση προστασίας							Οικολογία	Παρουσία εντός της Περιοχής Μελέτης	Ευαίσθητες Οικολογικές Περίοδοι	Περιοχές έργου									
Επιστημονική ονομασία	Κοινή ονομασία	Προεδρικό Διάταγμα 67/1981	Σύμβαση της Βέρνης	Σύμβαση της Βόννης	Σύμβαση της Βαρκελώνης	Οδηγία 92/43/ΕΟΚ	IUCN/Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων ζώων της Ελλάδας	CITES				Πελοπόννησος (Χερσαία Ζώνη)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)	Πατραϊκός Κόλπος	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια Ζώνη & LF5)	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Χερσαία Ζώνη)	Κρήτη (Χερσαία Ζώνη)	Νότιο Αιγαίο Πέλαγος	Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)	Νότιο Κρητικό Πέλαγος
									συνέχεια περιφέρονται στα μεσογειακά λιβάδια του οικοτόπου τους αναζητώντας τροφή. Αναζητούν τα φυτά με τα οποία θα τραφούν με την όσφρηση. Σε συνθήκες αιχμαλωσίας, τρέφονται με διάφορα αγριολούλουδα, αν και πρέπει να δίδεται προσοχή στο ποια είναι διαθέσιμα, καθώς ορισμένα λουλούδια όπως η νεραγκούλα είναι τοξικά για αυτές.												
Testudo marginata	Κρασπεδωτή χελώνα	ΝΑΙ	I, II	-	-	II, IV	LC/LC	II	Η φυσική εμβέλεια της κρασπεδωτής χελώνας είναι η νότια Ελλάδα, από την Πελοπόννησο μέχρι τον Όλυμπο. Απαντάται επίσης σε απομονωμένες ζώνες των Βαλκανίων και της Ιταλίας και της βορειοανατολικής Σαρδηνίας.	Αγροδασικές περιοχές, Αρδευόμενες εκτάσεις, Λιβάδια, Μεταβατικοί δασώδεις θάμνοι-δασικές εκτάσεις	Χειμερία νάρκη, αναπαραγωγή	*					*				
Triturus macedonicus	Μακεδονικός χτενοτρίτωνας	-	I, II	-	-	II, IV	-/-	-	Κυρίως νυχτόβιο είδος. Ξοδεύει περίπου το 1/3 του χρόνου (την Άνοιξη) στο νερό, όπου και αναπαράγεται. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, τα θηλυκά γεννούν περίπου 250 αυγά.	Λίμνες	Χειμέρια νάρκη						*				
Vipera ammodytes	Κοινή οχιά	-	II	-	-	IV	LC/LC	-	Μη δηλητηριώδης. Δραστηριοποιείται την ημέρα, αλλά και τη νύχτα όταν οι θερμοκρασίες είναι υψηλές. Εμφανίζεται σε διαφόρων ειδών οικοτόπους αλλά	Ευρέως εξαπλωμένο είδος. Προτιμά ανοιχτά και βραχώδη μέρη.	Χειμέρια νάρκη	*					*				



Είδος		Κατάσταση προστασίας							Οικολογία	Παρουσία εντός της Περιοχής Μελέτης	Ευαίσθητες Οικολογικές Περίοδοι	Περιοχές έργου									
Επιστημονική ονομασία	Κοινή ονομασία	Προεδρικό Διάταγμα 67/1981	Σύμβαση της Βέρνης	Σύμβαση της Βόννης	Σύμβαση της Βαρκελώνης	Οδηγία 92/43/ΕΟΚ	IUCN/Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων ζώων της Ελλάδας	CITES				Πελοπόννησος (Χερσαία Ζώνη)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)	Πατραϊκός Κόλπος	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια Ζώνη & LF5)	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Χερσαία Ζώνη)	Κρήτη (Χερσαία Ζώνη)	Νότιο Αιγαίο Πέλαγος	Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)	Νότιο Κρητικό Πέλαγος
									φαίνεται να προτιμά ηλιόλουστες, ξηρές και βραχώδεις πλαγιές με λίγη βλάστηση. Σκαρφαλώνει συχνά σε θάμνους και ξερολιθιές. Αναπαράγεται στα τέλη Μαΐου και τα θηλυκά γεννούν 4-20 απογόνους, στα τέλη Αυγούστου. Πέφτει σε χειμέρια νάρκη από τον Οκτώβριο έως τον Φεβρουάριο-Μάρτιο. Τρέφεται κυρίως με μικρά θηλαστικά, αλλά και με μικρά πτηνά, αμφίβια και σαύρες. Συρίζει δυνατά και κουλουριάζεται σε θέση άμυνας εάν απειληθεί. Δαγκώνει εάν πιαστεί ή πατηθεί. Το δηλητήριό της μπορεί να είναι θανατηφόρο για τον άνθρωπο, εάν δεν χορηγηθεί αντίδοτο.												
Zamenis longissimus	Λαφίτης του Ασκληπιού	ΝΑΙ	III	-	-	IV	LC/LC	-	Ημερόβιο φίδι που σκαρφαλώνει συχνά σε θάμνους και δέντρα με επιδεξιότητα. Τρέφεται κυρίως με τρωκτικά, αλλά και με μικρά πτηνά και σαύρες. Ζευγαρώνει αργά την άνοιξη και τα θηλυκά γεννούν 2-18 αυγά που εκκολάπτονται περίπου 2 μήνες αργότερα. Μπορεί να δαγκώσει αν εγκλωβιστεί. Ακίνδυνο είδος φιδιού.	Μεταβατικοί δασώδεις θάμνοι-δασικές εκτάσεις, Δάση κατακλυζόμενων πεδιάδων, (Παρόχθιο δάσος/Ποταμιαίο δάσος), Μεσογειακά δάση φυλλοβόλων Μεσογειακά δάση κωνοφόρων Μικτά δάση, Αγροδασικές περιοχές.	Χειμέρια νάρκη	*						*			

Είδος		Κατάσταση προστασίας										Περιοχές έργου									
Επιστημονική ονομασία	Κοινή ονομασία	Προεδρικό Διάταγμα 67/1981	Σύμβαση της Βέρνης	Σύμβαση της Βόννης	Σύμβαση της Βαρκελώνης	Οδηγία 92/43/ΕΟΚ	IUCN/Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων ζώων της Ελλάδας	CITES	Οικολογία	Παρουσία εντός της Περιοχής Μελέτης	Ευαίσθητες Οικολογικές Περίοδοι	Πελοπόννησος (Χερσαία Ζώνη)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)	Πατραϊκός Κόλπος	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια Ζώνη & LF5)	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Χερσαία Ζώνη)	Κρήτη (Χερσαία Ζώνη)	Νότιο Αιγαίο Πέλαγος	Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)	Νότιο Κρητικό Πέλαγος
Zamenis situla	Σπιτόφιδο	ΝΑΙ	III	-	-	II, IV	LC/LC	-	Οι φυσικοί οικότοποι του σπιτόφιδου είναι θαμνώδης βλάστηση μεσογειακού τύπου, βοσκοτόπια, φυτείες και αγροτικοί κήποι	Αγροδασικές περιοχές, Αρδευόμενες εκτάσεις, Λιβάδια, Μεταβατικοί δασώδεις θάμνοι-δασικές εκτάσεις, Οικισμοί	Χειμέρια νάρκη	*					*				

Πίνακας Η-2 Είδη ψαριών του γλυκού νερού που υπάρχουν και αναμένονται στην Περιοχή μελέτης

Είδος		Κατάσταση προστασίας							Οικολογία	Παρουσία εντός της Περιοχής Μελέτης	Ευαίσθητη Οικολογική Περίοδος	Περιοχή έργου		
Επιστημονική ονομασία	Κοινή ονομασία	ΠΔ 67/1981	Σύμβαση της Βέρνης	Σύμβαση της Βόννης	Σύμβαση της Βαρκελώνης	Οδηγία 92/43/ΕΟΚ	IUCN/Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων ζώων της Ελλάδας	CITES				Πελοπόννησος (Χερσαία Ζώνη)	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Χερσαία Ζώνη)	Κρήτη (Χερσαία Ζώνη)
<i>Alosa fallax</i>	Σαρδελομάνα	-	III	-	III	II, IV	LC/DD	-	Είναι ανάδρομο ψάρι το οποίο ζει στη θάλασσα και μεταναστεύει σε γλυκά νερά για να αναπαραχθεί. Απαντάται στο δέλτα του Αχελώου και στις λιμνοθάλασσες γύρω από το Μεσολόγγι, στις εκβολές των ποταμών Στρυμόνα, Νέστου, Έβρου και στις λίμνες της Θράκης. Απαντάται επίσης στα ποτάμια της Ηπείρου.	Ποτάμια, λίμνες	Ωοτοκία		*	
<i>Aphanius fasciatus</i>	Ζαχαριάς	-	III	-	-	II	LC/NE	-	Οι φυσικοί του οικοτόποι είναι οι αλμυρές λίμνες, τα αλμυρά έλη και οι παράκτιες αλμυρές λιμνοθάλασσες. Στην Ελλάδα απαντάται στις λιμνοθάλασσες του Μεσολογγίου, του Πόρτο Λάγος, στις εκβολές των ποταμών Έβρου, Αχελώου, Αξιού, Νέστου, Καλαμά κ.ά.	Λίμνες	Ωοτοκία	*	*	
<i>Barbus peloponnesius</i>	Χαμοσούρτης	-	-	-	-	II,V	LC/LC	-	Εμφανίζεται σε λίμνες και σε υδάτινους όγκους σε χαμηλές πεδιάδες, με μικρά ρεύματα και πέτρινο βυθό. Ενδημικό στη δυτική Ελλάδα σε ποτάμια όπως ο Καλαμάς, ο Αχέροντας, ο Μόρνος, ο Λάδωνας, ο Πάμισος. Επίσης, στη λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου και στον Αμβρακικό κόλπο.	Ποτάμια	Ωοτοκία	*	*	
<i>Cobitis arachthosensis</i>	Αραχθοβελονίτσα	-	-	-	-	II	EN/EN	-	Ενδημικό στον κάτω Άραχθο ποταμό. Κατοικεί σε ποτάμιους και κανάλιους οικοτόπους με πλούσια βλάστηση με μηδενική έως μέτρια ροή και αμμώδη έως ιλυώδη υποστρώματα. Το συνολικό του μήκος φτάνει τα 11 cm	Ποτάμια	Ωοτοκία		*	
<i>Cobitis hellenica</i>	Λουροβελονίτσα	-	-	-	-	II	EN/VU	-	Ενδημικό στις λεκάνες απορροής του Λούρου και του Καλαμά. Εισήχθη στη λίμνη Παμβώτιδα (Leonardos et al., 2008). Προτιμά εικοτόπους με αμμώδες έως λασπώδες υπόστρωμα και βλάστηση. Εμφανίζεται από στάσιμα νερά έως μέτριες συνθήκες ροής. Το συνολικό του μήκος μπορεί να φτάσει τα 11 cm.	Ποτάμια	Ωοτοκία		*	
<i>Cobitis trichonica</i>	Τριχωνοβελονίτσα	-	I, II	-	-	II	EN/LC	-	Εντοπισμένο ενδημικό είδος, που περιορίζεται στις λίμνες Τριχωνίδα, Λυσιμαχία, Αμβρακία και Οζερός. Επίσης, απαντάται στον κάτω ποταμό Αχελώο και στα κανάλια και τους υγροτόπους του. Κατοικεί σε νερά χαμηλής ροής, με αμμώδες ή ιλυώδες υπόστρωμα Το συνολικό του μήκος φτάνει τα 11 cm.	Λίμνες	Ωοτοκία		*	

Είδος		Κατάσταση προστασίας							Οικολογία	Παρουσία εντός της Περιοχής Μελέτης	Ευαίσθητη Οικολογική Περίοδος	Περιοχή έργου		
Επιστημονική ονομασία	Κοινή ονομασία	ΠΑ 67/1981	Σύμβαση της Βέρνης	Σύμβαση της Βόννης	Σύμβαση της Βαρκελώνης	Οδηγία 92/43/ΕΟΚ	IUCN/Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων ζώων της Ελλάδας	CITES				Πελοπόννησος (Χερσαία Ζώνη)	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Χερσαία Ζώνη)	Κρήτη (Χερσαία Ζώνη)
<i>Economidichthys trichonis</i>	Νανογοβιός	-	-	-	-	II	EN/LC	-	Ενδημικό στις λίμνες Τριχωνίδα και Λυσιμαχία στην αποστράγγιση προς τον Αχελώο. Κατοικεί κυρίως στην υποπαραθαλάσσια ζώνη και ζει στη στήλη του νερού, ενώ τρέφεται κυρίως με πλαγκτόν. Είναι τοπικά άφθονο είδος σε περιοχές με πυκνή υδρόβια βλάστηση ενώ σχηματίζει πυκνά σμήνη που συγκεντρώνονται κοντά στο βυθό. Είναι ένα σεξουαλικά διμορφικό είδος με γονική συμπεριφορά, με το αρσενικό να είναι αυτό που κατασκευάζει φωλιές στις κοιλότητες των καλαμιών και φυλάει τα αυγά μέχρι να εκκολαφθούν. Έχει ετήσιο κύκλο ζωής και το συνολικό του μήκος φτάνει τα 3 cm.	Ποτάμια, λίμνες	Ωοτοκία		*	
<i>Economidichthys pygmaeus</i>	Λουρογωβιός	-	-	-	-	II	LC/LC	-	Ενδημικό της δυτικής Ελλάδας. Απαντάται στους ποταμούς Καλαμάς, Λούρος, Άραχθος και Αχελώος, καθώς και στις λίμνες Παμβώτιδα, Τριχωνίδα, Λυσιμαχία, Ζηρός και Οζερός, στις πηγές Βλυχού και Χιλιαδού και στο δέλτα του Μόρνου. Πρόσφατα εισήχθη στον Βοιωτικό Κηφισό και στη λίμνη Υλίκη και τη λίμνη Τάκα στην Πελοπόννησο (στοιχεία ΕΛΚΕΘΕ). Είναι κατά κύριο λόγο βενθοπελαγικό είδος, που κατοικεί τόσο σε ρέοντα όσο και σε στάσιμα ρηχά νερά με άφθονη βλάστηση και τρέφεται κυρίως με βενθικά ασπόνδυλα και καρκινοειδή. Στη λίμνη Τριχωνίδα, το είδος ωοτοκίας έχει ετήσιο κύκλο ζωής με μία περίοδο ωοτοκίας την άνοιξη και πεθαίνει λίγο μετά την αναπαραγωγή. Σε άλλα υδάτινα συστήματα (ποταμοί Λούρος και πηγές Αγίου Δημητρίου στο Δέλτα του Αχελώου), ορισμένα άτομα φθάνουν στην ηλικία των δύο ετών και παρατηρείται κάποια αναπαραγωγική δραστηριότητα το φθινόπωρο. Το συνολικό του μήκος φτάνει τα 6 cm.	Ποτάμια, λίμνες	Ωοτοκία		*	
<i>Knipowitschia milleri</i>	Αχερονογωβιός	-	-	-	-	II	CR/CR	-	Μόνο στην Ελλάδα στο δέλτα του ποταμού Αχέροντα. Στη Ζάκυνθο έχει αναφερθεί πληθυσμός που μπορεί να ανήκει σε ένα νέο, διαφορετικό είδος. Απαντάται σε σχεδόν στάσιμα, καθαρά, φρέσκα έως πολύ ελαφρώς υφάλμυρα νερά με άφθονη ανάπτυξη ζιζανίων.	Ποτάμια, λίμνες	Ωοτοκία		*	

Είδος		Κατάσταση προστασίας							Οικολογία	Παρουσία εντός της Περιοχής Μελέτης	Ευαίσθητη Οικολογική Περίοδος	Περιοχή έργου		
Επιστημονική ονομασία	Κοινή ονομασία	ΠΑ 67/1981	Σύμβαση της Βέρνης	Σύμβαση της Βόννης	Σύμβαση της Βαρκελώνης	Οδηγία 92/43/ΕΟΚ	IUCN/Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων ζώων της Ελλάδας	CITES				Πελοπόννησος (Χερσαία Ζώνη)	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Χερσαία Ζώνη)	Κρήτη (Χερσαία Ζώνη)
<i>Caspiomyzon hellenicus</i> (<i>Eudontomyzon hellenicus</i>)	Αμμόκοιτος ή Γκαβόχελο	-	I, II	-	-	II	CR/CR	-	Είναι ενδημικό στην Ελλάδα. Ζει μόνο στις λεκάνες απορροής του Στρυμόνα και του Λούρου. Απαντάται σε βάθη 25-75 cm, μέσα στη λάσπη, ιδιαίτερα ανάμεσα σε ρίζες υδρόβιας βλάστησης.	Ποτάμια	Ωοτοκία		*	
<i>Pelaspus thesproticus</i>	Θεσπρωτικός πελασγός	-	-	-	-	II	NT/NT	-	Η εμβέλειά του εκτείνεται από τον Καλαμά έως τη λεκάνη απορροής του ποταμού Άραχθου, συμπεριλαμβανομένης της Κέρκυρας και της Λευκάδας. Απαντάται επίσης στη νότια Αλβανία. Κατοικεί σε πηγές, ρυάκια και διάφορες λιμνούλες. Συνήθως εντοπίζεται σε ρηχά νερά με αργή ροή και πυκνή βλάστηση. Το συνολικό του μήκος φτάνει τα 6 cm.	Ποτάμια	Ωοτοκία		*	
<i>Rutilus panosi</i>	Δρομίτσα	-	-	-	-	II	VU/LC	-	Λιμναίο είδος ενδημικό στην αποστράγγιση του ποταμού Αχελώου, το οποίο αφθονεί στις λίμνες Τριχωνίδα, Αμβρακία, Λυσιμαχία και Οζερός. Παλαιότερες αναφορές που το εντοπίζουν στην απορροή του Λούρου παραμένουν ανεπιβεβαίωτες. Έχει εισαχθεί στις λίμνες Παμβώτιδα (Ηπειρος) και Τάκα (Πελοπόννησος). Το συνολικό μήκος του φτάνει τα 6 cm.	Ποτάμια, λίμνες	Ωοτοκία		*	
<i>Pelaspus laconicus</i>	Λακωνικός πελασγός	-	-	-	-	II	CR/CR	-	Είδος περιορισμένης εμβέλειας, ενδημικό της λεκάνης απορροής του ποταμού Ευρώτα και τμήματος της λεκάνης απορροής του ποταμού Αλφειού. Κατοικεί σε πηγές και ρυάκια, ενώ προτιμά ρηχές περιοχές κοντά στην ακτή, με αργή έως ανύπαρκτη ροή και πυκνή βλάστηση. Το συνολικό μήκος του μπορεί να φτάσει τα 6 cm.	Ποτάμια, λίμνες	Ωοτοκία	*		
<i>Pelaspus stymphalicus</i>	Στυμφαλικός πελασγός	-	-	-	-	II	LC/LC	-	Ενδημικό είδος της Πελοποννήσου και της δυτικής Ελλάδας. Πληθυσμοί εμφανίζονται στη λίμνη Στυμφαλία, τον κάτω Αλφειό, τον Πάμισο και τον Πηνειό (καθώς και σε μικρότερα συστήματα της Δυτικής Πελοποννήσου και του Αργολικού κόλπου). Επίσης, στις λεκάνες του κάτω Αχελώου, του Εύηνου και του Μόρνου. Εισήχθη στη λίμνη Τσιβλού (ποταμός Κράθις) και ανακαλύφθηκε πρόσφατα στον πελοποννησιακό Ασωπό (κοντά στο χωριό Νεμέα, στοιχεία ΕΛΚΕΘΕ). Κατοικεί σε λίμνες, λιμνούλες που βρέχονται από πηγές, ποτάμια και ρυάκια με αργή ροή και βλάστηση υγροτόπων. Το μήκος του φτάνει τα 7 cm.	Ποτάμια, λίμνες	Ωοτοκία	*		

Είδος		Κατάσταση προστασίας							Οικολογία	Παρουσία εντός της Περιοχής Μελέτης	Ευαίσθητη Οικολογική Περίοδος	Περιοχή έργου		
Επιστημονική ονομασία	Κοινή ονομασία	ΠΔ 67/1981	Σύμβαση της Βέρνης	Σύμβαση της Βόννης	Σύμβαση της Βαρκελώνης	Οδηγία 92/43/ΕΟΚ	IUCN/Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων ζώων της Ελλάδας	CITES				Πελοπόννησος (Χερσαία Ζώνη)	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Χερσαία Ζώνη)	Κρήτη (Χερσαία Ζώνη)
<i>Silurus aristotelis</i>	Γλανίδι	-	I, II	-	-	II,V	DD/LC	-	Είδος ενδημικό στον κάτω ποταμού Αχελώου (κυρίως στις λίμνες της απορροής). Μετατοπίστηκε επίσης στις λίμνες Παμβώτιδα και Βόλβη και πρόσφατα στη λίμνη Υλίκη (Βοιωτικός Κηφισός). Κατοικεί σε ποτάμια αργής ροής, ρέματα και κανάλια με πλούσια βλάστηση, λίμνες πλούσιες σε θρεπτικά συστατικά με λασπώδες υπόστρωμα. Το συνολικό μήκος του φτάνει τα 46 cm.	Ποτάμια, λίμνες	Ωοτοκία		*	
<i>Petromyzon marinus</i>	Λάμπραινα	-	III	-	III	II	LC/NE	-	Ανάδρομο είδος που ζει στην ξηρά και μεταναστεύει σε ποτάμια για να γεννήσει. Πολύ σπάνιο είδος στο ανατολικό τμήμα της Μεσογείου. Οι ιχθυολογικές έρευνες στοχεύουν πολύ σπάνια αυτό το είδος. Οι μόνες καταγραφές εμφάνισης στα ελληνικά ύδατα αφορούν δύο άτομα που αλιεύτηκαν στο Θρακικό Πέλαγος (Economidis et al., 1999) και ένα άτομο σε θαλάσσια ύδατα της Κεφαλονιάς, στο Ιόνιο (Karachle & Machias, 2014). Σύμφωνα με πρόσφατες ανέκδοτες αναφορές θέασης από ντόπιους ψαράδες, είναι πιθανό να εμφανίζεται για ωοτοκία στον ποταμό Λούρο.	Αμφίβολη παρουσία	Ωοτοκία	*	*	
<i>Telestes pleurobipunctatus</i>	Λιάρα	-	-	-	-	II	LC/LC	-	Ροόφιλο είδος κυπρίνου που κατοικεί σε πολλά ποτάμια και ρέματα της δυτικής Ελλάδας (συμπεριλαμβανομένου του νησιού της Κέρκυρας) και της βορειοδυτικής Πελοποννήσου. Επίσης απαντάται στη λεκάνη της λίμνης του Βουθρωτού (νότια Αλβανία). Κατοικεί σε ρέματα με μέτρια έως γρήγορη ροή και έχει καταγραφεί συχνά σε ορεινές περιοχές (έως 000 m1 υψόμετρο, όπως στον ποταμό Αχελώο). Είναι επίσης τοπικά άφθονο σε πεδινά ρέματα με κρύα νερά που βρέχονται από πηγές. Στα τέλη του χειμώνα, μεταναστεύει ανάντη για να γεννήσει σε ρέματα δροσερών υδάτων (συχνά κοντά σε πηγές, Barbieri et al., 2007). Το συνολικό μήκος του φτάνει τα 22 cm.	Ποτάμια	Ωοτοκία	*	*	
<i>Tropidophoxinellus hellenicus</i>	Γουρνάρα	-	-	-	-	II	LC/LC	-	Ενδημικό στις λεκάνες απορροής του Πηνειού (Πελοπόννησος) και του Αχελώου (κοινές και στις λίμνες της λεκάνης απορροής του Αχελώου). Πρόσφατα εντοπίστηκε και στον ποταμό Βέργα (λεκάνη Κοτυχίου, Πελοπόννησος, στοιχεία ΕΛΚΕΘΕ). Κατοικεί σε λίμνες, λεκάνες απορροής και πεδινά νερά με χαμηλή ροή, σχηματίζοντας κοπάδια σε ανοιχτά ύδατα. Το συνολικό μήκος του φτάνει τα 12 cm.	Ποτάμια, λίμνες	Ωοτοκία	*	*	

Είδος		Κατάσταση προστασίας							Οικολογία	Παρουσία εντός της Περιοχής Μελέτης	Ευαίσθητη Οικολογική Περίοδος	Περιοχή έργου		
Επιστημονική ονομασία	Κοινή ονομασία	ΠΑ 67/1981	Σύμβαση της Βέρνης	Σύμβαση της Βόννης	Σύμβαση της Βαρκελώνης	Οδηγία 92/43/ΕΟΚ	IUCN/Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων ζώων της Ελλάδας	CITES				Πελοπόννησος (Χερσαία Ζώνη)	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Χερσαία Ζώνη)	Κρήτη (Χερσαία Ζώνη)
<i>Valencia letourneuxi</i>	Ζουρνάς	-	I, II	-	II	II,IV	CR/CR	-	Ενδημικό στη δυτική ακτή της Ελλάδας και στη γειτονική λεκάνη της λίμνης Βουθρωτού στη νότια Αλβανία. Το είδος έχει κατακερματισμένη και εξαιρετικά εντοπισμένη εξάπλωση, με ορισμένους ιστορικά γνωστούς πληθυσμούς να έχουν εξαφανιστεί. Υπάρχουν ορισμένοι ευάλωτοι πληθυσμοί στους μικροβιότοπους των λεκανών του Καλαμά, του Αχέροντα, του Λούρου και του Αράχθου, καθώς και στις πηγές του Βλυχού. Πρόσφατα, εντοπίστηκε ξανά στην Κέρκυρα (ρεύμα Μελισσούδι), αλλά εξαφανίστηκε από τη Λευκάδα. Η κατάσταση των πληθυσμών στις ακόλουθες λεκάνες απορροής ποταμών πιθανότατα αναφέρεται στο πρόσφατα περιγραφόμενο είδος <i>Valencia robertae</i> : Αστακός, Άγιος Δημήτριος, Αχελώος και Εύηνος. Κατοικεί σε πεδινούς υγροτόπους και ποτάμια που βρέχονται από πηγές, με αργή ροή και καθαρά νερά και πλούσια υδρόβια βλάστηση. Σπανίως απαντάται στα υφάλμυρα άκρα παράκτιων λιμνοθαλασσών με πλούσια βλάστηση. Απειλείται από την υποβάθμιση των οικοτόπων και τον ανταγωνισμό με το εισαγόμενο <i>Gambusia holbrooki</i> (Kalogianni et al., 2012, 2014)/ Ωτοκεί στα τέλη της άνοιξης, με μια δεύτερη περίοδο κορύφωσης πιθανώς το φθινόπωρο. Το συνολικό μήκος του φτάνει τα 7 cm.	Ποτάμια, λίμνες	Ωτοκία		*	
<i>Squalius keadicus</i>	Καιαδική μενίδα	NAI	-	-	-	II	EN/EN	-	Είδος ενδημικό της απορροής του ποταμού Ευρώτα, συμπεριλαμβανομένου του παρακείμενου ρέματος Βασιλοπόταμου στο Δέλτα του Ευρώτα. Ένα από τα αρχαιότερα είδη της ευρωπαϊκής ιχθυοπανίδας κυπρίνων. Λόγω του περιορισμού του σε μια ενιαία λεκάνη απορροής και του γεγονότος ότι ο ποταμός Ευρώτας στεγνώνει σχεδόν εντελώς σε υδρολογικά αντίξοες χρονιές, το είδος θα πρέπει να θεωρείται απειλούμενο. Είναι έντονα ροόφιλο, απαντάται συνήθως σε ανοιχτές τοποθεσίες του ποταμού, με πετρώδεις πυθμένες και σχετικά δροσερά νερά. Το συνολικό μήκος του φτάνει τα 25 cm.	Ποτάμια	Ωτοκία	*		
<i>Barbus albanicus</i>	Στροσίδι	-	-	-	-	V	LC/LC	-	Ενδημικό στη δυτική Ελλάδα, από τον Καλαμά έως τον Μόρνο (εκτός του Αχέροντα) και τον Πηνειό (Πελοποννήσου), συμπεριλαμβανομένων των λιμνών Τριχωνίδα, Αμβρακία και Παμβώτιδα. Παρά την επιστημονική του ονομασία,	Ποτάμια	Ωτοκία	*	*	

Είδος		Κατάσταση προστασίας							Οικολογία	Παρουσία εντός της Περιοχής Μελέτης	Ευαίσθητη Οικολογική Περίοδος	Περιοχή έργου		
Επιστημονική ονομασία	Κοινή ονομασία	ΠΔ 67/1981	Σύμβαση της Βέρνης	Σύμβαση της Βόννης	Σύμβαση της Βαρκελώνης	Οδηγία 92/43/ΕΟΚ	IUCN/Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων ζώων της Ελλάδας	CITES				Πελοπόννησος (Χερσαία Ζώνη)	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Χερσαία Ζώνη)	Κρήτη (Χερσαία Ζώνη)
ώστε το εμπόριο δειγμάτων των ειδών που περιλαμβάνονται στο στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου να τεθεί υπό αποτελεσματικό έλεγχο Προσάρτημα ΙΙΙ – Κάθε είδος που ένα συμβαλλόμενο μέρος, στο πλαίσιο της δικαιοδοσίας του, ορίζει ότι το υπάγει σε κανόνες με σκοπό να εμποδίσει ή να περιορίσει την εκμετάλλευσή του, και ότι χρειάζεται τη συνεργασία άλλων συμβαλλόμενων μερών για τον έλεγχο του εμπορίου.														
- Οδηγία 92/43/ΕΟΚ: Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας: Παράρτημα Ι – Τύποι οικοτόπων κοινοτικού ενδιαφέροντος / (*) Οικότοποι προτεραιότητας Παράρτημα ΙΙ – Ζωικά και φυτικά είδη κοινοτικού ενδιαφέροντος των οποίων η διατήρηση επιβάλλει τον χαρακτηρισμό ειδικών ζωνών διατήρησης / (*) Είδη προτεραιότητας Παράρτημα ΙV – Ζωικά και φυτικά είδη κοινοτικού ενδιαφέροντος που χρήζουν αυστηρής προστασίας Παράρτημα V – Ζωικά και φυτικά είδη κοινοτικού ενδιαφέροντος των οποίων η απόσπαση από το φυσικό τους περιβάλλον και η εκμετάλλευση είναι δυνατό να ρυθμίζονται με διαχειριστικά μέτρα. IUCN/Βιβλίο δεδομένων κινδύνου: Διεθνής Ένωση Προστασίας της Φύσης (International Union for Conservation of Nature) / Το κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων ζώων της Ελλάδας (2009): CR: Κρισίμως Κινδυνεύον EN: Κινδυνεύον VU: Ευάλωτο NT: Σχεδόν Απειλούμενο LR: Χαμηλότερου Κινδύνου LC: Μειωμένου Ενδιαφέροντος DD: Ανεπαρκώς Γνωστό NE: Μη αξιολογηθέν.														

Πίνακας Η-3 Θαλάσσια είδη ψαριών που υπάρχουν και αναμένονται στην Περιοχή μελέτης

Είδος		Κατάσταση προστασίας							Οικολογία	Παρουσία εντός της Περιοχής Μελέτης	Ευαίσθητες Οικολογικές Περίοδοι	Περιοχές έργου (* Σχετικές πιθανότητες εμφάνισης)						
Επιστημονική ονομασία	Κοινή ονομασία	ΠΑ 67/1981	Σύμβαση της Βέρνης	Σύμβαση της Βόννης	Σύμβαση της Βαρκελώνης	Οδηγία 92/43/ΕΟΚ	IUCN/Βιβλίο δεδομένων κινδύνου	CITES				Νότιο Κρητικό Πέλαγος	Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)	Νότιο Αιγαίο Πέλαγος	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)	Πατραϊκός Κόλπος	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια Ζώνη & LF5)
Abudefduf vaigiensis	Λοχίας Ινδο-Ειρηνικού	-	-	-	-	-	LC/-	-	<u>Χωροκατακτητικό είδος</u> Τα ενήλικα κατοικούν στο άνω άκρο των εξωτερικών πλαγιών των υφάλων και των παράκτιων βραχωδών υφάλων. Οι γόννοι απαντώνται στα παρασυρόμενα φύκη. Βενθοπελαγικό. Εύρος βάθους 1 - 15 m	[Βιβλιογραφία/Βάσεις δεδομένων]: Πελοπόννησος LF3	Δεν υπάρχουν δεδομένα.				r			
Aidablennius sphynx	Σφιγγοσαλιάρα	-	-	-	-	-	LC/NE	-	<u>Αυτόχθον είδος</u> Απαντάται στην πολύ ρηχή, βραχώδη, παραθαλάσσια ζώνη, όπου είναι εκτεθειμένα στο φως του ήλιου και στα σερφ, καθώς και σε οριζόντιες αναβαθμίδες καλυμμένες με φύκη.	[Βιβλιογραφία/Βάσεις δεδομένων]: Πατραϊκός Κόλπος: Διαδρομή (ΧΘ): 0-17,23 km	Δεν υπάρχουν δεδομένα.	-	r	-	c	c	-	c
Alopias vulpinus	Κοινός αλωπίας	-	-	I	III	-	VU/VU	II	<u>Αυτόχθον είδος</u> Κοσμοπολίτικο είδος που απαντάται σε εύκρατες και τροπικές θάλασσες, σε βάθη από 0 έως 650 m συνήθως 0–200 m. (Moreno et al. 1989, Compragno 2001).	[Βιβλιογραφία/Βάσεις δεδομένων]: Νότιο Αιγαίο Πέλαγος: Διαδρομή (ΧΘ): 70-366 km. Νότιο Κρητικό Πέλαγος: Διαδρομή (ΧΘ): 0-70 km	Αυτό το είδος έχει ορισμένες σημαντικές περιοχές γέννησης και γόνου στη Μεσόγειο (Αδριατική και Αλβορανική Θάλασσα), οι οποίες ενδέχεται να απειληθούν από την αλιεία.	r	r	r	r	r	r	r
Alosa fallax	Σαρδελομάνα	-	I, II	-	III	II,V	LC/NE	-	<u>Αυτόχθον είδος</u> Απαντάται στον ανατολικό Ατλαντικό Ωκεανό και τη Μεσόγειο Θάλασσα και είναι ένα ανάδρομο ψάρι που ζει στη θάλασσα και μεταναστεύει στα γλυκά ύδατα για να γεννήσει. Εύρος βάθους 10 – 400 m.	[Βιβλιογραφία/Βάσεις δεδομένων]: Πατραϊκός Κόλπος: Διαδρομή (ΧΘ): 0-17,23 km	Περίοδος ωοτοκίας: Μάιος-Ιούνιος	-	R	r	c	r	r	r



Είδος		Κατάσταση προστασίας							Οικολογία	Παρουσία εντός της Περιοχής Μελέτης	Ευαίσθητες Οικολογικές Περίοδοι	Περιοχές έργου (* Σχετικές πιθανότητες εμφάνισης)							
Επιστημονική ονομασία	Κοινή ονομασία	ΠΔ 67/1981	Σύμβαση της Βέρνης	Σύμβαση της Βόννης	Σύμβαση της Βαρκελώνης	Οδηγία 92/43/ΕΟΚ	IUCN/Βιβλίο δεδομένων κινδύνου	CITES				Νότιο Κρητικό Πέλαγος	Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)	Νότιο Αιγαίο Πέλαγος	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)	Πατραϊκός Κόλπος	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια Ζώνη & LF5)	
Anguilla Anguilla	Χέλι	-	-	II	III	-	CR/NT	II	Αυτόχθον είδος Κατοικεί σε όλους τους τύπους βενθικών οικοτόπων από ρυάκια μέχρι όχθες μεγάλων ποταμών και λιμνών. Έχει φυσική παρουσία μόνο σε υδάτινους όγκους που συνδέονται με τη θάλασσα. Εύρος βάθους 0 - 700 m	[Βιβλιογραφία/Βάσεις δεδομένων]: Πατραϊκός Κόλπος: Διαδρομή (ΧΘ): 0-17,23 km	Περίοδος ωοτοκίας: Μάιος-Ιούνιος	r	r	c	c	c	c	c	
Arctozenus risso	Κηλιδωτό μικρό μπαρακούντα	-	-	-	-	-	LC/NE	-	Αυτόχθον είδος Οικότοπος: μεσοπελαγικός, κάποια ψευδοκεάνια, κυρίως στα 200-1.000 m, μεμονωμένα ή σε μικρά κοπάδια μερικών εκατοντάδων ατόμων. Εύρος βάθους 0 - 2200 m	[Βιβλιογραφία/Βάσεις δεδομένων]: Νότιο Κρητικό Πέλαγος: Διαδρομή (ΧΘ): 0-70km Νότιο Αιγαίο Πέλαγος: Διαδρομή (ΧΘ): 70-366km	Αναπαράγεται σε ηπειρωτικές πλαγιές και σε ωκεάνιες όχθες από τα βόρεια έως τα τροπικά και τα νότια εύκρατα ύδατα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους	r	R	c	c	c	c	c	c
Apogon imberbis	Καρδινάλιος	-	-	-	-	-	LC/NE	-	Αυτόχθον είδος Ζει στις παράκτιες λιμνοθάλασσες. Κατοικεί σε λασπώδεις ή βραχώδεις πυθμένες και σπηλιές. Εύρος βάθους 10 - 200 m	[Εγγραφές πεδίου]: Πελοπόννησος LF3: Διαδρομή (ΧΘ): 428.7km @ σταθμός 85m από την LF3	Περίοδος ωοτοκίας: το καλοκαίρι (Ιούνιος-Σεπτέμβριος) στη Μεσόγειο. Εσωτερική γονιμοποίηση, στοματική επώαση από τα αρσενικά.	r	R	r	c	c	c	c	c
Ariosoma balearicum	Χελομούγγρι	-	-			-	LC/NE	-	Αυτόχθον είδος Οικότοπος: βενθικό, στην υφαλοκρηπίδα, παράλιο, τρυπώνει σε στοές σε πυθμένες με αμμώδη λάσπης στα 20-100 m	[Βιβλιογραφία/Βάσεις δεδομένων]: Νότιο Κρητικό Πέλαγος: Διαδρομή (ΧΘ): 0-70km Νότιο Αιγαίο Πέλαγος: Διαδρομή (ΧΘ): 70-366km	Περίοδος ωοτοκίας: θερμή υδρολογική περίοδος. Διάρκεια ζωής των προνυμφών περίπου 20-22 μήνες	r	r	r	c	-	-	-	-

Είδος		Κατάσταση προστασίας							Οικολογία	Παρουσία εντός της Περιοχής Μελέτης	Ευαίσθητες Οικολογικές Περίοδοι	Περιοχές έργου (* Σχετικές πιθανότητες εμφάνισης)						
Επιστημονική ονομασία	Κοινή ονομασία	ΠΔ 67/1981	Σύμβαση της Βέρνης	Σύμβαση της Βόννης	Σύμβαση της Βαρκελώνης	Οδηγία 92/43/ΕΟΚ	IUCN/Βιβλίο δεδομένων κινδύνου	CITES				Νότιο Κρητικό Πέλαγος	Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)	Νότιο Αιγαίο Πέλαγος	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)	Πατραϊκός Κόλπος	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια Ζώνη & LF5)
<i>Argentina sphyraena</i>	Σφύραινα	-	-	-		-	LC/NE	-	<u>Αυτόχθον είδος</u> Απαντάται σχετικά συχνά στην υφαλοκρηπίδα και στο ανώτερο πρανές, πιθανώς να απαντηθεί σε κοπάδια κοντά στον πυθμένα. Εύρος βάθους από 50-500 m	[Βιβλιογραφία/Βάσεις δεδομένων]: Πατραϊκός Κόλπος: Διαδρομή (ΧΘ): 0-17,23 km	Περίοδος ωοτοκίας: χειμώνα έως άνοιξη (Μεσόγειος)	r	r	r	c	c	c	c
<i>Argyrolepescus hemigymnus</i>	-	-	-	-		-	LC/NE	-	<u>Αυτόχθον είδος</u> Ωκεάνιο, μεσοπελαγικό στα 50-800 m, το ακριβές εύρος βάθους εξαρτάται από το στάδιο ανάπτυξης, τον χρόνο, το γεωγραφικό πλάτος, την εποχή.	[Βιβλιογραφία/Βάσεις δεδομένων]: Νότιο Κρητικό Πέλαγος: Διαδρομή (ΧΘ): 0-70km Νότιο Αιγαίο Πέλαγος: Διαδρομή (ΧΘ): 70-366km Πατραϊκός Κόλπος: Διαδρομή (ΧΘ): 0-17,23 km	Περίοδος ωοτοκίας: όλο το χρόνο	r	r	c	c	c	c	c
<i>Atherina sp.</i>	-	-	-	-		-	LC/LC	-	<u>Αυτόχθον είδος</u> Πελαγικό παράλιο, συχνά κοντά στην ακτή. Συμπεριφορά: κοινωνικό, μερικές φορές απαντάται σε θαλάσσιες λιμνοθάλασσες (Γαλλία) και εκβολές ποταμών (Πορτογαλία).	[Εγγραφές πεδίου]: Πελοπόννησος LF3: Διαδρομή (ΧΘ): 428.7km @ σταθμός 85m από την LF3	Περίοδος ωοτοκίας: Δεκέμβριος- Μάιος	c	c	c	c	c	c	c
<i>Atherina boyeri</i>	Αθερίνα	-	-	-		-	LC/LC	-	<u>Αυτόχθον είδος</u> Απαντάται σε χαμηλότερα σημεία ποταμών, εκβολών ποταμών, παράκτιων λιμνών και θάλασσας.	[Βιβλιογραφία/Βάσεις δεδομένων]: Νότιο Κρητικό Πέλαγος: Διαδρομή (ΧΘ): 0-70km Νότιο Αιγαίο Πέλαγος: Διαδρομή (ΧΘ): 70-366km	Περίοδος ωοτοκίας: Απρίλιος-Ιούλιος σε υφάλμυρα (2α) και υπεραλατικά (42α) ύδατα	r	r	r	c	c	c	c

Είδος		Κατάσταση προστασίας							Οικολογία	Παρουσία εντός της Περιοχής Μελέτης	Ευαίσθητες Οικολογικές Περίοδοι	Περιοχές έργου (* Σχετικές πιθανότητες εμφάνισης)						
Επιστημονική ονομασία	Κοινή ονομασία	ΠΔ 67/1981	Σύμβαση της Βέρνης	Σύμβαση της Βόννης	Σύμβαση της Βαρκελώνης	Οδηγία 92/43/ΕΟΚ	IUCN/Βιβλίο δεδομένων κινδύνου	CITES				Νότιο Κρητικό Πέλαγος	Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)	Νότιο Αιγαίο Πέλαγος	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)	Πατραϊκός Κόλπος	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια Ζώνη & LF5)
<i>Atherina hepsetus</i>	Αθερίνα η εψητός	-	-	-	-	-	NE/NE	-	<u>Αυτόχθον είδος</u> Παράλιο, συχνά κοντά στην ακτή. Κοινωνικό, μερικές φορές απαντάται σε θαλάσσιες λιμνοθάλασσες (Γαλλία) και εκβολές ποταμών (Πορτογαλία). Τρέφεται με πελαγικά κωπηπόποδα και βενθικά καρκινοειδή	[Βιβλιογραφία/Βάσεις δεδομένων]: Πατραϊκός Κόλπος: Διαδρομή (ΧΘ): 0-17 23 km	Περίοδος ωοτοκίας: Ιανουάριος έως Απρίλιος (Γαλλία). Δεν υπάρχουν στοιχεία για την Ανατολική Μεσόγειο	-	r	r	c	c	c	c
<i>Arnoglossus laterna</i>	Αρνοζαγκέτα	-	-	-	-	-	LC/NE	-	<u>Αυτόχθον είδος</u> Ζει σε μικτούς ή λασπώδεις πυθμένες. Εύρος βάθους 10 - 200 m, συνήθως 10 - 100 m	[Βιβλιογραφία/Βάσεις δεδομένων]: Πατραϊκός Κόλπος: Διαδρομή (ΧΘ): 0-17 23 km	Περίοδος ωοτοκίας: Απρίλιος έως Αύγουστος	-	r	r	r	c	c	c
<i>Balistes capriscus</i>	Γουρουνόψαρο	-	-	-	-	-	VU/-	-	<u>Αυτόχθον είδος</u> Κατοικεί σε όρμους, λιμάνια, λιμνοθάλασσες και υφάλους προς τη θάλασσα. Μπορεί να παρασυρθεί με γόνους στην επιφάνεια. Εύρος βάθους 0 - 100 m, συνήθως 0 - 55 m	[Βιβλιογραφία/Βάσεις δεδομένων]: Πατραϊκός Κόλπος: Διαδρομή (ΧΘ): 0-17 23 km	Περίοδος ωοτοκίας: Δεν υπάρχουν στοιχεία για την Ανατολική Μεσόγειο	-	r	-	c	r	r	r
<i>Bathypterois dubius</i>	Αραχνόψαρο	-	-	-	-	-	LC/NE	-	<u>Αυτόχθον είδος</u> Βενθικό στο ηπειρωτικό πρανές και σε υψόμετρο 750-1.950 μέτρα και με παρουσία στη Μεσόγειο	[Βιβλιογραφία/Βάσεις δεδομένων]: Νότιο Κρητικό Πέλαγος: Διαδρομή (ΧΘ): 0-70km Νότιο Αιγαίο Πέλαγος: Διαδρομή (ΧΘ): 70-366km	Περίοδος ωοτοκίας: Δεν υπάρχουν στοιχεία για την Ανατολική Μεσόγειο	c	-	r	-	-	r	-
<i>Belone belone</i>	Ζαργάνα	-	-	-	-	-	LC/NE	-	<u>Αυτόχθον είδος</u> Επιπελαγικό, νεριτικό είδος	[Βιβλιογραφία/Βάσεις δεδομένων]: Νότιο Κρητικό Πέλαγος: Διαδρομή (ΧΘ): 0-70km Νότιο Αιγαίο Πέλαγος: Διαδρομή (ΧΘ): 70-366km	Περίοδος ωοτοκίας: στα παράκτια ύδατα από Μάιο έως Ιούνιο στις Βρετανικές Νήσους,	r	r	r	c	c	c	c

Είδος		Κατάσταση προστασίας							Οικολογία	Παρουσία εντός της Περιοχής Μελέτης	Ευαίσθητες Οικολογικές Περιόδους	Περιοχές έργου (* Σχετικές πιθανότητες εμφάνισης)						
Επιστημονική ονομασία	Κοινή ονομασία	ΠΔ 67/1981	Σύμβαση της Βέρνης	Σύμβαση της Βόννης	Σύμβαση της Βαρκελώνης	Οδηγία 92/43/ΕΟΚ	IUCN/Βιβλίο δεδομένων κινδύνου	CITES				Νότιο Κρητικό Πέλαγος	Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)	Νότιο Αιγαίο Πέλαγος	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)	Πατραϊκός Κόλπος	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια Ζώνη & LF5)
										[Βιβλιογραφία/Βάσεις δεδομένων]: Πατραϊκός Κόλπος: Διαδρομή (ΧΘ): 0-17,23 km	Φεβρουάριος-Μάιος στην Αλγερία, Απρίλιος-Σεπτέμβριος στη Μαύρη Θάλασσα.							
<i>Bellottia apoda</i>	-	-	-	-		-	LC/NE	-	<u>Αυτόχθον είδος</u> Το βάθος κυμαίνεται από 30-500 m και από 460-569 m στο ανατολικό Ιόνιο. Η Bellottia apoda φαίνεται να τρέφεται με ένα μείγμα πλαγκτονικού και βενθικού θηράματος	[Βιβλιογραφία/Βάσεις δεδομένων]: Πατραϊκός Κόλπος: Διαδρομή (ΧΘ): 0-17,23 km	Περίοδος ωοτοκίας: Όλο τον χρόνο	-	-	c	-	-	c	-
<i>Beryx decadactylus</i>	Κοκκινοψαράκι	-	-	-		-	LC/NE	-	<u>Αυτόχθον είδος</u> Βαθυβενθικό, εύρος βάθους 110 - 1000 m. Συνήθως 200-400m.	[Βιβλιογραφία/Βάσεις δεδομένων]: Πατραϊκός Κόλπος: Διαδρομή (ΧΘ): 0-17,23 km	Περίοδος ωοτοκίας: Δεν υπάρχουν στοιχεία για την Ανατολική Μεσόγειο	-	-	-	r	-	-	-
<i>Benthosema glaciale</i>	Φανόψαρο των πάγων	-	-	-		-	LC/NE	-	<u>Αυτόχθον είδος</u> Υψηλό ωκεάνιο, μεσοπελαγικό σε βάθη μεταξύ 375 – 800 m κατά τη διάρκεια της ημέρας και 12 – 200 m κατά τη διάρκεια της νύχτας. Το βάθος κυμαίνεται από 0-850 m και από 541-1085 m στο ανατολικό Ιόνιο.	[Βιβλιογραφία/Βάσεις δεδομένων]: Νότιο Κρητικό Πέλαγος: Διαδρομή (ΧΘ): 0-70km Νότιο Αιγαίο Πέλαγος: Διαδρομή (ΧΘ): 70-366km Πατραϊκός Κόλπος: Διαδρομή (ΧΘ): 0-17,23 km	Κορυφή ωοτοκίας (Μεσόγειος) στα τέλη της άνοιξης-καλοκαιριού	r	r	r	c	r	r	r
<i>Boops boops</i>	Γόπα	-	-	-		-	LC/NE	-	<u>Αυτόχθον είδος</u> Απαντάται στην υφαλοκρηπίδα ή παραθαλάσσιο πελαγίσιο σε διάφορους πυθμένες (άμμος, λάσπη, βράχια και φύκη). Κοινωνικό, ανεβαίνει στην επιφάνεια κυρίως τη νύχτα. Εύρος βάθους 0 - 350 m, συνήθως 0 - 100 m	[Εγγραφές πεδίου] Peloponnese LF3: Διαδρομή (ΧΘ): 428,4km @ σταθμός 374m από την LF3 [Βιβλιογραφία/Βάσεις δεδομένων]:	Περίοδος ωοτοκίας: Φεβρουάριος-Απρίλιος	-	r	c	c	c	c	c



Είδος		Κατάσταση προστασίας							Οικολογία	Παρουσία εντός της Περιοχής Μελέτης	Ευαίσθητες Οικολογικές Περίοδοι	Περιοχές έργου (* Σχετικές πιθανότητες εμφάνισης)						
Επιστημονική ονομασία	Κοινή ονομασία	ΠΔ 67/1981	Σύμβαση της Βέρνης	Σύμβαση της Βόννης	Σύμβαση της Βαρκελώνης	Οδηγία 92/43/ΕΟΚ	IUCN/Βιβλίο δεδομένων κινδύνου	CITES				Νότιο Κρητικό Πέλαγος	Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)	Νότιο Αιγαίο Πέλαγος	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)	Πατραϊκός Κόλπος	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια Ζώνη & LF5)
										Νότιο Κρητικό Πέλαγος: Διαδρομή (ΧΘ): 0-70km Νότιο Αιγαίο Πέλαγος: Διαδρομή (ΧΘ): 70-366km Πατραϊκός Κόλπος: Διαδρομή (ΧΘ): 0-17,23 km								
<i>Bothus podas</i>	Πισσί	-	-	-		-	LC/NE	-	<u>Αυτόχθον είδος</u> Απαντάται σε ρηχά νερά, πάνω από αμμώδεις και λασπώδεις πυθμένες ηπειρωτικών οροπεδίων. Αναπαράγεται μεταξύ Μαΐου και Αυγούστου. Τα νεογνά προσαρμόζονται καλά στα ενυδρεία, αλλά χρειάζονται επαρκούς έκτασης πυθμένα	[Βιβλιογραφία/Βάσεις δεδομένων]: Νότιο Κρητικό Πέλαγος: Διαδρομή (ΧΘ): 0-70km Νότιο Αιγαίο Πέλαγος: Διαδρομή (ΧΘ): 70-366km	Περίοδος ωοτοκίας: Απρίλιος έως Αύγουστος	-	r	c	c	c	c	c
<i>Callionymus maculatus</i>	Καλλιώνυμος ο κηλιδωτός	-	-	-		-	LC/NE	-	<u>Αυτόχθον είδος</u> Βενθικό είδος που ζει σε αμμώδεις βυθούς. Τρέφεται με μικρά ασπόνδυλα του βυθού κυρίως σκουλήκια, σαλιγκάρια και καρκινοειδή. Εύρος βάθους 45 - 650 m	[Βιβλιογραφία/Βάσεις δεδομένων]: Πατραϊκός Κόλπος: Διαδρομή (ΧΘ): 0-17,23 km	Δεν υπάρχουν δεδομένα.	-	r	r	r	r	r	r
<i>Caranx crysos</i>	Τραχούρι	-	-	-		-	LC/NE	-	<u>Αυτόχθον είδος</u> Σύνηθες σε ρηχά ύδατα, αλλά μεγαλύτερους μεγέθους ψάρια μπορεί να εμφανιστούν σε υπεράκτια ύδατα σε βάθη 350 m. Απαντάται σε μέτρια έως μεγάλα κοπάδια, συχνά σε υφάλμυρο νερό και περιστασιακά κινείται ανάντη σε ποτάμια	[Εγγραφές πεδίου]: Νότιο Κρητικό Πέλαγος: Διαδρομή ΧΘ:0,472 χλμ από LF2 [Βιβλιογραφία/Βάσεις δεδομένων]: Πατραϊκός Κόλπος: Διαδρομή (ΧΘ): 0-17,23 km	Περίοδος ωοτοκίας: Καλοκαίρι	-	r	-	c	c	c	c
<i>Carcharias taurus</i>	Καρχαρίας ταύρος	-	-	-	II	-	CR/CR	-	<u>Αυτόχθον είδος</u> Κοινός παράκτιος καρχαρίας που απαντάται στην ακτή από τη ζώνη των σέρφερ και σε	[Βιβλιογραφία/Βάσεις δεδομένων]:	Ο καρχαρίας ταύρος έχει ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά	-	r	-	r	r	r	r

Είδος		Κατάσταση προστασίας							Οικολογία	Παρουσία εντός της Περιοχής Μελέτης	Ευαίσθητες Οικολογικές Περίοδοι	Περιοχές έργου (* Σχετικές πιθανότητες εμφάνισης)						
Επιστημονική ονομασία	Κοινή ονομασία	ΠΔ 67/1981	Σύμβαση της Βέρνης	Σύμβαση της Βόννης	Σύμβαση της Βαρκελώνης	Οδηγία 92/43/ΕΟΚ	IUCN/Βιβλίο δεδομένων κινδύνου	CITES				Νότιο Κρητικό Πέλαγος	Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)	Νότιο Αιγαίο Πέλαγος	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)	Πατραϊκός Κόλπος	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια Ζώνη & LF5)
									ρηχούς κόλπους έως τουλάχιστον 191 μέτρα στις εξωτερικές υφαλοκρηπίδες. Συχνά απαντάται στον βυθό ή κοντά σε αυτόν, αλλά εμφανίζεται επίσης στα μεσόνερα ή στην επιφάνεια. Απαντάται μεμονωμένα ή σε μικρά έως μεγάλα κοπάδια. Εύρος βάθους 1 - 191 m, συνήθως 15 - 25 m	Νότιο Κρητικό Πέλαγος: Διαδρομή (ΧΘ): 0-70km Νότιο Αιγαίο Πέλαγος: Διαδρομή (ΧΘ): 70-366 km Έχει αλιευθεί από αλιευτικά σκάφη στο Ιόνιο Πέλαγος, στο κεντρικό Αιγαίο και στον Σαρωνικό.	αναπαραγωγής που είναι γνωστά μεταξύ των χονδριχθίων. Η εκτιμώμενη διάρκεια κάθε γενιάς είναι περίπου 17 χρόνια. Το είδος είναι μεταναστευτικό σε μέρη της εμβέλειάς του, ιδιαίτερα στα βόρεια και νότια άκρα της, όπου εμφανίζεται έντονη μετανάστευση προς τους πόλους το καλοκαίρι και τον ισημερινό το φθινόπωρο και τον χειμώνα.							
<i>Carcharhinus plumbeus</i>	Σταχτοκαρχαρίας	-	-	-	III	-	EN/EN	-	<u>Αυτόχθον είδος</u> Απαντάται σε παράκτια και υπεράκτια ύδατα, σε ηπειρωτικές και νησιωτικές υφαλοκρηπίδες και παρακείμενα βαθιά ύδατα. Συνήθως εμφανίζεται σε όρμους, εκβολές ποταμών και σε λιμάνια. Αποφεύγει τις αμμώδεις παραλίες και τη ζώνη των σέρβερ, τους κοραλλιογενείς υφάλους, τον τραχύ βυθό και τα επιφανειακά ύδατα. Εύρος βάθους 0 - 500 m, συνήθως 20 - 65 m	[Βιβλιογραφία/Βάσεις δεδομένων]: Νότιο Κρητικό Πέλαγος: Διαδρομή (ΧΘ): 0-70km Νότιο Αιγαίο Πέλαγος: Διαδρομή (ΧΘ): 70-366km Η ιστορία της ζωής και ο παράκτιος οικότοπος του C. plumbeus τον καθιστούν εξαιρετικά ευάλωτο στην εξάντληση. Έχει αλιευθεί από αλιευτικά σκάφη στο Ιόνιο	Είναι γνωστό ότι μεταναστεύει εποχιακά σε ορισμένες περιοχές της εμβέλειάς του.	-	r	r	c	r	r	r



Είδος		Κατάσταση προστασίας							Οικολογία	Παρουσία εντός της Περιοχής Μελέτης	Ευαίσθητες Οικολογικές Περιόδους	Περιοχές έργου (* Σχετικές πιθανότητες εμφάνισης)						
Επιστημονική ονομασία	Κοινή ονομασία	ΠΔ 67/1981	Σύμβαση της Βέρνης	Σύμβαση της Βόννης	Σύμβαση της Βαρκελώνης	Οδηγία 92/43/ΕΟΚ	IUCN/Βιβλίο δεδομένων κινδύνου	CITES				Νότιο Κρητικό Πέλαγος	Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)	Νότιο Αιγαίο Πέλαγος	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)	Πατραϊκός Κόλπος	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια Ζώνη & LF5)
										Πέλαγος, στο Αιγαίο και στη Θάλασσα του Λεβάντε.								
<i>Carcharodon carcharias</i>	Λευκός καρχαρίας	-	II	I, II	II	-	VU/EN	II	<u>Αυτόχθον είδος</u> Η γεωγραφική του εξάπλωση είναι σχεδόν παγκόσμια (Ατλαντικός Ωκεανός, Μεσόγειος Θάλασσα, Ινδικός και Ειρηνικός Ωκεανός), κυρίως σε βάθη 0-1.280 μέτρων. Απαντάται τόσο σε παράκτιους όσο και σε υπεράκτιους οικοτόπους ηπειρωτικών και νησιωτικών υφαλοκρηπίδων, αλλά μπορεί επίσης να εμφανιστεί και σε νησιά του ωκεανού, μακριά από την ξηρά. Μπορεί επίσης να μεταναστεύει σε ωκεάνιες περιοχές.	[Βιβλιογραφία/Βάσεις δεδομένων]: Νότιο Κρητικό Πέλαγος: Διαδρομή (ΧΘ): 0-70km Νότιο Αιγαίο Πέλαγος: Διαδρομή (ΧΘ): 70-366km	Είναι απειλούμενο είδος επειδή έχει πολύ χαμηλή αναπαραγωγική ικανότητα (όψιμη ωριμότητα και μικρό μέγεθος νεογνών) και είναι ιδιαίτερα ευάλωτο στην αλιεία, είτε ως στόχος είτε ως παρεμπύπτον αλίευμα.	r	r	r	r	r	r	
<i>Cepola macrophthalma</i>	Λασπόψαρο	-	-	-		-	LC/NE	-	Απαντάται σε αμμώδεις και λασπώδεις βυθούς. Ζει σε κατακόρυφα λαγούμια αλλά μπορεί να εντοπιστεί να κολυμπάει στα μεσόνερα. Εμφανίζεται μεμονωμένα ή σε κοπάδια	[Βιβλιογραφία/Βάσεις δεδομένων]: Πατραϊκός Κόλπος: Διαδρομή (ΧΘ): 0-17,23 km	Περίοδος ωοτοκίας: Μάρτιος έως Νοέμβριος (Μεσόγειος)	-	r	r	c	c	c	c
<i>Centrophorus granulosus</i>	Κοκκοκεντροφόρος	-	-	-	III	-	EN/VU	-	<u>Αυτόχθον είδος</u> Απαντάται στη Μεσόγειο. Μεταξύ των μεσογειακών χωρών, οικότοποί του βρίσκονται στην Αλβανία, την Αλγερία, τη Γαλλία, την Ελλάδα, την Ιταλία, το Μαρόκο, την Ισπανία, την Τυνησία και την Τουρκία. Απαντάται συνήθως στα βαθέα ύδατα εξωτερικών ηπειρωτικών υφαλοκρηπίδων και ανώτερων πρανών, και συνηθέστερα	[Βιβλιογραφία/Βάσεις δεδομένων]: Νότιο Κρητικό Πέλαγος: Διαδρομή (ΧΘ): 0-70km	Δεν υπάρχουν δεδομένα.	-	r	c	c	c	c	c

Είδος		Κατάσταση προστασίας							Οικολογία	Παρουσία εντός της Περιοχής Μελέτης	Ευαίσθητες Οικολογικές Περίοδοι	Περιοχές έργου (* Σχετικές πιθανότητες εμφάνισης)						
Επιστημονική ονομασία	Κοινή ονομασία	ΠΔ 67/1981	Σύμβαση της Βέρνης	Σύμβαση της Βόννης	Σύμβαση της Βαρκελώνης	Οδηγία 92/43/ΕΟΚ	IUCN/Βιβλίο δεδομένων κινδύνου	CITES				Νότιο Κρητικό Πέλαγος	Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)	Νότιο Αιγαίο Πέλαγος	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)	Πατραϊκός Κόλπος	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια Ζώνη & LF5)
									κάτω από τα 200 m, συνήθως σε βενθικά και επιβενθικά ύδατα σε βάθη από 50-1440 m με τις περισσότερες καταγραφές στα 200-600 m.									
<i>Ceratoscopelus maderensis</i>	Φανόψαρο της Μαδέiras	-	-	-		-	LC/NE	-	<u>Αυτόχθον είδος</u> Είδος που ζει σε υψηλά ωκεάνια ύδατα, απαντάται σε κοπάδια και βρίσκεται μεταξύ 650-700 m κατά τη διάρκεια της ημέρας και μεταξύ 51-250 m τη νύχτα με διαστρωματοποίηση του μεγέθους του ανάλογα με το βάθος.	[Βιβλιογραφία/Βάσεις δεδομένων]: Νότιο Κρητικό Πέλαγος: Διαδρομή (ΧΘ): 0-70km Νότιο Αιγαίο Πέλαγος: Διαδρομή στη θάλασσα: (ΧΘ): 70-366km Πατραϊκός Κόλπος: Διαδρομή (ΧΘ): 0-17,23 km	Άνοιξη-καλοκαίρι,	r	-	c	-	-	c	-
<i>Cetorhinus maximus</i>	Καρχαρίας προσκυνητής	-	II	I, II	II	-	EN/VU	II	<u>Αυτόχθον είδος</u> Άκρως μεταναστευτικό είδος. Κατανέμεται γεωγραφικά στον Ατλαντικό και στον Ειρηνικό Ωκεανό. Αυτό το είδος έχει αποδειχθεί εξαιρετικά ευάλωτο στην εξάντληση λόγω των χαρακτηριστικών της ιστορίας της ζωής του. Εύρος βάθους 0 - 2000	[Βιβλιογραφία/Βάσεις δεδομένων]: Νότιο Αιγαίο Πέλαγος: Διαδρομή (ΧΘ): 70-366km	Περίοδος ωοτοκίας: στις αρχές του καλοκαιριού, τον Μάιο και τον Ιούλιο. Θεωρείται ότι υπάρχει μια περίοδος ανάπαυσης ενός έτους μεταξύ των κυήσεων, με αποτέλεσμα ένα διάστημα 2-4 ετών μεταξύ των γεννήσεων. Έχει παρατηρηθεί να γεννηθούν 6 νεογνά από μία μόνο έγκυο.	r	r	r	c	c	c	c



Είδος		Κατάσταση προστασίας							Οικολογία	Παρουσία εντός της Περιοχής Μελέτης	Ευαίσθητες Οικολογικές Περιόδους	Περιοχές έργου (* Σχετικές πιθανότητες εμφάνισης)						
Επιστημονική ονομασία	Κοινή ονομασία	ΠΔ 67/1981	Σύμβαση της Βέρνης	Σύμβαση της Βόννης	Σύμβαση της Βαρκελώνης	Οδηγία 92/43/ΕΟΚ	IUCN/Βιβλίο δεδομένων κινδύνου	CITES				Νότιο Κρητικό Πέλαγος	Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)	Νότιο Αιγαίο Πέλαγος	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)	Πατραϊκός Κόλπος	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια Ζώνη & LF5)
<i>Chauliodus sloani</i>	Οχιά της θάλασσας	-	-	-	-	-	LC/NE	-	Αυτόχθον είδος Κατοικεί σε βαθιά ωκεάνια ύδατα σε βάθος μεγαλύτερο από 1.000 m. Μπορεί να μεταναστεύσει σε ύδατα κοντά στην επιφάνεια τη νύχτα.	[Βιβλιογραφία/Βάσεις δεδομένων]: Νότιο Κρητικό Πέλαγος: Διαδρομή (ΧΘ): 0-70km Νότιο Αιγαίο Πέλαγος: Διαδρομή (ΧΘ): 70-366km	Περίοδος ωοτοκίας: όλο το χρόνο, με κορύφωση στα τέλη του χειμώνα και στις αρχές της άνοιξης.	r	r	c	c	r	r	r
<i>Chelidonichthys cuculus</i>	Γκριζοκαπόνι	-	-	-	-	-	LC/NE	-	Αυτόχθον είδος Σχηματίζει κοπάδια περιστασιακά. Απαντάται πάνω στην άμμο και τα χαλίκια, σε γκρεμούς και βράχια στην υφαλοκρηπίδα. Εύρος βάθους 15 - 400 m, συνήθως 30 - 250 m	[Βιβλιογραφία/Βάσεις δεδομένων]: Πατραϊκός Κόλπος: Διαδρομή (ΧΘ): 0-17,23 km	Περίοδος ωοτοκίας: Ιανουάριος έως Ιούλιος	-	r	r	r	c	c	c
<i>Chelon labrosus</i>	Χειλονάρι	-	-	-	-	-	LC/NE	-	Αυτόχθον είδος Κοινό ψάρι σε ρηχές, προστατευμένες ακτές, εκβολές ποταμών και γύρω από σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και εκροές υπονόμων. Μπορεί επίσης να εισέλθει σε περιοχές γλυκών υδάτων. Ζει στον βορειοανατολικό Ατλαντικό Ωκεανό από την Ισλανδία μέχρι το Πράσινο Ακρωτήριο, συμπεριλαμβανομένης της Μεσογείου και της νοτιοδυτικής Μαύρης Θάλασσας. Πρόκειται για ένα είδος εν μέρει μεταναστευτικό, το οποίο το καλοκαίρι κατευθύνεται προς τα βόρεια.	[Βιβλιογραφία/Βάσεις δεδομένων]: Πατραϊκός Κόλπος: Διαδρομή (ΧΘ): 0-17,23 km	Περίοδος ωοτοκίας: Φεβρουάριος έως Απρίλιος	-	r	r	c	c	c	c
<i>Citharus linguatula</i>	Κιθαροζακέτα	-	-	-	-	-	LC/NE	-	Αυτόχθον είδος Τα ενήλικα κατοικούν σε μαλακούς βυθούς από την ακτογραμμή έως περίπου 300	[Βιβλιογραφία/Βάσεις δεδομένων]:	Δεν υπάρχουν δεδομένα.	-	r	r	c	c	c	c



Είδος		Κατάσταση προστασίας							Οικολογία	Παρουσία εντός της Περιοχής Μελέτης	Ευαίσθητες Οικολογικές Περίοδοι	Περιοχές έργου (* Σχετικές πιθανότητες εμφάνισης)						
Επιστημονική ονομασία	Κοινή ονομασία	ΠΑ 67/1981	Σύμβαση της Βέρνης	Σύμβαση της Βόννης	Σύμβαση της Βαρκελώνης	Οδηγία 92/43/ΕΟΚ	IUCN/Βιβλίο δεδομένων κινδύνου	CITES				Νότιο Κρητικό Πέλαγος	Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)	Νότιο Αιγαίο Πέλαγος	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)	Πατραϊκός Κόλπος	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια Ζώνη & LF4)
									μέτρα βάθος, αλλά σπάνια απαντώνται σε βάθη μεγαλύτερα από 200 μέτρα	Πατραϊκός Κόλπος: Διαδρομή (ΧΘ): 0-17,23 km								
Chromis chromis	Καλογρίτσα	-	-	-		-	LC/NE	-	<u>Αυτόχθον είδος</u> Τα ενήλικα σχηματίζουν μικρά κοπάδια στα μεσόνερα πάνω ή κοντά σε βραχώδεις υφάλους ή πάνω από λειμώνες θαλάσσιας βλάστησης (Posidonia oceanica). Τρέφονται με μικρά πλαγκτονικά ή βενθικά ζώα. Αναπαράγονται το καλοκαίρι. Εύρος βάθους 2 - 40 m	[Εγγραφές πεδίου]: Νότια Κρήτη LF2: Διαδρομή (ΧΘ): 0,196km από την LF2 Πελοπόννησος LF3: Διαδρομή (ΧΘ): 428,7km και 428,4km και 427,9 @ σταθμός 85m και 374m και 824 m από την LF3. Πατραϊκός Κόλπος LF4: Διαδρομή ΧΘ: 0,443km, 0,809km και 01,24km από την LF4 [Βιβλιογραφία/Βάσεις δεδομένων]: Νότιο Κρητικό Πέλαγος: Διαδρομή (ΧΘ): 0-70km Διαδρομή Νοτίου Αιγαίου (ΧΘ): 70-366km Πατραϊκός Κόλπος: Διαδρομή (ΧΘ): 0-17,23 km	Περίοδος ωοτοκίας: Καλοκαίρι	-	r	-	c	c	-	c
Coelorinchus caelorhincus	Ανοιχτόρυγχος γρεναδιέρος	-	-	-		-	LC/NE	-	<u>Αυτόχθον είδος</u> Απαντάται συνήθως περίπου στα 200-500 m. Τρέφεται με ποικιλία βενθικών οργανισμών, όπως πολυχαΐτες, γαστερόποδα, κεφαλόποδα, διάφορες ομάδες καρκινοειδών και ψάρια. Εύρος βάθους 90 - 1485 m, συνήθως 200 - 500 m.	[Βιβλιογραφία/Βάσεις δεδομένων]: Πατραϊκός Κόλπος: Διαδρομή (ΧΘ): 0-17,23 km	Περίοδος ωοτοκίας: Ιανουάριος έως Μάρτιος στην Ιταλία	r	-	r	-	-	r	-



Είδος		Κατάσταση προστασίας							Οικολογία	Παρουσία εντός της Περιοχής Μελέτης	Ευαίσθητες Οικολογικές Περιόδους	Περιοχές έργου (* Σχετικές πιθανότητες εμφάνισης)						
Επιστημονική ονομασία	Κοινή ονομασία	ΠΔ 67/1981	Σύμβαση της Βέρνης	Σύμβαση της Βόννης	Σύμβαση της Βαρκελώνης	Οδηγία 92/43/ΕΟΚ	IUCN/Βιβλίο δεδομένων κινδύνου	CITES				Νότιο Κρητικό Πέλαγος	Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)	Νότιο Αιγαίο Πέλαγος	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)	Πατραϊκός Κόλπος	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια Ζώνη & LF5)
Conger conger	Μουγγρί	-	-	-	-	-	LC/NE	-	Αυτόχθον είδος Απαντάται σε βραχώδεις και αμμώδεις πυθμένες. Εύρος βάθους από 0-500 m, παραμένει κοντά στην ακτή όταν είναι σε μικρή ηλικία και κινείται προς βαθύτερα ύδατα μόλις ενηλικιωθεί.	[Βιβλιογραφία/Βάσεις δεδομένων]: Πατραϊκός Κόλπος: Διαδρομή (ΧΘ): 0-17,23 km	Δεν υπάρχουν στοιχεία για τη Μεσόγειο	r	r	c	c	c	c	c
Coris julis	Γύλος	-	-	-	-	-	LC/NE	-	Αυτόχθον είδος Απαντάται στην παραθαλάσσια ζώνη, κοντά σε βράχους και σε βυθούς με θαλάσσια βλάστηση. Συνήθως εντοπίζεται σε βάθος μεταξύ 1-60 m, αλλά τα ηλικιωμένα αρσενικά μένουν σε βαθύτερα ύδατα. Τρέφεται με μικρά γαστερόποδα, αχινούς, γαρίδες, σκουλήκια, ισόποδα και αμφίποδα. Εύρος βάθους 0 - 120 m, συνήθως 1 - 60 m	[Εγγραφές πεδίου]: Νότια Κρήτη LF2: Διαδρομή (ΧΘ): 0,196km από την LF2 Πελοπόννησος LF3: Διαδρομή (ΧΘ): 428.7km @ σταθμός 85m από την LF3 Πατραϊκός Κόλπος LF4: Διαδρομή (ΧΘ): 0,443km, από την LF4 [Βιβλιογραφία/Βάσεις δεδομένων]: Νότιο Κρητικό Πέλαγος: Διαδρομή (ΧΘ): 0-70km Νότιο Αιγαίο Πέλαγος: Διαδρομή (ΧΘ): 70-366km Πατραϊκός Κόλπος: Διαδρομή (ΧΘ): 0-17,23 km	Περίοδος ωοτοκίας: Απρίλιος έως Αύγουστος	r	r	r	c	c	c	c
Coryphaena hippurus	Δελφινόψαρο	-	-	-	-	-	LC/NE	-	Αυτόχθον είδος Τα ενήλικα είδη απαντώνται στα ανοιχτά ύδατα, αλλά και κοντά στην ακτή. Εύρος βάθους 0 - 85 m, συνήθως 5 - 10 m	[Βιβλιογραφία/Βάσεις δεδομένων]: Πατραϊκός Κόλπος: Διαδρομή (ΧΘ): 0-17,23 km	Δεν υπάρχουν δεδομένα.	-	r	-	c	r	-	r

Είδος		Κατάσταση προστασίας							Οικολογία	Παρουσία εντός της Περιοχής Μελέτης	Ευαίσθητες Οικολογικές Περίοδοι	Περιοχές έργου (* Σχετικές πιθανότητες εμφάνισης)						
Επιστημονική ονομασία	Κοινή ονομασία	ΠΔ 67/1981	Σύμβαση της Βέρνης	Σύμβαση της Βόννης	Σύμβαση της Βαρκελώνης	Οδηγία 92/43/ΕΟΚ	IUCN/Βιβλίο δεδομένων κινδύνου	CITES				Νότιο Κρητικό Πέλαγος	Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)	Νότιο Αιγαίο Πέλαγος	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)	Πατραϊκός Κόλπος	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια Ζώνη & LF5)
<i>Coryphaenoides mediterraneus</i>	Γρεναδιέρος των βράχων	-	-	-	-	-	LC/NE	-	Αυτόχθον είδος Οικότοπος: βενθοπελαγικός στα 1.200-3.000 m	[Βιβλιογραφία/Βάσεις δεδομένων]: Νότιο Κρητικό Πέλαγος: Διαδρομή (ΧΘ): 0-70km Νότιο Αιγαίο Πέλαγος: Διαδρομή (ΧΘ): 70-366km	Δεν υπάρχουν δεδομένα.	r	-	r	-	-	r	-
<i>Cyclothone braueri</i>	Σμηριγγόψαρο	-	-	-	-	-	LC/NE	-	Αυτόχθον είδος Οικότοπος: ωκεάνιο, μεσοπελαγικό, το ακριβές εύρος βάθους εξαρτάται από το στάδιο ανάπτυξης, Εύρος βάθους 10 - 2000 m , συνήθως 200 - 900 m	[Βιβλιογραφία/Βάσεις δεδομένων]: Νότιο Κρητικό Πέλαγος: Διαδρομή (ΧΘ): 0-70km Νότιο Αιγαίο Πέλαγος: Διαδρομή (ΧΘ): 70-366km	Περίοδος ωτοκίας κυρίως Απρίλιος-Οκτώβριος	r	r	c	r	r	r	r
<i>Cyclothone pygmaea</i>	-	-	-	-	-	-	LC/	-	Αυτόχθον είδος Θαλάσσιο, βαθυπελαγικό. Εύρος βάθους 500 - 1400 m. Ενδημικό της Μεσογείου.	[Βιβλιογραφία/Βάσεις δεδομένων]: Νότιο Κρητικό Πέλαγος: Διαδρομή (ΧΘ): 0-70km Νότιο Αιγαίο Πέλαγος: Διαδρομή (ΧΘ): 70-366km	Περίοδος ωτοκίας: άνοιξη έως φθινόπωρο	c	-	c	-	-	-	-
<i>Dasyatis Pastinaca</i>	Βατοτρυγόνα	-	-	-	-	-	VU/NE	-	Αυτόχθον είδος Παράκτιο είδος, που εισέρχεται σε παράκτιες λιμνοθάλασσες, ρηχούς όρμους και εκβολές ποταμών. Απαντάται πάνω σε αμμώδεις και λασπώδεις πυθμένες, μερικές φορές κοντά σε βραχώδεις υφάλους. Εύρος βάθους 5 - 200 m, συνήθως 20 - 35 m.	[Βιβλιογραφία/Βάσεις δεδομένων]: Πατραϊκός Κόλπος: Διαδρομή (ΧΘ): 0-17,23 km	Δεν υπάρχουν δεδομένα.	-	r	r	c	c	c	c
<i>Diaphus holti</i>	-	-	-	-	-	-	LC/NE	-	Αυτόχθον είδος Είδος που απαντάται σε υψηλά ωκεάνια ύδατα, μεταξύ 225-650 m κατά τη διάρκεια της ημέρας και μεταξύ 40-275 m τη νύχτα	[Βιβλιογραφία/Βάσεις δεδομένων]: Νότιο Κρητικό Πέλαγος: Διαδρομή (ΧΘ): 0-70km Διαδρομή Νοτίου Αιγαίου (ΧΘ): 70-366km	Περίοδος ωτοκίας: άνοιξη-καλοκαίρι	r	-	c	-	-	c	-



Είδος		Κατάσταση προστασίας							Οικολογία	Παρουσία εντός της Περιοχής Μελέτης	Ευαίσθητες Οικολογικές Περίοδοι	Περιοχές έργου (* Σχετικές πιθανότητες εμφάνισης)						
Επιστημονική ονομασία	Κοινή ονομασία	ΠΔ 67/1981	Σύμβαση της Βέρνης	Σύμβαση της Βόννης	Σύμβαση της Βαρκελώνης	Οδηγία 92/43/ΕΟΚ	IUCN/Βιβλίο δεδομένων κινδύνου	CITES				Νότιο Κρητικό Πέλαγος	Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)	Νότιο Αιγαίο Πέλαγος	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)	Πατραϊκός Κόλπος	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια Ζώνη & LF5)
<i>Diaphus rafinesquii</i>	-	-	-	-	-	-	LC/NE	-	<u>Αυτόχθον είδος</u> Είδος που απαντάται σε υψηλά ωκεάνια ύδατα, απαντάται μεταξύ 325-750 m κατά τη διάρκεια της ημέρας. Τη νύχτα, απαντάται σε ένα σύστημα δύο στρωμάτων, με τους ενήλικες να κινούνται στα 300-600 m και τα πιο νεαρά είδη στα 40-200 m	[Βιβλιογραφία/Βάσεις δεδομένων]: Νότιο Κρητικό Πέλαγος: Διαδρομή (ΧΘ): 0-70km Νότιο Αιγαίο Πέλαγος: Διαδρομή (ΧΘ): 70-366km	Περίοδος ωτοκίας: Φεβρουάριος έως Απρίλιος	r	-	c	-	-	r	-
<i>Dicentrarchus labrax</i>	Λαβράκι	-	-	-	-	-	LC/NE	-	<u>Αυτόχθον είδος</u> Απαντάται στην παράκτια ζώνη σε διάφορα είδη πυθμένων σε εκβολές ποταμών, λιμνοθάλασσες και περιστασιακά σε ποτάμια. Εισέρχεται στα παράκτια ύδατα και τις εκβολές ποταμών το καλοκαίρι, αλλά μεταναστεύει σε ανοιχτά ύδατα με ψυχρότερο καιρό και εμφανίζονται σε βαθιά ύδατα κατά τη διάρκεια του χειμώνα στη βόρεια εμβέλειά του. Εύρος βάθους 10 - 100 m	[Βιβλιογραφία/Βάσεις δεδομένων]: Πατραϊκός Κόλπος: Διαδρομή (ΧΘ): 0-17,23 km	Περίοδος ωτοκίας: Ιανουάριος έως Μάρτιος	r	r	r	c	c	c	c
<i>Diplodus annularis</i>	Σπάρος	-	-	-	-	-	LC/NE	-	<u>Αυτόχθον είδος</u> Κατοικεί κυρίως σε θαλάσσια λιβάδια Zostera αλλά και σε πυθμένες Ποσειδωνίας και αμμώδεις πυθμένες, ενώ σπάνια σε βραχώδεις πυθμένες. Εύρος βάθους 0 - 90 m	[Βιβλιογραφία/Βάσεις δεδομένων]: Νότιο Κρητικό Πέλαγος: Διαδρομή (ΧΘ): 0-70km Νότιο Αιγαίο Πέλαγος: Διαδρομή (ΧΘ): 70-366km Πελοπόννησος LF3 Πατραϊκός Κόλπος: Διαδρομή (ΧΘ): 0-17,23 km	Περίοδος ωτοκίας: Φεβρουάριος έως Απρίλιος	r	c	r	c	c	c	c
<i>Diplodus puntazzo</i>	Μυτάκι	-	-	-	-	-	LC/NE	-	<u>Αυτόχθον είδος</u> Βενθοπελαγικό θαλάσσιο είδος. Κοινωνικό, ζει σε παράκτια ύδατα σε βραχώδεις ή	[Βιβλιογραφία/Βάσεις δεδομένων]: Νότιο Κρητικό Πέλαγος: Διαδρομή (ΧΘ): 0-70km	Περίοδος ωτοκίας: μέχρι το τέλος του	-	c	r	c	c	r	c

Είδος		Κατάσταση προστασίας							Οικολογία	Παρουσία εντός της Περιοχής Μελέτης	Ευαίσθητες Οικολογικές Περίοδοι	Περιοχές έργου (* Σχετικές πιθανότητες εμφάνισης)						
Επιστημονική ονομασία	Κοινή ονομασία	ΠΔ 67/1981	Σύμβαση της Βέρνης	Σύμβαση της Βόννης	Σύμβαση της Βαρκελώνης	Οδηγία 92/43/ΕΟΚ	IUCN/Βιβλίο δεδομένων κινδύνου	CITES				Νότιο Κρητικό Πέλαγος	Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)	Νότιο Αιγαίο Πέλαγος	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)	Πατραϊκός Κόλπος	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια Ζώνη & LF5)
									αμμώδεις πυθμένες, έως 1 50 m (περιστασιακά, πάνω από τα 50 m).	Νότιο Αιγαίο Πέλαγος: Διαδρομή (ΧΘ): 70-366km	καλοκαιριού και το φθινόπωρο							
<i>Diplodus sargus</i>	Σαργός	-	-	-		-	LC/NE	-	<u>Αυτόχθον είδος</u> Κατοικεί σε παράκτιες βραχώδεις περιοχές υφάλων και σε πυθμένες λιβαδιών <i>Posidonia oceanica</i> . Εύρος βάθους 0 - 50 m	[Εγγραφές πεδίου]: Νότια Κρήτη LF2: Διαδρομή (ΧΘ): 0,196km Πελοπόννησος LF3: Διαδρομή (ΧΘ): 428.7km @ σταθμός 85m από την LF3 Πατραϊκός Κόλπος: Διαδρομή (ΧΘ): 0,443km από την LF4 [Βιβλιογραφία/Βάσεις δεδομένων]: Νότιο Κρητικό Πέλαγος: Διαδρομή (ΧΘ): 0-70km Νότιο Αιγαίο Πέλαγος: Διαδρομή (ΧΘ): 70-366km	Περίοδος ωτοκίας: Ιανουάριος έως Μάρτιος	-	r	-	c	c	-	c
<i>Diplodus vulgaris</i>	Αυλιάς	-	-	-		-	LC/NE	-	<u>Αυτόχθον είδος</u> Ευρυαλώδες είδος που κατοικεί σε βραχώδεις και μερικές φορές αμμώδεις πυθμένες σε βάθη 160 m, αλλά πιο συχνά σε λιγότερο από 50 m. Τα νεογνά απαντώνται μερικές φορές σε πυθμένες θαλάσσιας βλάστησης.	[Εγγραφές πεδίου]: Πελοπόννησος LF3: Διαδρομή (ΧΘ): 428.7km @ σταθμός 85m από την LF3 [Βιβλιογραφία/Βάσεις δεδομένων]: Νότιο Κρητικό Πέλαγος: Διαδρομή (ΧΘ): 0-70km Νότιο Αιγαίο Πέλαγος: Διαδρομή (ΧΘ): 70-366km	Περίοδος ωτοκίας: Δεκέμβριος έως Ιανουάριος	-	r	r	c	c	c	c

Είδος		Κατάσταση προστασίας							Οικολογία	Παρουσία εντός της Περιοχής Μελέτης	Ευαίσθητες Οικολογικές Περίοδοι	Περιοχές έργου (* Σχετικές πιθανότητες εμφάνισης)						
Επιστημονική ονομασία	Κοινή ονομασία	ΠΔ 67/1981	Σύμβαση της Βέρνης	Σύμβαση της Βόννης	Σύμβαση της Βαρκελώνης	Οδηγία 92/43/ΕΟΚ	IUCN/Βιβλίο δεδομένων κινδύνου	CITES				Νότιο Κρητικό Πέλαγος	Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)	Νότιο Αιγαίο Πέλαγος	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)	Πατραϊκός Κόλπος	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια Ζώνη & LF5)
<i>Echelus myrus</i>	Στικτομουγγρί	-	-	-	-	-	LC/NE	-	<u>Αυτόχθον είδος</u> Απαντάται σε λασπώδεις και αμμώδεις πυθμένες στις εκβολές ποταμών και σε παράκτιες λιμνοθάλασσες. Κρύβεται στην άμμο με το κεφάλι μόνο να προεξέχει. Εύρος βάθους 3 - 550 m.	[Βιβλιογραφία/Βάσεις δεδομένων]: Πατραϊκός Κόλπος: Διαδρομή (ΧΘ): 0-17,23 km	Περίοδος ωοτοκίας: Αύγουστος έως Σεπτέμβριος	-	r	r	c	c	c	c
<i>Enchelycore anatina</i>	Σμέρνα τίγρης	-	-	-	-	-	LC/-	-	<u>Χωροκατακτητικό είδος</u> Περιστασιακά απαντάται ανάμεσα σε βράχους και πετρώματα σε βάθη τουλάχιστον 10 m. Περιμένει κρυμμένη ανάμεσα στα βράχια, περιμένοντας να πλησιάσει το θήραμά της. Εύρος βάθους 3 - 60 m	[Βιβλιογραφία/Βάσεις δεδομένων]: Πελοπόννησος LF3:	Δεν υπάρχουν δεδομένα.	-	r	-	r	-	-	-
<i>Electrona risso</i>	Ηλεκτρικό φανόψαρο	-	-	-	-	-	LC/NE	-	<u>Αυτόχθον είδος</u> Είδος που απαντάται σε ύδατα μεταξύ 225-750 m κατά τη διάρκεια της ημέρας και μεταξύ 90-375 m (γόνιοι) και 450-550 m (ενήλικα) τη νύχτα. Επιτελαγικό έως μεσοπελαγικό. Αναπαράγεται κυρίως το καλοκαίρι έως το φθινόπωρο στη Μεσόγειο. Εύρος βάθους 90 - 1485 m	[Βιβλιογραφία/Βάσεις δεδομένων]: Νότιο Κρητικό Πέλαγος: Διαδρομή (ΧΘ): 0-70km Νότιο Αιγαίο Πέλαγος: Διαδρομή (ΧΘ): 70-366km	Περίοδος ωοτοκίας: Καλοκαίρι - Φθινόπωρο.	r	-	c	-	-	r	-
<i>Epinephelus alexandrines</i>	Σφυριδοπούλα	-	-	-	-	-	DD/NE	-	<u>Αυτόχθον είδος</u> Απαντάται σε αμμώδεις, λασπώδεις ή βραχώδεις πυθμένες. Εύρος βάθους 1 - 200 m, συνήθως 4 - 160 m.	[Βιβλιογραφία/Βάσεις δεδομένων]: Νότιο Κρητικό Πέλαγος: Διαδρομή (ΧΘ): 0-70km	Δεν υπάρχουν δεδομένα.	r	r	-	-	-	-	-
<i>Engraulis encrasicolus</i>	Γαύρος	-	-	-	-	-	LC/NE	-	<u>Αυτόχθον είδος</u> Κυρίως παράκτιο θαλάσσιο είδος. Περίοδος ωοτοκίας από τον Απρίλιο έως τον Νοέμβριο με κορύφωση συνήθως τους	[Βιβλιογραφία/Βάσεις δεδομένων]: Πατραϊκός Κόλπος: Διαδρομή (ΧΘ): 0-17,23 km	Περίοδος ωοτοκίας: Απρίλιος έως Αύγουστος	-	r	r	c	c	c	c



Είδος		Κατάσταση προστασίας							Οικολογία	Παρουσία εντός της Περιοχής Μελέτης	Ευαίσθητες Οικολογικές Περίοδοι	Περιοχές έργου (* Σχετικές πιθανότητες εμφάνισης)						
Επιστημονική ονομασία	Κοινή ονομασία	ΠΔ 67/1981	Σύμβαση της Βέρνης	Σύμβαση της Βόννης	Σύμβαση της Βαρκελώνης	Οδηγία 92/43/ΕΟΚ	IUCN/Βιβλίο δεδομένων κινδύνου	CITES				Νότιο Κρητικό Πέλαγος	Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)	Νότιο Αιγαίο Πέλαγος	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)	Πατραϊκός Κόλπος	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια Ζώνη & LF4)
									θερμότερους μήνες. Εύρος βάθους 0 - 400 m									
<i>Epinephelus costae</i>	-	-	-	-		-	DD/NE	-	<u>Αυτόχθον είδος</u> Απαντάται σε αμμώδεις, λασπώδεις ή βραχώδεις πυθμένες έως περίπου 200 m, συνήθως 4 - 160 m.	[Εγγραφές πεδίου]: Νότιο Κρητικό Πέλαγος: LF2: Διαδρομή (ΧΘ): 0,196km, 0,391km από την LF2 Πελοπόννησος LF3: Διαδρομή (ΧΘ): 428,4km @ σταθμός 374m από την LF3	Δεν υπάρχουν δεδομένα.	r	r	r	r	-	-	-
<i>Epinephelus marginatus</i>	-	-	III	-		-	EN/EN	-	<u>Αυτόχθον είδος</u> Τα ενήλικα ψάρια προτιμούν τους βραχώδεις πυθμένες. Οι γόννοι απαντώνται πιο κοντά στην ακτή σε βραχώδεις παλιρροϊκούς όγκους. Εύρος βάθους 8 - 300 m, συνήθως έως 50 m.	[Εγγραφές πεδίου]: Νότιο Κρητικό Πέλαγος: LF2: Διαδρομή ΧΘ: 0,391 km και 0,472 km από την LF2 Πελοπόννησος LF3: Διαδρομή (ΧΘ): 428,4km @ σταθμός 374m από την LF3	Περίοδος ωοτοκίας: Καλοκαίρι	r	r	r	c	c	r	c
<i>Epinephelus costae</i>	-	-	-	-		-	DD/NE	-	Βλ. παραπάνω. Συνώνυμο του Epinephelus costae	[Εγγραφές πεδίου]: Πελοπόννησος LF3: Διαδρομή (ΧΘ): 428.7km @ σταθμός 85m από την LF3 Πατραϊκός Κόλπος LF4: Διαδρομή (ΧΘ): 0,443km, από την LF4	Δεν υπάρχουν δεδομένα.	r	r	r	r	-	-	-
<i>Gadiculus argenteus</i>	Γουρλομάτης	-	-	-		-	DD/NE	-	<u>Αυτόχθον είδος</u> Απαντάται σε μεγάλα κοπάδια πάνω από λασπώδεις, αμμώδεις, χαλικώδεις και βραχώδεις πυθμένες. Ωοτοκεί τον χειμώνα	[Βιβλιογραφία/Βάσεις δεδομένων]: Πατραϊκός Κόλπος: Διαδρομή (ΧΘ): 0-17,23 km	Περίοδος ωοτοκίας: Ιανουάριος	r	-	-	-	-	-	-

Είδος		Κατάσταση προστασίας							Οικολογία	Παρουσία εντός της Περιοχής Μελέτης	Ευαίσθητες Οικολογικές Περίοδοι	Περιοχές έργου (* Σχετικές πιθανότητες εμφάνισης)						
Επιστημονική ονομασία	Κοινή ονομασία	ΠΑ 67/1981	Σύμβαση της Βέρνης	Σύμβαση της Βόννης	Σύμβαση της Βαρκελώνης	Οδηγία 92/43/ΕΟΚ	IUCN/Βιβλίο δεδομένων κινδύνου	CITES				Νότιο Κρητικό Πέλαγος	Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)	Νότιο Αιγαίο Πέλαγος	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)	Πατραϊκός Κόλπος	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια Ζώνη & LF5)
									στη Μεσόγειο κυρίως στο δυτικό τμήμα. Εύρος βάθους 100 - 1000 m									
<i>Galeus melastomus</i>	Μελανόσκυλος	-	-	-		-	LC/NE		<u>Αυτόχθον είδος</u> Απαντάται στις εξωτερικές υφαλοκρηπίδες και στα ανώτερα πρानή. Το εύρος βάθους του αναφέρεται στα 55m-1200m	[Βιβλιογραφία/Βάσεις δεδομένων]: Πατραϊκός Κόλπος: Διαδρομή (ΧΘ): 0-17,23 km	Περίοδος ωοτοκίας: τέλη Φεβρουαρίου έως Σεπτέμβριος	r	-	c	-	-	c	-
<i>Gobius niger</i>	Μαυρογωβιός	-	-	-		-	LC/NE	-	<u>Αυτόχθον είδος</u> Απαντάται σε εκβολές ποταμών, λιμνοθάλασσες και παράκτια ύδατα πάνω από άμμο ή λάσπη, σε θαλάσσια χόρτα ή σε φύκη. Εύρος βάθους 1 - 96 m, συνήθως 1 - 50 m.	[Βιβλιογραφία/Βάσεις δεδομένων]: Νότιο Κρητικό Πέλαγος: Διαδρομή (ΧΘ): 0-70km Νότιο Αιγαίο Πέλαγος: Διαδρομή (ΧΘ): 70-366km	Μάιος-Ιούλιος (Plymouth, Connemara)	r	r	r	c	c	r	c
<i>Gonichthys cocco</i>	Ρυγχωτό φανόψαρο	-		-		-	LC/NE	-	<u>Αυτόχθον είδος</u> Οεκάνιο, απαντάται μεταξύ 425-1.000 m κατά τη διάρκεια της ημέρας με μέγιστη αφθονία στα 425-650 m. Νυκτοεπιτελαγικό από την επιφάνεια έως τα 175 m	[Βιβλιογραφία/Βάσεις δεδομένων]: Νότιο Κρητικό Πέλαγος: Διαδρομή (ΧΘ): 0-70km Νότιο Αιγαίο Πέλαγος: Διαδρομή (ΧΘ): 70-366km	Η ωοτοκία κορυφώνεται την άνοιξη και στις αρχές του καλοκαιριού	r	-	c	-	-	r	-
<i>Gonostoma denudatum</i>	Γυμνό σμηριγγόψαρο	-	-	-		-	LC/NE	-	<u>Αυτόχθον είδος</u> Μεσοπελαγικό, γόννοι και ενήλικα ψάρια στα 400 – 700 m την ημέρα, 100 – 200 m τη νύχτα.	[Βιβλιογραφία/Βάσεις δεδομένων]: Νότιο Κρητικό Πέλαγος: Διαδρομή (ΧΘ): 0-70km Νότιο Αιγαίο Πέλαγος: Διαδρομή (ΧΘ): 70-366km	Δεν υπάρχουν δεδομένα.	r	-	c	-	-	r	-
<i>Heptranchias perlo</i>	Επτακαρχαρίας	NAI	-	-	III	-	NT/VU	-	<u>Αυτόχθον είδος</u> Απαντάται στην εξωτερική ηπειρωτική και νησιωτική υφαλοκρηπίδα και στα ανώτερα	[Βιβλιογραφία/Βάσεις δεδομένων]: Νότιο Κρητικό Πέλαγος: Διαδρομή (ΧΘ): 0-70km	Δεν υπάρχει εμφανής εποχικότητα στον	r	-	c	-	-	c	-



Είδος		Κατάσταση προστασίας							Οικολογία	Παρουσία εντός της Περιοχής Μελέτης	Ευαίσθητες Οικολογικές Περίοδοι	Περιοχές έργου (* Σχετικές πιθανότητες εμφάνισης)						
Επιστημονική ονομασία	Κοινή ονομασία	ΠΔ 67/1981	Σύμβαση της Βέρνης	Σύμβαση της Βόννης	Σύμβαση της Βαρκελώνης	Οδηγία 92/43/ΕΟΚ	IUCN/Βιβλίο δεδομένων κινδύνου	CITES				Νότιο Κρητικό Πέλαγος	Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)	Νότιο Αιγαίο Πέλαγος	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)	Πατραϊκός Κόλπος	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια Ζώνη & LF5)
									πρανή σε βάθη από 100 έως 400, επίσης στην ακτή και μέχρι τα 1.000 μέτρα.	Νότιο Αιγαίο Πέλαγος: Διαδρομή (ΧΘ): 70-366km	κύκλο αναπαραγωγής του							
<i>Hippocampus guttulatus</i>	Μακρόρρυγχος ιππόκαμπος	-	II	-	II	-	DD/NE	II	<u>Αυτόχθον είδος</u> Απαντάται κυρίως σε ρηχά παράκτια νερά, συμπεριλαμβανομένων των παράκτιων λιμνοθάλασσων μεταξύ φυκών και χελιών (Zostera ή Posidonia), ή ανάμεσα σε βράχους και σε πυθμένες με χαλίκια. Εύρος βάθους 1 - 20 m	[Βιβλιογραφία/Βάσεις δεδομένων]: Πατραϊκός Κόλπος: Διαδρομή (ΧΘ): 0-17,23 km	Δεν υπάρχουν στοιχεία για την Ανατολική Μεσόγειο	-	r	-	c	c	-	c
<i>Hygophum benoiti</i>	Φανόψαρο του Μπενουά	-	-	-		-	LC/NE	-	<u>Αυτόχθον είδος</u> Είδος που απαντάται σε υψηλά ωκεάνια ύδατα, σε βάθη κάτω από τα 700 μέτρα κατά τη διάρκεια της ημέρας και πάνω από τα 600 μέτρα τη νύχτα (μέγιστη αφθονία μεταξύ 51-100 m και 301-350 m τη νύχτα)	[Βιβλιογραφία/Βάσεις δεδομένων]: Νότιο Κρητικό Πέλαγος: Διαδρομή (ΧΘ): 0-70km Νότιο Αιγαίο Πέλαγος: Διαδρομή (ΧΘ): 70-366km	Κορύφωση ωτοκίας την άνοιξη-καλοκαίρι, με εξέλιξη από την ανατολή προς τη δύση (Μεσόγειος)	r	-	c	-	-	r	-
<i>Hygophum hygomii</i>	Φανόψαρο των Βερμούδων	-	-	-		-	LC/NE	-	<u>Αυτόχθον είδος</u> Είδος που απαντάται σε υψηλά ωκεάνια ύδατα, μεσοπελαγικό. Μεσόγειος: ημέρα στα 600-750 μ. νυκτοεπιπελαγικό στην επιφάνεια και μέχρι τα 235 m.	[Βιβλιογραφία/Βάσεις δεδομένων]: Νότιο Κρητικό Πέλαγος: Διαδρομή (ΧΘ): 0-70km Νότιο Αιγαίο Πέλαγος: Διαδρομή (ΧΘ): 70-366km	Κορύφωση ωτοκίας στα τέλη του καλοκαιριού και το φθινόπωρο (Μεσόγειος)	r	-	c	-	-	r	-
<i>Isurus oxyrinchus</i>	Ρυγγοκαρχαρίας	-	III	I, II	III	-	VU/CR	II	<u>Αυτόχθον είδος</u> Ο ρυγγοκαρχαρίας είναι ένα κοσμοπολίτικο είδος, κυρίως ωκεάνιο, παράκτιο και επιπελαγικό, που απαντάται σε βάθη μεταξύ 1 και 500 μέτρων. Σύμφωνα με τις καταγραφές, ο ρυγγοκαρχαρίας έχει μειωθεί δραματικά στη Μεσόγειο Θάλασσα και, ως εκ τούτου, το είδος αξιολογείται ως	[Βιβλιογραφία/Βάσεις δεδομένων]: Νότιο Κρητικό Πέλαγος: Διαδρομή (ΧΘ): 0-70km Νότιο Αιγαίο Πέλαγος: Διαδρομή (ΧΘ): 70-366km	Δεν υπάρχουν δεδομένα.	r	r	c	c	r	r	r

Είδος		Κατάσταση προστασίας							Οικολογία	Παρουσία εντός της Περιοχής Μελέτης	Ευαίσθητες Οικολογικές Περίοδοι	Περιοχές έργου (* Σχετικές πιθανότητες εμφάνισης)						
Επιστημονική ονομασία	Κοινή ονομασία	ΠΔ 67/1981	Σύμβαση της Βέρνης	Σύμβαση της Βόννης	Σύμβαση της Βαρκελώνης	Οδηγία 92/43/ΕΟΚ	IUCN/Βιβλίο δεδομένων κινδύνου	CITES				Νότιο Κρητικό Πέλαγος	Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)	Νότιο Αιγαίο Πέλαγος	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)	Πατραϊκός Κόλπος	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια Ζώνη & LF5)
									Κρισίμως Κινδυνεύον στη Μεσόγειο Θάλασσα.									
<i>Labrus merula</i>	Μαυροχειλού	-	-	-		-	LC/	-	<u>Αυτόχθον είδος</u> Τα ενήλικα απαντώνται γύρω από βράχους και φύκη. Αναπαράγεται τον Φεβρουάριο έως τον Μάιο στη Μεσόγειο. Εύρος βάθους 1 - 50 m.	[Βιβλιογραφία/Βάσεις δεδομένων]: Νότιο Κρητικό Πέλαγος: Διαδρομή (ΧΘ): 0-70km Νότιο Αιγαίο Πέλαγος: Διαδρομή (ΧΘ): 70-366km	Αναπαράγεται τον Φεβρουάριο έως τον Μάιο στη Δυτική Μεσόγειο. Δεν υπάρχουν στοιχεία για την Ανατολική Μεσόγειο	-	c	-	c	c	-	c
<i>Lamna nasus</i>	Λάμια	-	III	II		-	VU/CR	II	<u>Αυτόχθον είδος</u> Απαντάται παράκτια σε υπεράκτιες αλιευτικές όχθες και περιστασιακά σε ανοιχτές ωκεάνιες περιοχές. Εύρος βάθους μεταξύ 0-750 m.	[Βιβλιογραφία/Βάσεις δεδομένων]: Νότιο Κρητικό Πέλαγος: Διαδρομή (ΧΘ): 0-70km Νότιο Αιγαίο Πέλαγος: Διαδρομή (ΧΘ): 70-366km Πατραϊκός Κόλπος: Διαδρομή (ΧΘ): 0-17,23km	Δεν υπάρχουν δεδομένα.	r	r	r	r	r	r	r
<i>Lampanyctus pusillus</i>	Πυγμαίο φανόψαρο	-	-	-		-	LC/NE	-	<u>Αυτόχθον είδος</u> Είδος που απαντάται σε υψηλά ωκεάνια ύδατα, μεταξύ 425-850 m κατά τη διάρκεια της ημέρας και μεταξύ 40-125 m τη νύχτα	[Βιβλιογραφία/Βάσεις δεδομένων]: Νότιο Κρητικό Πέλαγος: Διαδρομή (ΧΘ): 0-70km Νότιο Αιγαίο Πέλαγος: Διαδρομή στη θάλασσα: (ΧΘ): 70-366km	Κορύφωση ωτοκίας τέλη καλοκαιριού-φθινόπωρο	r	-	c	-	-	c	-
<i>Lepidopus caudatus</i>	Σπαθόψαρο	-	-	-		-	DD/NE	-	<u>Αυτόχθον είδος</u> Απαντάται στην υφαλοκρηπίδα, κατά μήκος της άκρης και του άνω πρηνούς της μέχρι τα 400 μέτρα, συνήθως πάνω από αμμώδεις και λασπώδεις πυθμένες από	[Βιβλιογραφία/Βάσεις δεδομένων]: Πατραϊκός Κόλπος: Διαδρομή (ΧΘ): 0-17,23 km	Περίοδος ωτοκίας: Ιούνιος έως Αύγουστος	r	-	c	-	-	c	-

Είδος		Κατάσταση προστασίας							Οικολογία	Παρουσία εντός της Περιοχής Μελέτης	Ευαίσθητες Οικολογικές Περίοδοι	Περιοχές έργου (* Σχετικές πιθανότητες εμφάνισης)						
Επιστημονική ονομασία	Κοινή ονομασία	ΠΔ 67/1981	Σύμβαση της Βέρνης	Σύμβαση της Βόννης	Σύμβαση της Βαρκελώνης	Οδηγία 92/43/ΕΟΚ	IUCN/Βιβλίο δεδομένων κινδύνου	CITES				Νότιο Κρητικό Πέλαγος	Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)	Νότιο Αιγαίο Πέλαγος	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)	Πατραϊκός Κόλπος	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια Ζώνη & LF5)
									100 έως 250 μέτρα. Εύρος βάθους 42 - 620 m									
<i>Lepidorhombus boscii</i>	Ζαγκέτα	-	-	-		-	LC/NE	-	<u>Αυτόχθον είδος</u> Κατοικεί σε μαλακούς πυθμένες. Εύρος βάθους 7 - 800 m	[Βιβλιογραφία/Βάσεις δεδομένων]: Πατραϊκός Κόλπος; Διαδρομή (ΧΘ): 0-17,23 km	Δεν υπάρχουν δεδομένα.	r	r	c	c	c	c	c
<i>Lestidiops sphyrenoides</i>	-	-	-	-		-	LC/NE	-	<u>Αυτόχθον είδος</u> Επι- έως μεσοπελαγικό, δεν υπάρχουν δεδομένα για τα ενήλικα ψάρια, αλλά έχουν συλλεγεί προνύμφες και γόνοι σε ανώτερα ύδατα βάθους 400 μέτρων. Εύρος βάθους 50 - 600 m.	[Βιβλιογραφία/Βάσεις δεδομένων]: Νότιο Κρητικό Πέλαγος; Διαδρομή (ΧΘ): 0-70km Διαδρομή Νοτίου Αιγαίου: (ΧΘ): 70-366km	Περίοδος ωοτοκίας: όλο το χρόνο.	r	-	c	-	-	c	-
<i>Lithognathus mormyrus</i>	Μουρμούρα	-	-	-		-	LC/NE	-	<u>Αυτόχθον είδος</u> Παραθαλάσσια ύδατα με αμμώδεις ή λασπώδεις πυθμένες, μερικές φορές σε λιβάδια Ποσειδωνίας, έως τα 80 μέτρα (ανατολική Μεσόγειος)	[Βιβλιογραφία/Βάσεις δεδομένων]: Νότιο Κρητικό Πέλαγος; Διαδρομή (ΧΘ): 0-70km Νότιο Αιγαίο Πέλαγος; Διαδρομή στη θάλασσα: (ΧΘ): 70-366km	Περίοδος ωοτοκίας: άνοιξη και καλοκαίρι	-	r	c	c	c	c	c
<i>Lobianchia dofleini</i>	Φανόψαρο του Ντοφλάιν	-	-	-		-	LC/NE	-	<u>Αυτόχθον είδος</u> Είδος που απαντάται σε υψηλά ωκεάνια ύδατα, μεταξύ 300-750 m κατά τη διάρκεια της ημέρας και μεταξύ 20-400 m τη νύχτα. Εύρος βάθους 0 - 4000 m.	[Βιβλιογραφία/Βάσεις δεδομένων]: Νότιο Κρητικό Πέλαγος; Διαδρομή (ΧΘ): 0-70km Νότιο Αιγαίο Πέλαγος; Διαδρομή στη θάλασσα: (ΧΘ): 70-366km	Περίοδος ωοτοκίας: Φεβρουάριος έως Ιούνιος	r	r	c	c	r	r	r
<i>Lobianchia gemellarii</i>	-	-	-	-		-	LC/NE	-	<u>Αυτόχθον είδος</u> Μεσοπελαγικό είδος που απαντάται σε υψηλά ωκεάνια ύδατα, μεταξύ 300-800 m	[Βιβλιογραφία/Βάσεις δεδομένων]:	Δεν υπάρχουν δεδομένα.	r	r	c	c	r	r	r

Είδος		Κατάσταση προστασίας							Οικολογία	Παρουσία εντός της Περιοχής Μελέτης	Ευαίσθητες Οικολογικές Περίοδοι	Περιοχές έργου (* Σχετικές πιθανότητες εμφάνισης)						
Επιστημονική ονομασία	Κοινή ονομασία	ΠΔ 67/1981	Σύμβαση της Βέρνης	Σύμβαση της Βόννης	Σύμβαση της Βαρκελώνης	Οδηγία 92/43/ΕΟΚ	IUCN/Βιβλίο δεδομένων κινδύνου	CITES				Νότιο Κρητικό Πέλαγος	Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)	Νότιο Αιγαίο Πέλαγος	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)	Πατραϊκός Κόλπος	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια Ζώνη & LF5)
									κατά τη διάρκεια της ημέρας και μεταξύ 25-100 m και 200-300 τη νύχτα.	Νότιο Κρητικό Πέλαγος: Διαδρομή (ΧΘ): 0-70km Νότιο Αιγαίο Πέλαγος: Διαδρομή (ΧΘ): 70-366km								
<i>Lophius piscatorius</i>	Πεσκαντρίτσα	-	-	-		-	LC/NE	-	<u>Αυτόχθον είδος</u> Απαντάται σε αμμώδεις και λασπώδεις πυθμένες από την ακτή (κάτω από 20 m) έως βάθη 1.000 μέτρων.	[Βιβλιογραφία/Βάσεις δεδομένων]: Πατραϊκός Κόλπος: Διαδρομή (ΧΘ): 0-17,23 km	Περίοδος ωοτοκίας: Φεβρουάριος έως Ιούλιος	r	r	r	c	r	r	r
<i>Luvarus imperialis</i>	Λούβαρος	-	-	-		-	LC/NE	-	Ωκεάνιο και επιπελαγικό. Απαντάται κοντά στην επιφάνεια ή σε βαθιά ύδατα. Εύρος βάθους 0 - 200 m.	[Βιβλιογραφία/Βάσεις δεδομένων]: Πατραϊκός Κόλπος: Διαδρομή (ΧΘ): 0-17,23 km	Περίοδος ωοτοκίας: Μάρτιος έως Αύγουστος	r	r	c	c	r	r	r
<i>Macroramphosus scolopax</i>	Μπεκατσόψαρο	-	-	-		-	LC/NE	-	<u>Αυτόχθον είδος</u> Απαντάται μεταξύ πυθμένα και μεσόνερων στην κάτω υφαλοκρηπίδα, πάνω από την άμμο. Εύρος βάθους 25 - 600 m, συνήθως 50 - 350 m.	[Βιβλιογραφία/Βάσεις δεδομένων]: Πατραϊκός Κόλπος: Διαδρομή (ΧΘ): 0-17,23 km	Δεν υπάρχουν δεδομένα.	r	r	c	c	c	c	c
<i>Maurolicus muelleri</i>	Μαυρόλυκος	-	-	-		-	LC/NE	-	<u>Αυτόχθον είδος</u> Ωκεάνιο, απαντάται σε βάθη τουλάχιστον 1.524 μ. Μεταναστεύει στη στήλη ύδατος σε βάθη 150-250 m κατά τη διάρκεια της ημέρας και σε περίπου 50 m τη νύχτα. Αφθονεί σε υφαλοπρανή και θαλάσσια όρη, ενώ απαντάται σπάνια στον ανοιχτό ωκεανό	[Βιβλιογραφία/Βάσεις δεδομένων]: Πατραϊκός Κόλπος: Διαδρομή (ΧΘ): 0-17,23 km	Περίοδος ωοτοκίας: Μάρτιος – Σεπτέμβριος	r	r	r	r	-	-	-
<i>Merluccius merluccius</i>	Μπακαλιάρος	-	-	-		-	LC/NE	-	<u>Αυτόχθον είδος</u> Βρίσκεται συνήθως σε βάθος μεταξύ 70 και 370 μέτρων. Τα ενήλικα ψάρια ζουν κοντά	[Βιβλιογραφία/Βάσεις δεδομένων]:	Όλο το χρόνο	r	r	r	r	r	r	r

Είδος		Κατάσταση προστασίας							Οικολογία	Παρουσία εντός της Περιοχής Μελέτης	Ευαίσθητες Οικολογικές Περίοδοι	Περιοχές έργου (* Σχετικές πιθανότητες εμφάνισης)						
Επιστημονική ονομασία	Κοινή ονομασία	ΠΔ 67/1981	Σύμβαση της Βέρνης	Σύμβαση της Βόννης	Σύμβαση της Βαρκελώνης	Οδηγία 92/43/ΕΟΚ	IUCN/Βιβλίο δεδομένων κινδύνου	CITES				Νότιο Κρητικό Πέλαγος	Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)	Νότιο Αιγαίο Πέλαγος	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)	Πατραϊκός Κόλπος	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια Ζώνη & LF5)
									στον πυθμένα κατά τη διάρκεια της ημέρας, αλλά κινούνται και στα ανώτερα ύδατα τη νύχτα. Εύρος βάθους 30 - 1075 m, συνήθως 70 - 400 m.	Πατραϊκός Κόλπος: Διαδρομή (ΧΘ): 0-17,23 km								
<i>Micromesistius poutassou</i>	Προσφυγάκι	-	-	-		-	NE/NE	-	<u>Αυτόχθον είδος</u> Απαντάται σε υφαλοπρανή και στην υφαλοκρηπίδα σε βάθος πάνω από 1000 μέτρα, αλλά συνήθως στα 300-400 μέτρα. Πραγματοποιεί καθημερινές κατακόρυφες μεταναστεύσεις: στα επιφανειακά ύδατα τη νύχτα και κοντά στον πυθμένα κατά τη διάρκεια της ημέρας.	[Βιβλιογραφία/Βάσεις δεδομένων]: Πατραϊκός Κόλπος: Διαδρομή (ΧΘ): 0-17,23 km	Δεν υπάρχουν δεδομένα.	r	r	r	r	r		
<i>Muraena helena</i>	Σμέρνα	-	-	-		-	LC/NE	-	<u>Αυτόχθον είδος</u> Κατοικεί σε υφάλους και συνήθως κρύβεται μέσα σε τρύπες και στριφογυρίζει σαν φίδι μέσα σε σχισμές, κάτω από βράχους ή κοράλλια. Εύρος βάθους 1 - 801 m, συνήθως 100 - 300 m.	[Εγγραφές πεδίου]: Πελοπόννησος LF3: Διαδρομή (ΧΘ): 428.7km @ σταθμός 85m από την LF3 [Βιβλιογραφία/Βάσεις δεδομένων]: Πατραϊκός Κόλπος: Διαδρομή (ΧΘ): 0-17,23 km	Θερμή υδρολογική περίοδος	r	c	c	c	c		
<i>Mobula mobular</i>	Διαβολόψαρο	NAI	II	I	II	-	EN/EN	II	Περιορίζεται κυρίως στη Μεσόγειο Θάλασσα. Εμφανίζεται σε υπεράκτια, βαθιά νερά και, περιστασιακά, σε ρηχά νερά σε όλη τη Μεσόγειο Θάλασσα.	[Βιβλιογραφία/Βάσεις δεδομένων]: Νότιο Κρητικό Πέλαγος: Διαδρομή (ΧΘ): 0-70km Νότιο Αιγαίο Πέλαγος: Διαδρομή (ΧΘ): 70-366km	Δεν υπάρχουν δεδομένα.	r	c	c	c	c		



Είδος		Κατάσταση προστασίας							Οικολογία	Παρουσία εντός της Περιοχής Μελέτης	Ευαίσθητες Οικολογικές Περίοδοι	Περιοχές έργου (* Σχετικές πιθανότητες εμφάνισης)						
Επιστημονική ονομασία	Κοινή ονομασία	ΠΔ 67/1981	Σύμβαση της Βέρνης	Σύμβαση της Βόννης	Σύμβαση της Βαρκελώνης	Οδηγία 92/43/ΕΟΚ	IUCN/Βιβλίο δεδομένων κινδύνου	CITES				Νότιο Κρητικό Πέλαγος	Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)	Νότιο Αιγαίο Πέλαγος	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)	Πατραϊκός Κόλπος	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια Ζώνη & LF5)
										Πατραϊκός Κόλπος: Διαδρομή (ΧΘ): 0-17,23km								
<i>Mugil cephalus</i>	Κέφαλος	-	-	-		-	LC/NE	-	Κοσμοπολίτικο είδος που κατοικεί στα παράκτια νερά των τροπικών, υποτροπικών και εύκρατων ζωνών όλων των θαλασσών. Τα ενήλικα ψάρια απαντώνται σε παράκτια ύδατα ενώ εισέρχονται συχνά στις εκβολές ποταμών και σε ποτάμια. Συνήθως απαντάται σε κοπάδια πάνω από αμμώδεις ή λασπώδεις πυθμένες μεταξύ 0 και 10 m	[Βιβλιογραφία/Βάσεις δεδομένων]: Νότιο Κρητικό Πέλαγος: Διαδρομή (ΧΘ): 0-70km Νότιο Αιγαίο Πέλαγος: Διαδρομή (ΧΘ): 70-366km	Περίοδος ωοτοκίας: από Μάιο έως Ιούλιο	-	r	-	c	r	-	r
<i>Mullus barbatus</i>	Κουτσομούρα	-	-	-		-	LC/NE	-	Απαντάται σε χαλικώδεις, αμμώδεις και λασπώδεις πυθμένες στην υφαλοκρηπίδα. Εύρος βάθους 10 - 300 m, συνήθως 100 - 300 m.	[Βιβλιογραφία/Βάσεις δεδομένων]: Πελοπόννησος LF3 Πατραϊκός Κόλπος: Διαδρομή (ΧΘ): 0-17,23 km	Περίοδος ωοτοκίας: Απρίλιος έως Αύγουστος	c	c	c	c	c	c	c
<i>Mullus surmuletus</i>	Μπαρμπούνι	-	-	-		-	DD/NE	-	Τα ενήλικα ψάρια απαντώνται σε σπασμένα και τραχιά εδάφη, αλλά επίσης πάνω σε αμμώδεις και μαλακούς πυθμένες σε βάθη μικρότερα από 100 m. Εύρος βάθους από 5-60 m.	[Βιβλιογραφία/Βάσεις δεδομένων]: Νότιο Κρητικό Πέλαγος: Διαδρομή (ΧΘ): 0-70km Νότιο Αιγαίο Πέλαγος: Διαδρομή (ΧΘ): 70-366km Πελοπόννησος LF3 Πατραϊκός Κόλπος: Διαδρομή (ΧΘ): 0-17,23 km	Περίοδος ωοτοκίας: από Μάιο έως Ιούλιο	r	r	r	c	c	r	c
<i>Mustelus mustelus</i>	Γκριζογαλέος	-	-	-		-	EN/NE		Απαντάται στις υφαλοκρηπίδες και στις υψηλότερες πλαγιές, από τη μεσοπαλιρροιακή περιοχή έως τουλάχιστον	[Βιβλιογραφία/Βάσεις δεδομένων]: Πελοπόννησος LF3	Δεν υπάρχουν δεδομένα.	r	r	r	c	c	r	c



Είδος		Κατάσταση προστασίας							Οικολογία	Παρουσία εντός της Περιοχής Μελέτης	Ευαίσθητες Οικολογικές Περίοδοι	Περιοχές έργου (* Σχετικές πιθανότητες εμφάνισης)						
Επιστημονική ονομασία	Κοινή ονομασία	ΠΔ 67/1981	Σύμβαση της Βέρνης	Σύμβαση της Βόννης	Σύμβαση της Βαρκελώνης	Οδηγία 92/43/ΕΟΚ	IUCN/Βιβλίο δεδομένων κινδύνου	CITES				Νότιο Κρητικό Πέλαγος	Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)	Νότιο Αιγαίο Πέλαγος	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)	Πατραϊκός Κόλπος	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια Ζώνη & LF5)
									350 μέτρα βάθος. Εύρος βάθους 5 - 624 m, συνήθως 5 - 50 m.									
<i>Mustelus punctulatus</i>	Στικτογαλέος	-	-	-		-	VU/NE	-	Παράκτιος, ηπειρωτικός καρχαρίας που κατοικεί στον βυθό. Θαλάσσιο, βενθοπελαγικό είδος.	[Βιβλιογραφία/Βάσεις δεδομένων]: Πατραϊκός Κόλπος: Διαδρομή (ΧΘ): 0-17,23 km	Δεν υπάρχουν δεδομένα.	r	c	r	c	c	c	c
<i>Myctophum punctatum</i>	Κηλιδωτό φανόψαρο	-	-	-		-	LC/NE	-	<u>Αυτόχθον είδος</u> Μεσοπελαγικό είδος που απαντάται σε υψηλά ωκεάνια ύδατα. Μεσογειακό. Νυκτοεπιτελαγικό στην επιφάνεια και έως τα 125 m, ενώ απαντάται σε βάθος μεταξύ 225-750 m κατά τη διάρκεια της ημέρας. Εύρος βάθους 0 - 1000 m	[Βιβλιογραφία/Βάσεις δεδομένων]: Νότιο Κρητικό Πέλαγος: Διαδρομή (ΧΘ): 0-70km Νότιο Αιγαίο Πέλαγος: Διαδρομή (ΧΘ): 70-366km	Περίοδος ωτοκίας: στη Μεσόγειο συνεχίζεται σε χαμηλό επίπεδο μέχρι το καλοκαίρι.	r	r	c	c	c	c	c
<i>Notoscopelus bolini</i>	-	-	-	-		-	LC/NE	-	Μεσοπελαγικό είδος που απαντάται σε υψηλά ωκεάνια ύδατα. Μπορεί να απαντηθεί σε βάθος από 1.000 m κατά τη διάρκεια της ημέρας και στα 12-200 m τη νύχτα	[Βιβλιογραφία/Βάσεις δεδομένων]: Νότιο Κρητικό Πέλαγος: Διαδρομή (ΧΘ): 0-70km Νότιο Αιγαίο Πέλαγος: Διαδρομή (ΧΘ): 70-366km	Δεν υπάρχουν δεδομένα.	r	r	c	c	c	c	c
<i>Oxynotus centrina</i>	Οξύνωτος	-	-	-	II	-	VU/CR	-	<u>Αυτόχθον είδος</u> Απαντάται στις εξωτερικές υφαλοκρηπίδες και στα ανώτερα πρανή. Εύρος βάθους 40 - 777 m	[Βιβλιογραφία/Βάσεις δεδομένων]: Νότιο Κρητικό Πέλαγος: Διαδρομή (ΧΘ): 0-70km Νότιο Αιγαίο Πέλαγος: Διαδρομή (ΧΘ): 70-366km Πατραϊκός Κόλπος: Διαδρομή (ΧΘ): 0-17,23 km	Δεν υπάρχουν δεδομένα.	r	-	c	-	-	c	-



Είδος		Κατάσταση προστασίας							Οικολογία	Παρουσία εντός της Περιοχής Μελέτης	Ευαίσθητες Οικολογικές Περίοδοι	Περιοχές έργου (* Σχετικές πιθανότητες εμφάνισης)						
Επιστημονική ονομασία	Κοινή ονομασία	ΠΔ 67/1981	Σύμβαση της Βέρνης	Σύμβαση της Βόννης	Σύμβαση της Βαρκελώνης	Οδηγία 92/43/ΕΟΚ	IUCN/Βιβλίο δεδομένων κινδύνου	CITES				Νότιο Κρητικό Πέλαγος	Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)	Νότιο Αιγαίο Πέλαγος	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)	Πατραϊκός Κόλπος	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια Ζώνη & LF5)
<i>Oblada melanura</i>	Μελανούρι	-	-	-	-	-	LC/NE	-	<u>Αυτόχθον είδος</u> Κοινωνικό, συγκεντρώνεται πάνω από βραχώδεις βυθούς ή πυθμένες με θαλάσσια βλάστηση. Εύρος βάθους έως 30 m.	[Εγγραφές πεδίου]: Πελοπόννησος LF3: Διαδρομή (ΧΘ): 428.7km @ σταθμός 85m από την LF3 [Βιβλιογραφία/Βάσεις δεδομένων]: Νότιο Κρητικό Πέλαγος: Διαδρομή (ΧΘ): 0-70km Νότιο Αιγαίο Πέλαγος: Διαδρομή (ΧΘ): 70-366km	Περίοδος ωοτοκίας: Απρίλιος έως Ιούνιος	-	c	-	c	c	-	c
<i>Pagellus acarne</i>	Μουσμούλι	-	-	-	-	-	LC/NE	-	<u>Αυτόχθον είδος</u> Τα ενήλικα ψάρια κατοικούν σε διάφορους τύπους πυθμένων, ειδικά σε πυθμένες θαλάσσιας βλάστησης και αμμώδεις πυθμένες έως 500 μέτρα βάθος, αλλά συνήθως μεταξύ 40 και 100 μέτρων. Οι γόννοι απαντώνται πιο κοντά στην ακτή.	Πατραϊκός Κόλπος: Διαδρομή (ΧΘ): 0-17,23 km	Περίοδος ωοτοκίας:	r	c	c	c	c	c	c
<i>Pagellus erythrinus</i>	Λυθρίνι	-	-	-	-	-	LC/NE	-	<u>Αυτόχθον είδος</u> Απαντάται σε παράκτια νερά, σε διάφορους πυθμένες (βραχώδεις, χαλικώδεις, αμμώδεις και λασπώδεις) έως 200 m (Μεσόγειος) και μετακινείται σε βαθύτερα ύδατα τον χειμώνα.	[Βιβλιογραφία/Βάσεις δεδομένων]: Πελοπόννησος LF3 Πατραϊκός Κόλπος: Διαδρομή (ΧΘ): 0-17,23 km	Πιθανώς να έχει δύο περιόδους ωοτοκίας στη νότια Μεσόγειο	r	c	r	c	c	c	c
<i>Parablennius tentacularis</i>	Κεραιοσαλιάρα	-	-	-	-	-	LC/NE	-	<u>Αυτόχθον είδος</u> Τα ενήλικα ψάρια εμφανίζονται πάνω από αμμώδεις πυθμένες με πέτρες και ελαφριά βλάστηση. Εύρος βάθους 3 - 15 m	[Βιβλιογραφία/Βάσεις δεδομένων]: Νότιο Κρητικό Πέλαγος: Διαδρομή (ΧΘ): 0-70km	Περίοδος ωοτοκίας: Μάρτιος-Μάιος	-	r	-	c	c	-	c



Είδος		Κατάσταση προστασίας							Οικολογία	Παρουσία εντός της Περιοχής Μελέτης	Ευαίσθητες Οικολογικές Περίοδοι	Περιοχές έργου (* Σχετικές πιθανότητες εμφάνισης)						
Επιστημονική ονομασία	Κοινή ονομασία	ΠΔ 67/1981	Σύμβαση της Βέρνης	Σύμβαση της Βόννης	Σύμβαση της Βαρκελώνης	Οδηγία 92/43/ΕΟΚ	IUCN/Βιβλίο δεδομένων κινδύνου	CITES				Νότιο Κρητικό Πέλαγος	Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)	Νότιο Αιγαίο Πέλαγος	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)	Πατραϊκός Κόλπος	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια Ζώνη & LF5)
										Νότιο Αιγαίο Πέλαγος: Διαδρομή (ΧΘ): 70-366km								
<i>Paralepis coregonoides</i>	Σουβλομούτης	-	-	-		-	LC/NE	-	<u>Αυτόχθον είδος</u> Οικότοπος: μεσο- έως βεθυπελαγικός πάνω από βαθιά ύδατα, γόνιοι επι- έως μεσοπελαγικός. Εύρος βάθους 50 - 1032 m, συνήθως 200 - 600 m.	[Βιβλιογραφία/Βάσεις δεδομένων]: Νότιο Κρητικό Πέλαγος: Διαδρομή (ΧΘ): 0-70km Νότιο Αιγαίο Πέλαγος: Διαδρομή (ΧΘ): 70-366km	Περίοδος ωτοκίας: Συνεχής από τον Μάρτιο έως τον Σεπτέμβριο σε εύκρατα ύδατα.	r	-	r	-	-	-	r
<i>Pegusa impar</i>	Γλώσσα Αδριατικής	-	-	-		-	LC/NE	-	<u>Αυτόχθον είδος</u> Θαλάσσιο, βενθικό, εύρος βάθους 5 - 100 m.	[Βιβλιογραφία/Βάσεις δεδομένων]: Πατραϊκός Κόλπος: Διαδρομή (ΧΘ): 0-17,23 km	Δεν υπάρχουν δεδομένα.	r	r	r	c	c	r	c
<i>Peristedion cataphractum</i>	Κερατόψαρο	-	-	-		-	LC/ NE	-	<u>Αυτόχθον είδος</u> Μετά την παρουσία τους στο πέλαγος, οι γόνιοι ζουν σε παράκτια ύδατα προτού μεταναστεύσουν σε βαθύτερα ύδατα. Απαντάται σε λασπώδεις ή βραχώδεις πυθμένες στην υφαλοκρηπίδα. Εύρος βάθους 50 - 848 m.	[Βιβλιογραφία/Βάσεις δεδομένων]: Πατραϊκός Κόλπος: Διαδρομή (ΧΘ): 0-17,23 km	Περίοδος ωτοκίας: Ιούλιος έως Αύγουστος	r	-	c	-	-	c	-
<i>Phycis blennoides</i>	Λασποσαλούβαρδος	-	-	-		-	NE/NE	-	<u>Αυτόχθον είδος</u> Απαντάται σε αμμώδεις και λασπώδεις βυθούς. Οι γόνιοι είναι πιο παράκτιοι και απαντώνται στην υφαλοκρηπίδα ενώ τα ενήλικα ψάρια μεταναστεύουν κατά μήκος του πρανούς. Εύρος βάθους από 10 – 1200 m.	[Βιβλιογραφία/Βάσεις δεδομένων]: Πατραϊκός Κόλπος: Διαδρομή (ΧΘ): 0-17,23 km	Περίοδος ωτοκίας: Ιανουάριος έως Μάιος	r	r	c	c	c	c	c
<i>Prionace glauca</i>	Γλαυκός καρχαρίας	-	III	-	III	-	NT/VU	-	<u>Αυτόχθον είδος</u> Παγκόσμια εξάπλωση. Είναι ωκεάνιο, αλλά μπορεί να απαντηθεί κοντά στην ακτή.	[Βιβλιογραφία/Βάσεις δεδομένων]:	Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα	r	r	c	c	r	r	r

Είδος		Κατάσταση προστασίας							Οικολογία	Παρουσία εντός της Περιοχής Μελέτης	Ευαίσθητες Οικολογικές Περίοδοι	Περιοχές έργου (* Σχετικές πιθανότητες εμφάνισης)						
Επιστημονική ονομασία	Κοινή ονομασία	ΠΔ 67/1981	Σύμβαση της Βέρνης	Σύμβαση της Βόννης	Σύμβαση της Βαρκελώνης	Οδηγία 92/43/ΕΟΚ	IUCN/Βιβλίο δεδομένων κινδύνου	CITES				Νότιο Κρητικό Πέλαγος	Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)	Νότιο Αιγαίο Πέλαγος	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)	Πατραϊκός Κόλπος	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια Ζώνη & LF5)
									Εύρος βάθους 1 - 1000 m, συνήθως 1 - 220 m.	Νότιο Κρητικό Πέλαγος: Διαδρομή (ΧΘ): 0-70km Νότιο Αιγαίο Πέλαγος: Διαδρομή (ΧΘ): 70-366km	για συγκεκριμένη περίοδο ωοτοκίας.							
<i>Polyprion americanus</i>	Βλάχος	-	-	-		-	NT/NE	-	<u>Αυτόχθον είδος</u> Τα ενήλικα ψάρια προτιμούν να κατοικούν σε σπηλιές και ναυάγια. Οι γόνοι συγκεντρώνονται κάτω από πλωτά αντικείμενα. Εύρος βάθους 40 - 600 m.	[Βιβλιογραφία/Βάσεις δεδομένων]: Πατραϊκός Κόλπος: Διαδρομή (ΧΘ): 0-17,23 km	Περίοδος ωοτοκίας: Καλοκαίρι	r	-	r	-	-	r	-
<i>Pomatomus saltatrix</i>	Γοφάρι	-	-	-		-	NT/NE	-	<u>Αυτόχθον είδος</u> Απαντάται σε ωκεάνια και παράκτια ύδατα. Συνηθίζεται κατά μήκος των ακτών για σέρφινγκ και των βράχων σε καθαρά νερά υψηλής ενέργειας, αν και τα ενήλικα ψάρια μπορούν επίσης να απαντηθούν σε εκβολές ποταμών και σε υφάλμυρα νερά. Τα μικρά ψάρια μπορούν να απαντηθούν σε ρηχά παράκτια νερά βάθους τουλάχιστον 2 m. Εύρος βάθους 0 - 200 m.	[Βιβλιογραφία/Βάσεις δεδομένων]: Πατραϊκός Κόλπος: Διαδρομή (ΧΘ): 0-17,23 km	Περίοδος ωοτοκίας: Μάρτιος έως Αύγουστος	r	r	r	c	c	c	c
<i>Pterois miles</i>	Λιονταρόψαρο	-	-	-		-	LC/NE	-	<u>Χωροκατακτητικό είδος</u> Ζει σε παράκτια ύδατα σε λασπώδεις οικότοπους. Ελάχιστο βάθος 0m. Εύρος βάθους 0 - 85 m.	[Εγγραφές πεδίου]: Νότια Κρήτη LF2: Διαδρομή ΧΘ:0,472 χλμ από LF2 [Βιβλιογραφία/Βάσεις δεδομένων]: Πελοπόννησος LF3: Διαδρομή (ΧΘ): 70-366km	Δεν υπάρχουν δεδομένα.	-	r	-	r	-	-	-

Είδος		Κατάσταση προστασίας							Οικολογία	Παρουσία εντός της Περιοχής Μελέτης	Ευαίσθητες Οικολογικές Περίοδοι	Περιοχές έργου (* Σχετικές πιθανότητες εμφάνισης)						
Επιστημονική ονομασία	Κοινή ονομασία	ΠΔ 67/1981	Σύμβαση της Βέρνης	Σύμβαση της Βόννης	Σύμβαση της Βαρκελώνης	Οδηγία 92/43/ΕΟΚ	IUCN/Βιβλίο δεδομένων κινδύνου	CITES				Νότιο Κρητικό Πέλαγος	Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)	Νότιο Αιγαίο Πέλαγος	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)	Πατραϊκός Κόλπος	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια Ζώνη & LF5)
Raja clavata	Καλκανόβατος	-	-	-	-	-	NT/NE	-	Αυτόχθον είδος Κατοικεί σε ύδατα της υφαλοκρηπίδας και των άνω πρανών. Απαντάται σε λασπώδεις, αμμώδεις και χαλικώδεις πυθμένες, ενώ σπανίως σε πιο τραχείς πυθμένες. Εύρος βάθους 10 - 300 m. Συνηθέστερα εμφανίζεται σε παράκτια ύδατα βάθους μεταξύ 10-60 m	[Βιβλιογραφία/Βάσεις δεδομένων]: Πατραϊκός Κόλπος: Διαδρομή (ΧΘ): 0-17,23 km	Περίοδος ωοτοκίας: Φεβρουάριος έως Σεπτέμβριος, με κορύφωση τον Ιούνιο	-	r	r	c	c	r	c
Raja miraletus	Ματόβατος	-	-	-	-	-	LC/NE	-	Αυτόχθον είδος Απαντάται σε μαλακούς πυθμένες της υφαλοκρηπίδας και στα υψηλότερα πρανή. Εύρος βάθους 17 - 462 m. Συνηθέστερα εμφανίζεται σε βάθη μεταξύ 50 – 150 m	[Βιβλιογραφία/Βάσεις δεδομένων]: Πατραϊκός Κόλπος: Διαδρομή (ΧΘ): 0-17,23 km	Περίοδος ωοτοκίας: Όλο το έτος	-	r	r	c	c	c	c
Raja polystigma	Στικτόβατος	-	-	-	-	-	LC/NE	-	Αυτόχθον είδος Απαντάται κυρίως σε μαλακούς πυθμένες. Εύρος βάθους 100 - 400 m.	[Βιβλιογραφία/Βάσεις δεδομένων]: Πατραϊκός Κόλπος: Διαδρομή (ΧΘ): 0-17,23 km	Δεν υπάρχουν δεδομένα.	r	r	r	c	c	c	c
Rhinobatos rhinobatos	Ρινόβατος	-	-	-	-	-	EN/NE	-	Αυτόχθον είδος Κατοικεί σε αμμώδεις και λασπώδεις πυθμένες, από τη μεσοπαλιρροιακή ζώνη έως περίπου 100 m. Μερικές φορές απαντάται κοντά σε βραχώδεις υφάλους. Εύρος βάθους 0 - 100 m.	[Βιβλιογραφία/Βάσεις δεδομένων]: Πατραϊκός Κόλπος: Διαδρομή (ΧΘ): 0-17,23 km	Δεν υπάρχουν δεδομένα.	-	-	-	r	c	c	c
Sardina pilchardus	Σαρδέλα	-	-	-	-	-	NT/NE	-	Αυτόχθον είδος Παράκτιο είδος, που απαντάται συνήθως σε βάθη από 25 έως 55 ή ακόμα και 100 m την ημέρα, φτάνοντας στα 10 έως 35 m τη νύχτα. Αναπαράγεται σε ύψος 20 έως 25 m,	[Βιβλιογραφία/Βάσεις δεδομένων]: Πελοπόννησος LF3 Πατραϊκός Κόλπος: Διαδρομή (ΧΘ): 0-17,23 km	Περίοδος ωοτοκίας: Σεπτέμβριος έως Δεκέμβριος/ Ιανουάριος έως Μάιος	r	r	r	c	c	c	c

Είδος		Κατάσταση προστασίας							Οικολογία	Παρουσία εντός της Περιοχής Μελέτης	Ευαίσθητες Οικολογικές Περίοδοι	Περιοχές έργου (* Σχετικές πιθανότητες εμφάνισης)						
Επιστημονική ονομασία	Κοινή ονομασία	ΠΔ 67/1981	Σύμβαση της Βέρνης	Σύμβαση της Βόννης	Σύμβαση της Βαρκελώνης	Οδηγία 92/43/ΕΟΚ	IUCN/Βιβλίο δεδομένων κινδύνου	CITES				Νότιο Κρητικό Πέλαγος	Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)	Νότιο Αιγαίο Πέλαγος	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)	Πατραϊκός Κόλπος	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια Ζώνη & LF5)
									κοντά στην ακτή ή έως και 100 km στα ανοιχτά.									
<i>Sardinella aurita</i>	Φρίσσα	-	-	-		-	LC/NE	-	<u>Αυτόχθον είδος</u> Απαντάται στην ακτή και κοντά στην επιφάνεια προς την άκρη της υφαλοκρηπίδας και μέχρι τα 350 m.	[Βιβλιογραφία/Βάσεις δεδομένων]: Πατραϊκός Κόλπος: Διαδρομή (ΧΘ): 0-17,23 km	Περίοδος ωοτοκίας: Ιούνιος έως Αύγουστος	r	r	r	c	c	c	c
<i>Sarpa salpa</i>	Σάλπα	-	-	-		-	LC/NE	-	<u>Αυτόχθον είδος</u> Απαντάται σε βραχώδη υποστρώματα και αμμώδεις περιοχές με ανάπτυξη φυκών. Κοινωνικό είδος, το οποίο σχηματίζει ενίοτε μεγάλα κοπάδια. Εύρος βάθους 5 - 70 m.	[Βιβλιογραφία/Βάσεις δεδομένων]: Διαδρομή (ΧΘ): 0-70km Νότιο Αιγαίο Πέλαγος: Διαδρομή (ΧΘ): 70-366km	Περίοδος ωοτοκίας: δύο περίοδοι (άνοιξη και φθινόπωρο) ανάλογα με τη θερμοκρασία του νερού	-	r	r	c	c	c	c
<i>Scorpaena porcus</i>	Μαυροσκορπιός	-	-	-		-	LC/NE	-	<u>Αυτόχθον είδος.</u> Βενθικό παράκτιο είδος που απαντάται συνήθως μεταξύ πετρωμάτων και άλγης. Μπορεί να εμφανιστεί μέχρι τα 800 m.	[Βιβλιογραφία/Βάσεις δεδομένων]: Νότιο Κρητικό Πέλαγος: Διαδρομή (ΧΘ): 0-70km Νότιο Αιγαίο Πέλαγος: Διαδρομή (ΧΘ): 70-366km	Δεν υπάρχουν δεδομένα.	-	r	c	c	c	c	c
<i>Scorpaena scrofa</i>	Σκορπίνα	-	-	-		-	LC/NE	-	<u>Αυτόχθον είδος</u> Μοναχικό και μη αποδημητικό είδος που κάθεται πάνω σε βραχώδεις, αμμώδεις ή λασπώδεις πυθμένες. Εύρος βάθους 20 – 500, συνήθως έως τα 150 m βάθος.	[Βιβλιογραφία/Βάσεις δεδομένων]: Νότιο Κρητικό Πέλαγος: Διαδρομή (ΧΘ): 0-70km Νότιο Αιγαίο Πέλαγος: Διαδρομή (ΧΘ): 70-366km	Δεν υπάρχουν δεδομένα.	-	r	c	c	c	c	c
<i>Scorpaena notata</i>	Σκορπίδι	-	-	-		-	LC/NE	-	<u>Αυτόχθον είδος</u> Απαντάται συνήθως σε βραχώδεις παραθαλάσσιους οικοτόπους. Εύρος βάθους 10 - 700 m.	[Βιβλιογραφία/Βάσεις δεδομένων] Πατραϊκός Κόλπος: Διαδρομή (ΧΘ): 0-17,23 km	Περίοδος ωοτοκίας: Σεπτέμβριος	r	c	c	c	c	c	c

Είδος		Κατάσταση προστασίας							Οικολογία	Παρουσία εντός της Περιοχής Μελέτης	Ευαίσθητες Οικολογικές Περίοδοι	Περιοχές έργου (* Σχετικές πιθανότητες εμφάνισης)						
Επιστημονική ονομασία	Κοινή ονομασία	ΠΔ 67/1981	Σύμβαση της Βέρνης	Σύμβαση της Βόννης	Σύμβαση της Βαρκελώνης	Οδηγία 92/43/ΕΟΚ	IUCN/Βιβλίο δεδομένων κινδύνου	CITES				Νότιο Κρητικό Πέλαγος	Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)	Νότιο Αιγαίο Πέλαγος	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)	Πατραϊκός Κόλπος	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια Ζώνη & LF5)
<i>Sciaena umbra</i>	Σκιός	-	III	-		-	NT/NT	-	<u>Αυτόχθον είδος</u> Απαντάται σε ρηχά παράκτια νερά κυρίως σε βραχώδεις και αμμώδεις πυθμένες, εισχωρεί συνήθως στις εκβολές ποταμών και είναι πιο δραστήριο τη νύχτα. Κατοικεί επίσης σε σπηλιές και υφάλους. Εύρος βάθους 1 - 200 m.	[Βιβλιογραφία/Βάσεις δεδομένων]: Πατραϊκός Κόλπος: Διαδρομή (ΧΘ): 0-17,23 km	Περίοδος ωοτοκίας: Μάρτιος έως Αύγουστος	-	c	r	c	c	c	c
<i>Scyliorhinus canicula</i>	Σκυλοψαράκι	-	-	-		-	LC/NE	-	<u>Αυτόχθον είδος</u> Το πιο σύνηθες σκυλόψαρο στα παράκτια ύδατα της Ευρώπης. Κατοικεί σε υφαλοκρηπίδες και ανώτερα πρηνή. Απαντάται σε αμμώδεις, κοραλλιογενείς, πλούσιους σε φύκη, χαλικώδεις ή λασπώδεις πυθμένες. Εμφανίζεται σε βάθος έως και 400 m στη Μεσόγειο Θάλασσα.	[Βιβλιογραφία/Βάσεις δεδομένων]: Πατραϊκός Κόλπος: Διαδρομή (ΧΘ): 0-17,23 km	Δεν υπάρχουν δεδομένα.	-	r	r	c	c	c	c
<i>Scyliorhinus stellaris</i>	Γατοψαράκι	-	-	-		-	NE/NT	-	<u>Αυτόχθον είδος</u> Κοινός παράκτιος και υπεράκτιος καρχαρίας που απαντάται στην υφαλοκρηπίδα πάνω από τραχιά, ακόμη και βραχώδη ή κοραλλιογενή εδάφη και πυθμένες καλυμμένους με φύκη. Απαντάται σε βάθη από 1 ή 2 m έως τουλάχιστον 125 m. Εύρος βάθους 1 - 400 m, συνήθως 20 - 63 m.	[Βιβλιογραφία/Βάσεις δεδομένων]: Πατραϊκός Κόλπος: Διαδρομή (ΧΘ): 0-17,23 km	Δεν υπάρχουν δεδομένα.	-	r	c	c	c	c	c
<i>Serranus cabrilla</i>	Χάνος	-	-	-		-	LC/NE	-	<u>Αυτόχθον είδος</u> Απαντάται στην υφαλοκρηπίδα και στο άνω πρηνές βραχών, πυθμένων Ποσειδωνίας, καθώς και σε αμμώδεις και λασπώδεις πυθμένες. Εύρος βάθους 5 - 500 m.	[Εγγραφές πεδίου]: Νότια Κρήτη LF2: Διαδρομή ΧΘ:0,196 χλμ και 0.472 χλμ από την LF2	Περίοδος ωοτοκίας: Απρίλιος-Ιούλιος (Μεσόγειος)	r	c	c	c	c	c	c



Είδος		Κατάσταση προστασίας							Οικολογία	Παρουσία εντός της Περιοχής Μελέτης	Ευαίσθητες Οικολογικές Περίοδοι	Περιοχές έργου (* Σχετικές πιθανότητες εμφάνισης)						
Επιστημονική ονομασία	Κοινή ονομασία	ΠΔ 67/1981	Σύμβαση της Βέρνης	Σύμβαση της Βόννης	Σύμβαση της Βαρκελώνης	Οδηγία 92/43/ΕΟΚ	IUCN/Βιβλίο δεδομένων κινδύνου	CITES				Νότιο Κρητικό Πέλαγος	Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)	Νότιο Αιγαίο Πέλαγος	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)	Πατραϊκός Κόλπος	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια Ζώνη & LF5)
										Πελοπόννησος LF3: Διαδρομή (ΧΘ): 428,7km και 428,4km και 427,9 @ σταθμός 85m και 374m και 824 m από την LF3. [Βιβλιογραφία/Βάσεις δεδομένων]: Νότιο Κρητικό Πέλαγος: Διαδρομή (ΧΘ): 0-70km Νότιο Αιγαίο Πέλαγος: Διαδρομή (ΧΘ): 70-366km								
Serranus hepatus	Καψομούλα	-	-	-		-	LC/NE	-	<u>Αυτόχθον είδος</u> Απαντάται πάνω από θαλάσσια χόρτα, άμμο, λάσπη και βράχους. Εύρος βάθους 5 - 100 m.	[Βιβλιογραφία/Βάσεις δεδομένων]: Νότιο Κρητικό Πέλαγος: Διαδρομή (ΧΘ): 0-70km Νότιο Αιγαίο Πέλαγος: Διαδρομή (ΧΘ): 70-366km	Περίοδος ωοτοκίας: Μάρτιος έως Αύγουστος (Μεσόγειος).	r	c	c	c	c	c	c
Serranus scriba	Πέρκα	-	-	-		-	LC/NE	-	<u>Αυτόχθον είδος</u> Απαντάται σε βραχώδεις πυθμένες και σε πυθμένες Ποσειδωνίας. Εμφανίζεται επίσης σε λασπώδη υποστρώματα ή υποστρώματα με πλούσια βλάστηση φυκών ή θαλάσσιων χόρτων. Εύρος βάθους 5 - 150 m, συνήθως 30 m.	[Εγγραφές πεδίου]: Πελοπόννησος LF3: Διαδρομή (ΧΘ): 428,7km και 428,4km @ σταθμός 85m και 374m από την LF3. Πατραϊκός Κόλπος LF4: Διαδρομή ΧΘ: 0,443km και 0,809km από την LF4 [Βιβλιογραφία/Βάσεις δεδομένων]:	Περίοδος ωοτοκίας: Απρίλιος έως Αύγουστος	r	r	r	c	c	c	c



ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED



Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων

Αρ.Εγγρ: PERM-GREE-ESIA-A08_0012_0 Annex8G

Αναθ. : 00

Σελ.: 90 από 106

Είδος		Κατάσταση προστασίας							Οικολογία	Παρουσία εντός της Περιοχής Μελέτης	Ευαίσθητες Οικολογικές Περίοδοι	Περιοχές έργου (* Σχετικές πιθανότητες εμφάνισης)						
Επιστημονική ονομασία	Κοινή ονομασία	ΠΔ 67/1981	Σύμβαση της Βέρνης	Σύμβαση της Βόννης	Σύμβαση της Βαρκελώνης	Οδηγία 92/43/ΕΟΚ	IUCN/Βιβλίο δεδομένων κινδύνου	CITES				Νότιο Κρητικό Πέλαγος	Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)	Νότιο Αιγαίο Πέλαγος	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)	Πατραϊκός Κόλπος	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια Ζώνη & LF5)
										Νότιο Κρητικό Πέλαγος: Διαδρομή (ΧΘ): 0-70km Νότιο Αιγαίο Πέλαγος: Διαδρομή (ΧΘ): 70-366km								
<i>Siganus luridus/rivulatus</i>	Μαύρη αγριόσαλπα	-	-	-		-	LC/NE	-	<u>Χωροκατακτητικό είδος</u> Απαντάται σε μικρά κοπάδια σε πολύ ρηχά νερά κοντά στον πυθμένα. Προτιμά τους σκληρούς πυθμένες από συμπαγή άμμο με υπολείμματα βράχων ή κοραλλιών. Εύρος βάθους 2 - 40 m	[Εγγραφές πεδίου]: Πελοπόννησος LF3: Διαδρομή (ΧΘ): 428.7km @ σταθμός 85m από την LF3 [Βιβλιογραφία/Βάσεις δεδομένων]: Πατραϊκός Κόλπος: Διαδρομή (ΧΘ): 0-17,23 km	Περίοδος ωοτοκίας: Ιούνιος έως Αύγουστος	-	c	-	r	-	-	-
<i>Sparus aurata</i>	Τσιπούρα	-	-	-		-	LC/NE	-	<u>Αυτόχθον είδος</u> Απαντάται σε βυθούς με θαλάσσια χόρτα και αμμώδεις βυθούς καθώς και στη ζώνη των σέρφερ συνήθως σε βάθη περίπου 30 m, αλλά τα ενήλικα ψάρια μπορεί να εμφανιστούν σε βάθος 150 m. Την άνοιξη, εμφανίζεται συχνά σε παράκτιες λιμνοθάλασσες και εκβολές ποταμών με υφάλμυρο νερό.	[Βιβλιογραφία/Βάσεις δεδομένων]: Νότιο Κρητικό Πέλαγος: Διαδρομή (ΧΘ): 0-70km Νότιο Αιγαίο Πέλαγος: Διαδρομή (ΧΘ): 70-366km Πατραϊκός Κόλπος: Διαδρομή (ΧΘ): 0-17,23 km	Περίοδος ωοτοκίας: Οκτώβριος έως Δεκέμβριος	-	r	r	c	c	r	c
<i>Sphyrna tudes</i>	Μικροζύγαινα	-	-	-	III	-	CR/NE	-	<u>Αυτόχθον είδος</u> Ελάχιστα γνωστός παράκτιος καρχαρίας της υφαλοκρηπίδας, που απαντάται σε βάθος τουλάχιστον 12 m	[Βιβλιογραφία/Βάσεις δεδομένων]: Πατραϊκός Κόλπος: Διαδρομή (ΧΘ): 0-17,23 km	Περίοδος ωοτοκίας: Δεν υπάρχουν δεδομένα.	-	-	-	r	c	-	c
<i>Sphyrna zygaena</i>	Ζύγαινα	-	-	II		-	DD/NE	II	<u>Αυτόχθον είδος</u> Εμφανίζεται σε παράκτια και πολύ υπεράκτια εδάφη πάνω από ηπειρωτικές και νησιωτικές υφαλοκρηπίδες. Παράκτιο,	[Βιβλιογραφία/Βάσεις δεδομένων]: Πατραϊκός Κόλπος: Διαδρομή (ΧΘ): 0-17,23 km	Περίοδος ωοτοκίας: Δεν υπάρχουν δεδομένα.	r	r	r	r	r	r	r



Είδος		Κατάσταση προστασίας							Οικολογία	Παρουσία εντός της Περιοχής Μελέτης	Ευαίσθητες Οικολογικές Περίοδοι	Περιοχές έργου (* Σχετικές πιθανότητες εμφάνισης)						
Επιστημονική ονομασία	Κοινή ονομασία	ΠΔ 67/1981	Σύμβαση της Βέρνης	Σύμβαση της Βόννης	Σύμβαση της Βαρκελώνης	Οδηγία 92/43/ΕΟΚ	IUCN/Βιβλίο δεδομένων κινδύνου	CITES				Νότιο Κρητικό Πέλαγος	Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)	Νότιο Αιγαίο Πέλαγος	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)	Πατραϊκός Κόλπος	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια Ζώνη & LF5)
									πελαγικό και ημι-ωκεάνιο είδος, το οποίο εμφανίζεται ωστόσο συχνά στον πυθμένα, στα 1-139 m. Εύρος βάθους 0 - 200 m, συνήθως έως τα 20 m.									
Spicara maena	Μένουλα	-	-	-		-	LC/NE	-	<u>Αυτόχθον είδος</u> Τα ενήλικα ψάρια απαντώνται στη νεριτική ζώνη, συνήθως πάνω από πυθμένες Ποσειδωνίας και σε αμμώδεις, λασπώδεις και βραχώδεις πυθμένες μέχρι περίπου τα 100 m. Εξαπλώνεται σε βάθη από 30m έως 90m.	[Εγγραφές πεδίου]: Πελοπόννησος LF3: Διαδρομή (ΧΘ): 428,4km @ σταθμός 374m από την LF3 [Βιβλιογραφία/Βάσεις δεδομένων]: Πατραϊκός Κόλπος: Διαδρομή (ΧΘ): 0-17,23 km	Περίοδος ωοτοκίας: Αύγουστος έως Οκτώβριος	-	r	c	c	c	c	c
Spicara flexuosa	Μένουλα	-	-	-		-	LC/NE	-	<u>Αυτόχθον είδος</u> Απαντάται σε αμμώδεις ή λασπώδεις πυθμένες, σε βάθος έως περίπου 130 m	[Βιβλιογραφία/Βάσεις δεδομένων]: Πατραϊκός Κόλπος: Διαδρομή (ΧΘ): 0-17,23 km	Περίοδος ωοτοκίας: Αύγουστος έως Οκτώβριος	-	-	r	r	-	-	-
Squalus acanthias	Κεντρόνι	-	-	II	III	-	EN/NE	-	<u>Αυτόχθον είδος</u> Ίσως ο πιο άφθονος εν ζωή καρχαρίας. Βενθοπελαγικό, παράκτιο και υπεράκτιο σκυλόψαρο της ηπειρωτικής και νησιωτικής υφαλοκρηπίδας και των ανώτερων πρανών. Συχνά απαντάται στον βυθό, αλλά εμφανίζεται επίσης στα μεσόνερα και στην επιφάνεια. Εμφανίζεται κυρίως σε βάθος μεταξύ 10-200 m	[Βιβλιογραφία/Βάσεις δεδομένων]: Πελοπόννησος LF3: Διαδρομή (ΧΘ):70- 366km	Περίοδος ωοτοκίας: Συνήθως τον χειμώνα.	r	r	r	r	r	r	r
Squalus Blainville	Γκριζοκεντρόνι	-	-	-		-	DD/NE	-	<u>Αυτόχθον είδος</u> Απαντάται στις υφαλοκρηπίδες και στα ανώτερα πρανή. Εύρος βάθους από 16-440 m.	Πατραϊκός Κόλπος: Διαδρομή (ΧΘ): 0-17,23 km	Περίοδος ωοτοκίας: όλο το χρόνο	r	r	c	c	c	c	c

Είδος		Κατάσταση προστασίας							Οικολογία	Παρουσία εντός της Περιοχής Μελέτης	Ευαίσθητες Οικολογικές Περίοδοι	Περιοχές έργου (* Σχετικές πιθανότητες εμφάνισης)						
Επιστημονική ονομασία	Κοινή ονομασία	ΠΑ 67/1981	Σύμβαση της Βέρνης	Σύμβαση της Βόννης	Σύμβαση της Βαρκελώνης	Οδηγία 92/43/ΕΟΚ	IUCN/Βιβλίο δεδομένων κινδύνου	CITES				Νότιο Κρητικό Πέλαγος	Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)	Νότιο Αιγαίο Πέλαγος	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)	Πατραϊκός Κόλπος	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια Ζώνη & LF5)
<i>Squalius peloponensis</i>	Ποταμοκέφαλος	-	-	-		-	LC/ LC	-	<u>Αυτόχθον είδος</u> Κατοικεί σε ρέματα που καταλήγουν σε ποτάμια με μέτρια έως γρήγορη ροή. Τρέφεται με ποικιλία φυτικών και ζωικών τροφών.	[Βιβλιογραφία/Βάσεις δεδομένων]: Νότιο Κρητικό Πέλαγος: Διαδρομή (ΧΘ): 0-70km Νότιο Αιγαίο Πέλαγος: Διαδρομή (ΧΘ): 70-366km	Περίοδος ωοτοκίας: Μάρτιος έως Μάιος	-	-	-	-	-	-	
<i>Squatina squatina</i>	Ρίνα	-	III	-	II	-	CR/NE	-	<u>Αυτόχθον είδος</u> Βενθικό είδος που απαντάται στις ακτές, κοντά στις ακτές και κατά μήκος της υφαλοκρηπίδας. Μπορεί να εισέλθει στις εκβολές ποταμών. Απαντάται κυρίως σε αμμώδεις ή λασπώδεις πυθμένες. Εύρος βάθους 5 - 150 m.	[Βιβλιογραφία/Βάσεις δεδομένων]: Πατραϊκός Κόλπος: Διαδρομή (ΧΘ): 0-17,23 km	Δεν έχει καταγραφεί περίοδος ωοτοκίας για την Ελλάδα.	-	r	r	c	c	c	c
<i>Sparisoma cretensis</i>	Σκάρος	NAI	-	-		-	LC /NE	-	<u>Αυτόχθον είδος</u> Σε ρηχά νερά κατά μήκος βραχωδών ακτών. Αναπαράγεται από τον Ιούλιο έως τον Σεπτέμβριο. Εύρος βάθους 20 - 50 m.	[Εγγραφές πεδίου]: Πελοπόννησος LF3: Διαδρομή (ΧΘ): 428,7km και 428,4km @ σταθμός 85m και 374m από την LF3. [Βιβλιογραφία/Βάσεις δεδομένων]: Πατραϊκός Κόλπος: Διαδρομή (ΧΘ): 0-17,23 km	Ιούλιος έως Σεπτέμβριος	-	c	-	c	c	-	c
<i>Argentina sphyraena</i>	Γουρλομάτης	-	-	-		-	DD/NE	-	<u>Αυτόχθον είδος</u> Πελαγικό-νερτικό είδος που απαντάται σε παράκτια και υπεράκτια ύδατα. Εύρος βάθους 0 - 100 m, συνήθως σε βάθος έως 50 m.	[Βιβλιογραφία/Βάσεις δεδομένων]: Πατραϊκός Κόλπος: Διαδρομή (ΧΘ): 0-17,23 km	Περίοδος ωοτοκίας: Δεν υπάρχουν στοιχεία για τη Μεσόγειο	-	r	r	c	c	c	c
<i>Stephanolepis diaspros</i>	Μονόχειρος	-	-	-		-	LC /NE	-	<u>Χωροκατακτητικό είδος</u>	[Βιβλιογραφία/Βάσεις δεδομένων]:	Δεν υπάρχουν δεδομένα.	-	r	-	r	r	-	r

Είδος		Κατάσταση προστασίας							Οικολογία	Παρουσία εντός της Περιοχής Μελέτης	Ευαίσθητες Οικολογικές Περίοδοι	Περιοχές έργου (* Σχετικές πιθανότητες εμφάνισης)						
Επιστημονική ονομασία	Κοινή ονομασία	ΠΔ 67/1981	Σύμβαση της Βέρνης	Σύμβαση της Βόννης	Σύμβαση της Βαρκελώνης	Οδηγία 92/43/ΕΟΚ	IUCN/Βιβλίο δεδομένων κινδύνου	CITES				Νότιο Κρητικό Πέλαγος	Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)	Νότιο Αιγαίο Πέλαγος	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)	Πατραϊκός Κόλπος	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια Ζώνη & LF5)
									Ζει σε παράκτια βραχώδη υποστρώματα, συνήθως με βλάστηση. Ένας από τους παλαιότερους λεσσεψιανούς μετανάστες, ο οποίος έχει εγκατασταθεί μόνιμα στο ανατολικό τμήμα της Μεσογείου και κατοικεί σε διάφορα υποστρώματα, ενώ συνήθως απαντάται σε βραχώδεις πυθμένες με βλάστηση, σε αμμώδεις και λασπώδεις πυθμένες καθώς και σε λιβάδια με θαλάσσια βλάστηση. Εύρος βάθους 20 - 50 m.	Πελοπόννησος LF3								
<i>Stomias boa</i>	Δρακόψαρο	-	-	-		-	LC/NE	-	<u>Αυτόχthon είδος</u> Κατοικεί σε βαθιά ωκεάνια ύδατα σε βάθος μεγαλύτερο από 1.000 m. Μπορεί να μεταναστεύσει σε ύδατα κοντά στην επιφάνεια τη νύχτα.	[Βιβλιογραφία/Βάσεις δεδομένων]: Νότιο Κρητικό Πέλαγος: Διαδρομή (ΧΘ): 0-70km Νότιο Αιγαίο Πέλαγος: Διαδρομή (ΧΘ): 70-366km	Δεν υπάρχουν δεδομένα.	c	-	r	-	-	r	-
<i>Symbolophorus veranyi</i>	Μακρόλεπο φανόψαρο	-	-	-		-	LC/NE	-	<u>Αυτόχthon είδος</u> Είδος που απαντάται σε υψηλά ωκεάνια ύδατα, στα 550-700 m κατά τη διάρκεια της ημέρας και νυκτοεπιτελαγικά στην επιφάνεια και μέχρι τα 800 m. Εύρος βάθους 0 - 800 m.	[Βιβλιογραφία/Βάσεις δεδομένων]: Νότιο Κρητικό Πέλαγος: Διαδρομή (ΧΘ): 0-70km Νότιο Αιγαίο Πέλαγος: Διαδρομή (ΧΘ): 70-366km	Δεν υπάρχουν δεδομένα.	r	r	c	c	c	c	c
<i>Symphurus ligulatus</i>	Στικτοσυμφόγλωσσα	-	-	-		-	LC/NE		<u>Αυτόχthon είδος</u> Απαντάται σε λασπώδεις πυθμένες στην υφαλοκρηπίδα. Εύρος βάθους 70 - 1480 m.	[Βιβλιογραφία/Βάσεις δεδομένων]: Πελοπόννησος LF3 Πατραϊκός Κόλπος: Διαδρομή (ΧΘ): 0-17,23 km	Δεν υπάρχουν δεδομένα.	r	-	r	-	-	-	r

Είδος		Κατάσταση προστασίας							Οικολογία	Παρουσία εντός της Περιοχής Μελέτης	Ευαίσθητες Οικολογικές Περίοδοι	Περιοχές έργου (* Σχετικές πιθανότητες εμφάνισης)						
Επιστημονική ονομασία	Κοινή ονομασία	ΠΔ 67/1981	Σύμβαση της Βέρνης	Σύμβαση της Βόννης	Σύμβαση της Βαρκελώνης	Οδηγία 92/43/ΕΟΚ	IUCN/Βιβλίο δεδομένων κινδύνου	CITES				Νότιο Κρητικό Πέλαγος	Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)	Νότιο Αιγαίο Πέλαγος	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)	Πατραϊκός Κόλπος	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια Ζώνη & LF5)
<i>Symphodus cinereus</i>	Φαγανέλι	-	-	-	-	-	LC/NE	-	<u>Αυτόχθον είδος</u> Οικότοπος: παραθαλάσσια ύδατα, με πυθμένες με θαλάσσια βλάστηση, ενίοτε σε μαλακούς πυθμένες (1-20 m), συχνά σε λιμνοθάλασσες και εκβολές ποταμών με άφθονη βλάστηση και συντρίμια.	[Βιβλιογραφία/Βάσεις δεδομένων]: Νότιο Κρητικό Πέλαγος: Διαδρομή (ΧΘ): 0-70km Νότιο Αιγαίο Πέλαγος: Διαδρομή (ΧΘ): 70-366km	Δεν υπάρχουν δεδομένα.	-	r	-	c	c	-	c
<i>Symphodus tinca</i>	Ταωλαπίνα	-	-	-	-	-	LC/NE	-	<u>Αυτόχθον είδος</u> Τα ενήλικα ψάρια απαντώνται κοντά σε βράχους, κυρίως σε πυθμένες με θαλάσσια βλάστηση, και ενίοτε σε αλμυρές λιμνοθάλασσες. Τα αρσενικά κατασκευάζουν και συντηρούν φωλιές από φύκη ενώ η ωοτοκία πραγματοποιείται από ένα ή περισσότερα θηλυκά. Εύρος βάθους 1 - 50 m.	[Βιβλιογραφία/Βάσεις δεδομένων]: Νότιο Κρητικό Πέλαγος: Διαδρομή (ΧΘ): 0-70km Νότιο Αιγαίο Πέλαγος: Διαδρομή (ΧΘ): 70-366km	Περίοδος ωοτοκίας: Μάρτιος έως Ιούνιος (ακτές της Βόρειας Αφρικής)	-	c	-	c	c	-	c
<i>Symphodus sp.</i>	Λαβρίδα	-	-	-	-	-	LC/NE	-	<u>Αυτόχθον είδος</u> Απαντάται στην παραθαλάσσια ζώνη, κοντά σε βράχους και σε βυθούς με θαλάσσια βλάστηση, καθώς και σε λίμνες. Εύρος βάθους 1 - 30 m.	[Εγγραφές πεδίου]: Πελοπόννησος LF3: Διαδρομή (ΧΘ): 428.7km @ σταθμός 85m από την LF3	Δεν υπάρχουν δεδομένα.	-	-	-	r	r	-	r
<i>Thalassoma pavo</i>	Γαιτανούρι	-	-	-	-	-	LC/NE	-	<u>Αυτόχθον είδος</u> Κατοικεί σε παράκτια ύδατα κοντά σε βράχους και πυθμένες με θαλάσσια βλάστηση. Εύρος βάθους 1 - 150 m, συνήθως 1 - 50 m.	[Εγγραφές πεδίου]: Νότια Κρήτη LF2: Διαδρομή ΧΘ: 0,196km, από την LF2 Πελοπόννησος LF3: Διαδρομή (ΧΘ): 428.7km @ σταθμός 85m από την LF3 [Βιβλιογραφία/Βάσεις δεδομένων]:	Περίοδος ωοτοκίας: Ιούνιος έως Ιούλιος	r	c	r	c	c	c	c

Είδος		Κατάσταση προστασίας							Οικολογία	Παρουσία εντός της Περιοχής Μελέτης	Ευαίσθητες Οικολογικές Περίοδοι	Περιοχές έργου (* Σχετικές πιθανότητες εμφάνισης)						
Επιστημονική ονομασία	Κοινή ονομασία	ΠΔ 67/1981	Σύμβαση της Βέρνης	Σύμβαση της Βόννης	Σύμβαση της Βαρκελώνης	Οδηγία 92/43/ΕΟΚ	IUCN/Βιβλίο δεδομένων κινδύνου	CITES				Νότιο Κρητικό Πέλαγος	Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)	Νότιο Αιγαίο Πέλαγος	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)	Πατραϊκός Κόλπος	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια Ζώνη & LF5)
										Νότιο Κρητικό Πέλαγος: Διαδρομή (ΧΘ): 0-70km Νότιο Αιγαίο Πέλαγος: Διαδρομή (ΧΘ): 70-366km								
<i>Thunnus thynnus</i>	Ερυθρός τόννος	-	-	-		-	LC/EN	-	<u>Αυτόχθον είδος</u> Απαντάται στον Ανατολικό και Κεντρικό Ατλαντικό και σε ολόκληρη τη Μεσόγειο Θάλασσα, που αποτελεί την περιοχή αναπαραγωγής του. Εύρος βάθους 0 - 985 m.	[Βιβλιογραφία/Βάσεις δεδομένων]: Νότιο Κρητικό Πέλαγος: Διαδρομή (ΧΘ): 0-70km Νότιο Αιγαίο Πέλαγος: Διαδρομή (ΧΘ): 70-366km	Περίοδος κορύφωσης ωοτοκίας: Μάιος έως Ιούνιος	r	r	c	r	r	r	r
<i>Torpedo marmorata</i>	Μαρμαρομουδιάστρα	-	-	-		-	LC/NE	-	<u>Αυτόχθον είδος</u> Απαντάται σε περιοχές με θαλάσσια βλάστηση, βραχώδεις υφάλους και παρακείμενους μαλακούς πυθμένες. Εύρος βάθους 2 - 370 m.	[Βιβλιογραφία/Βάσεις δεδομένων]: Πατραϊκός Κόλπος: Διαδρομή (ΧΘ): 0-17,23 km	Περίοδος ωοτοκίας: Δεν υπάρχουν δεδομένα.	r	r	r	c	c	c	c
<i>Torpedo nobiliana</i>	Μαυρομουδιάστρα	-	-	-		-	LC/NE	-	<u>Αυτόχθον είδος</u> Οι γόννοι είναι βενθικά είδη που εμφανίζονται πάνω από μαλακούς πυθμένες ή κοντά σε κοραλλιογενείς υφάλους σε βάθη από 10-150 m. Τα ενήλικα ψάρια είναι ημιπελαγικά έως πελαγικά είδη, κολυμπούν στη στήλη ύδατος και υπάρχουν αναφορές ότι μεταναστεύουν σε μεγάλες αποστάσεις. Απαντώνται σε νησιωτικές πλαγιές σε βάθος τουλάχιστον 925 m	[Βιβλιογραφία/Βάσεις δεδομένων]: Πατραϊκός Κόλπος: Διαδρομή (ΧΘ): 0-17,23 km	Περίοδος ωοτοκίας: Περίοδος κύησης ένα έτος. Δεν υπάρχει συγκεκριμένος μήνας ωοτοκίας	r	r	r	c	c	c	c



Είδος		Κατάσταση προστασίας							Οικολογία	Παρουσία εντός της Περιοχής Μελέτης	Ευαίσθητες Οικολογικές Περιόδους	Περιοχές έργου (* Σχετικές πιθανότητες εμφάνισης)						
Επιστημονική ονομασία	Κοινή ονομασία	ΠΔ 67/1981	Σύμβαση της Βέρνης	Σύμβαση της Βόννης	Σύμβαση της Βαρκελώνης	Οδηγία 92/43/ΕΟΚ	IUCN/Βιβλίο δεδομένων κινδύνου	CITES				Νότιο Κρητικό Πέλαγος	Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)	Νότιο Αιγαίο Πέλαγος	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)	Πατραϊκός Κόλπος	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια Ζώνη & LF5)
<i>Torpedo torpedo</i>	Ματομουδιάστρα	-	-	-	-	-	LC/NE	-	Απαντάται σε μαλακούς πυθμένες, συνήθως στην ξηρά αλλά ενίοτε και πιο βαθιά. Εύρος βάθους 2 - 400 m.	[Βιβλιογραφία/Βάσεις δεδομένων]: Πατραϊκός Κόλπος: Διαδρομή (ΧΘ): 0-17,23 km	Περίοδος ωοτοκίας: Δεν υπάρχουν δεδομένα.	r	r	c	c	c	c	c
<i>Torquigener flavimaculosus</i>	Πιτσιλωτός τετραόδοντας	-	-	-	-	-	LC/NE	-	<u>Χωροκατακτητικό είδος</u> Είδος που συναντάται σε υφάλους. Εύρος βάθους 3 - 57 m. Πρόσφατα μετανάστευσε στη Μεσόγειο Θάλασσα μέσω της Διώρυγας του Σουέζ. Σύμφωνα με αναφορές, έχει επίσης εμφανιστεί στον Περσικό Κόλπο και τις Σεϋχέλλες.	[Βιβλιογραφία/Βάσεις δεδομένων]: Πελοπόννησος LF3	Δεν υπάρχουν δεδομένα.	-	c	-	c	c	-	c
<i>Trachinus Araneus</i>	Αραχνοδράκαινα	-	-	-	-	-	/NE	-	<u>Αυτόχθον είδος</u> Κατοικεί σε ρηχά νερά σε βάθος περίπου 100 μέτρων. Τρυπώνει στον πυθμένα. Τα αυγά και οι προνύμφες του είναι πελαγικά	[Βιβλιογραφία/Βάσεις δεδομένων]: Πατραϊκός Κόλπος: Διαδρομή (ΧΘ): 0-17,23 km	Περίοδος ωοτοκίας:	r	c	r	c	c	c	c
<i>Trachinus draco</i>	Μεγαλοδράκαινα	-	-	-	-	-	LC/NE	-	<u>Αυτόχθον είδος</u> Απαντάται σε αμμώδεις, λασπώδεις ή χαλικώδεις πυθμένες, σε βάθος από λίγα μέτρα έως περίπου 150 m. Παραμένει στον βυθό, συχνά θαμμένη και με τα μάτια και την άκρη του πρώτου ραχιαίου πτερυγίου εκτεθειμένα. Εύρος βάθους 1 - 150 m, συνήθως 1 - 30 m.	[Βιβλιογραφία/Βάσεις δεδομένων]: Νότιο Κρητικό Πέλαγος: Διαδρομή (ΧΘ): 0-70km Νότιο Αιγαίο Πέλαγος: Διαδρομή (ΧΘ): 70-366km	Περίοδος ωοτοκίας: Ιούνιος και Αύγουστος	-	r	r	c	c	r	c
<i>Trisopterus minutus capellanus</i>	Φίγι	-	-	-	-	-	LC/NE	-	<u>Αυτόχθον είδος</u> Θαλάσσιο, βενθοπελαγικό.	[Βιβλιογραφία/Βάσεις δεδομένων]: Πατραϊκός Κόλπος: Διαδρομή (ΧΘ): 0-17,23 km	Δεν υπάρχουν δεδομένα.	r	-	-	-	-	-	-

Είδος		Κατάσταση προστασίας							Οικολογία	Παρουσία εντός της Περιοχής Μελέτης	Ευαίσθητες Οικολογικές Περιόδους	Περιοχές έργου (* Σχετικές πιθανότητες εμφάνισης)						
Επιστημονική ονομασία	Κοινή ονομασία	ΠΔ 67/1981	Σύμβαση της Βέρνης	Σύμβαση της Βόννης	Σύμβαση της Βαρκελώνης	Οδηγία 92/43/ΕΟΚ	IUCN/Βιβλίο δεδομένων κινδύνου	CITES				Νότιο Κρητικό Πέλαγος	Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)	Νότιο Αιγαίο Πέλαγος	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)	Πατραϊκός Κόλπος	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια Ζώνη & LF5)
<i>Uranoscopus scaber</i>	Λύχνος	-	-	-	-	-	LC/NE	-	<u>Αυτόχθον είδος</u> Συνήθως απαντάται θαμμένος στην άμμο ή στη λάσπη. Εύρος βάθους 15 - 400 m.	[Βιβλιογραφία/Βάσεις δεδομένων]: Πατραϊκός Κόλπος: Διαδρομή (ΧΘ): 0-17,23 km	Περίοδος ωοτοκίας: Απρίλιος έως Αύγουστος	r	c	r	c	c	c	c
<i>Vinciguerria attenuata</i>	Λεπτό φωτόψαρο	-	-	-	-	-	LC/NE	-	<u>Αυτόχθον είδος</u> Μεσοπελαγικό είδος, που απαντάται στα 250-600 m την ημέρα και στα 100-500 m τη νύχτα. Αναπαράγεται την άνοιξη και στις αρχές του καλοκαιριού	[Βιβλιογραφία/Βάσεις δεδομένων]: Νότιο Κρητικό Πέλαγος: Διαδρομή (ΧΘ): 0-70km Νότιο Αιγαίο Πέλαγος: Διαδρομή (ΧΘ): 70-366km	Περίοδος ωοτοκίας: άνοιξη έως αρχές καλοκαιριού	r	-	c	-	-	r	-
<i>Vinciguerria poweriae</i>	Σμηριγγόψαρο του Πάουερ	-	-	-	-	-	LC/NE	-	<u>Αυτόχθον είδος</u> Επι- και μεσοπελαγικό είδος, απαντάται κυρίως στα 300-600 m την ημέρα και στα 50-350 m τη νύχτα. Η ωοτοκία λαμβάνει χώρα καθ' όλη τη διάρκεια του έτους στη Μεσόγειο	[Βιβλιογραφία/Βάσεις δεδομένων]: Νότιο Κρητικό Πέλαγος: Διαδρομή (ΧΘ): 0-70km Νότιο Αιγαίο Πέλαγος: Διαδρομή (ΧΘ): 70-366km	Περίοδος κορύφωσης ωοτοκίας: άνοιξη-καλοκαίρι	r	-	c	-	-	r	-
<i>Xiphias gladius</i>	Ξιφίας	-	-	-	-	-	LC/NE	-	<u>Αυτόχθον είδος</u> Ωκεάνιο είδος που απαντάται ενίοτε και σε παράκτια ύδατα. Εύρος βάθους 0 - 2878 m, συνήθως 0 - 550 m.	[Βιβλιογραφία/Βάσεις δεδομένων]: Πατραϊκός Κόλπος: Διαδρομή (ΧΘ): 0-17,23 km	Περίοδος ωοτοκίας: Ιούνιος έως Σεπτέμβριος	r	r	c	r	r	c	r
<i>Zeus faber</i>	Χριστόψαρο	-	-	-	-	-	DD/NE	-	<u>Αυτόχθον είδος</u> Απαντάται σε περιοχές κοντά στον πυθμένα της θάλασσας. Η αναπαραγωγή πραγματοποιείται στο τέλος του χειμώνα και στις αρχές της άνοιξης στον βορειοανατολικό Ατλαντικό, νωρίτερα στη Μεσόγειο. Εύρος βάθους 5 - 400 m, συνήθως 50 - 550 m.	[Βιβλιογραφία/Βάσεις δεδομένων]: Πατραϊκός Κόλπος: Διαδρομή (ΧΘ): 0-17,23 km	Περίοδος ωοτοκίας: Χειμώνας – αρχές άνοιξης	r	r	r	r	r	r	r

Είδος		Κατάσταση προστασίας							Οικολογία	Παρουσία εντός της Περιοχής Μελέτης	Ευαίσθητες Οικολογικές Περίοδοι	Περιοχές έργου (* Σχετικές πιθανότητες εμφάνισης)					
Επιστημονική ονομασία	Κοινή ονομασία	ΠΔ 67/1981	Σύμβαση της Βέρνης	Σύμβαση της Βόννης	Σύμβαση της Βαρκελώνης	Οδηγία 92/43/ΕΟΚ	IUCN/Βιβλίο δεδομένων κινδύνου	CITES				Νότιο Κρητικό Πέλαγος	Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)	Νότιο Αιγαίο Πέλαγος	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)	Πατραϊκός Κόλπος
Υπόμνημα - Δ/Υ: Δεν υφίσταται, μη διαθέσιμη πληροφορία. - ΠΔ 67/1981: Προεδρικό Διάταγμα περί προστασίας της αυτοφυούς χλωρίδος, και αγρίας πανίδος. - Σύμβαση της Βέρνης για τη διατήρηση της ευρωπαϊκής άγριας ζωής και των φυσικών οικοτόπων: Παράρτημα Ι – Αυστηρά προστατευόμενα είδη χλωρίδας Παράρτημα ΙΙ – Αυστηρά προστατευόμενα είδη πανίδας Παράρτημα ΙΙΙ – Προστατευόμενα είδη πανίδας. - Σύμβαση της Βόννης για τη διατήρηση των αποδημητικών ειδών της άγριας πανίδας: Προσάρτημα Ι – Απειλούμενα αποδημητικά είδη Προσάρτημα ΙΙ – Αποδημητικά είδη που διατηρούνται μέσω Συμφωνιών. - Σύμβαση της Βαρκελώνης: Η περιοχή στην οποία εφαρμόζεται το παρόν Πρωτόκολλο θα είναι η περιοχή της Μεσογείου Θάλασσας όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Σύμβασης. Μεταξύ άλλων, η σύμβαση αποσκοπεί α) στην προστασία, διατήρηση και διαχείριση με βιώσιμο και περιβαλλοντικά ορθό τρόπο περιοχών ιδιαίτερης φυσικής ή πολιτιστικής αξίας, ιδίως με τη δημιουργία ειδικά προστατευόμενων περιοχών· β) στην προστασία, διατήρηση και διαχείριση απειλούμενων ή υπό εξαφάνιση ειδών χλωρίδας και πανίδας CITES – Σύμβαση διεθνούς εμπορίας ειδών της άγριας πανίδας και χλωρίδας που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν: Προσάρτημα Ι – Κάθε είδος που απειλείται με εξαφάνιση και που είναι ή θα μπορούσε να είναι αντικείμενο εμπορίου. Το εμπόριο των δειγμάτων των εν λόγω ειδών πρέπει να διέπεται από ιδιαίτερα αυστηρούς κανόνες, ώστε να μην απειλείται περισσότερο η επιβίωσή τους, και δεν πρέπει να επιτρέπεται παρά μόνο σε εξαιρετικές περιστάσεις Προσάρτημα ΙΙ – α) Κάθε είδος το οποίο, αν και προς το παρόν δεν απειλείται κατ'ανάγκη με εξαφάνιση, θα μπορούσε να απειληθεί στο μέλλον αν το εμπόριο των δειγμάτων του είδους αυτού δεν υπαχθεί σε ιδιαίτερα αυστηρούς κανόνες, ώστε να αποφεύγεται η ασυμβίβαστη με την επιβίωσή τους εκμετάλλευση· και β) Ορισμένα είδη που πρέπει να υπαχθούν σε κανόνες ώστε το εμπόριο δειγμάτων των ειδών που περιλαμβάνονται στο στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου να τεθεί υπό αποτελεσματικό έλεγχο Προσάρτημα ΙΙΙ – Κάθε είδος που ένα συμβαλλόμενο μέρος, στο πλαίσιο της δικαιοδοσίας του, ορίζει ότι το υπάγει σε κανόνες με σκοπό να εμποδίσει ή να περιορίσει την εκμετάλλευσή του, και ότι χρειάζεται τη συνεργασία άλλων συμβαλλόμενων μερών για τον έλεγχο του εμπορίου. - Οδηγία 92/43/ΕΟΚ: Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας: Παράρτημα Ι – Τύποι οικοτόπων κοινοτικού ενδιαφέροντος / (*) Οικότοποι προτεραιότητας Παράρτημα ΙΙ – Ζωικά και φυτικά είδη κοινοτικού ενδιαφέροντος των οποίων η διατήρηση επιβάλλει τον χαρακτηρισμό ειδικών ζωνών διατήρησης / (*) Είδη προτεραιότητας Παράρτημα ΙV – Ζωικά και φυτικά είδη κοινοτικού ενδιαφέροντος που χρήζουν αυστηρής προστασίας Παράρτημα V – Ζωικά και φυτικά είδη κοινοτικού ενδιαφέροντος των οποίων η απόσπαση από το φυσικό τους περιβάλλον και η εκμετάλλευση είναι δυνατό να ρυθμίζονται με διαχειριστικά μέτρα. IUCN/Βιβλίο δεδομένων κινδύνου: Διεθνής Ένωση Προστασίας της Φύσης (International Union for Conservation of Nature) / Το κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων ζώων της Ελλάδας (2009): CR: Κρισίμως Κινδυνεύον EN: Κινδυνεύον VU: Ευάλωτο NT: Σχεδόν Απειλούμενο LR: Χαμηλότερου Κινδύνου LC: Μειωμένου Ενδιαφέροντος DD: Ανεπαρκώς Γνωστό NE: Μη αξιολογηθέν. * Σχετικές πιθανότητες εμφάνισης (0,0 – 1,00) r : σπάνιο (< 0,59) c : κοινό (≥ 0,59)																	

ΠίνακαςΗ-4 Ασπόνδυλα που υπάρχουν και αναμένονται στην Περιοχή μελέτης

Είδος		Κατάσταση προστασίας							Οικολογία	Παρουσία εντός της Περιοχής Μελέτης	Ευαίσθητες Οικολογικές Περίοδοι	Περιοχές του Έργου (Παρουσία εντός της Περιοχής Μελέτης*)						
Επιστημονική ονομασία	Κοινή ονομασία	ΠΔ 67/1981	Σύμβαση της Βέρνης	Σύμβαση της Βόννης	Σύμβαση της Βαρκελώνης	Οδηγία 92/43/ΕΟΚ	IUCN/Βιβλίο δεδομένων κινδύνου	CITES				Νότιο Κρητικό Πέλαγος	Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)	Νότιο Αιγαίο Πέλαγος	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)	Πατραϊκός Κόλπος	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια Ζώνη & LF5)
<i>Acanthephyra pelagica</i>	-	-	-	-	-	-	NE/NE	-	Βαθυπελαγικό. Εύρος βάθους 183 - 2500 m. Πελαγικό, είδος βαθέων υδάτων		Δεν υπάρχουν δεδομένα.	P		Ps				
<i>Agelas oroides</i>	Θαλάσσιο σφουγγάρι	-	-	-	-	-	NE/NE	-	Απαντάται στο θαλάσσιο περιβάλλον στην Αδριατική Θάλασσα		Δεν υπάρχουν δεδομένα.	P	P	Ps				
<i>Alcyonium sp.</i>		-	-	-	-	-	LC/NE	-	Θαλάσσιο νεριτικό. Απαντάται σε βάθος -9 έως -90 μέτρα. Συνηθίζεται σε βραχώδεις πυθμένες σε ρηχά ύδατα, καθώς και σε κοραλλιγενείς σχηματισμούς σε βαθύτερα υποπαραθαλάσσια ύδατα		Δεν υπάρχουν δεδομένα.					Pr	Pr	
<i>Allosergestes sargassi</i>	-	-	-	-	-	-	NE/NE	-	Απαντάται στο θαλάσσιο περιβάλλον στην Αδριατική Θάλασσα. Πελαγικό. Εύρος βάθους 0 - 2150 m.		Δεν υπάρχουν δεδομένα.	P	P	Ps				
<i>Axinella cannabina</i>	Δενδρόμορφος σπόγγος	-	-	-	-	-	NE/NE	-	Απαντάται στο θαλάσσιο περιβάλλον της Μεσογείου		Δεν υπάρχουν δεδομένα.	P	P	Ps				
<i>Axinella verrucosa</i>	-	-	-	-	-	-	NE/NE	-	Αρχικά αναφέρθηκε στη Μεσόγειο, αλλά στη συνέχεια αναφέρθηκε στο Roscoff. Απαντάται σε γκρεμούς και σε πυθμένες με βότσαλο, 10-74 μ		Δεν υπάρχουν δεδομένα.			Pr				
<i>Bathycuma brevirostre</i>	-	-	-	-	-	-	NE/NE	-	Τα μέλη της οικογένειας Cumacea είναι γονοχορικά και σεξουαλικά διμορφικά. Η ωοτοκία τους χαρακτηρίζεται από συμπεριφορά νυχτερινής σμήνης.		Δεν υπάρχουν δεδομένα.	P	P	Ps				
<i>Cacospongia sp.</i>	Cacospongia sp.	-	-	-	-	-	NE/NE	-	Το σώμα του σπόγγου αποτελείται από βελόνες από βότσαλο και σπογγώδεις ίνες, και είναι σε θέση να απορροφήσει πολύ νερό.	[Εγγραφές πεδίου]: Κρήτη: LF2: Διαδρομή ΧΘ: 0,196 km και 0,391 km από την LF2.	Δεν υπάρχουν δεδομένα.		Pr					



Είδος		Κατάσταση προστασίας							Οικολογία	Παρουσία εντός της Περιοχής Μελέτης	Ευαίσθητες Οικολογικές Περίοδοι	Περιοχές του Έργου (Παρουσία εντός της Περιοχής Μελέτης*)					
Επιστημονική ονομασία	Κοινή ονομασία	ΠΔ 67/1981	Σύμβαση της Βέρνης	Σύμβαση της Βόννης	Σύμβαση της Βαρκελώνης	Οδηγία 92/43/ΕΟΚ	IUCN/Βιβλίο δεδομένων κινδύνου	CITES				Νότιο Κρητικό Πέλαγος	Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)	Νότιο Αιγαίο Πέλαγος	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)	Πατραϊκός Κόλπος
<i>Crambe crambe</i>	-	-	-	-	-	-	NE/NE	-	Το Crambe crambe απαντάται συνήθως σε καλά φωτιζόμενα νερά και με σκληρό υπόστρωμα σε βάθη 5 έως 30 m		Δεν υπάρχουν δεδομένα.			Pr			
<i>Calocalanus styliremis</i>	Κωπήποδα	-	-	-	-	-	NE/NE	-	Πελαγικό. Εύρος βάθους 0 - 200 m. Υποτροπικό		Δεν υπάρχουν δεδομένα.	p		Ps			
<i>Clausocalanus mastigophorus</i>	-	-	-	-	-	-	NE/NE	-	Το αρσενικό Clausocalanus mastigophorus είναι κλειδωμένο μαζί με το αρσενικό Clausocalanus parapergens.		Δεν υπάρχουν δεδομένα.	P		Ps			
<i>Conus ventricosus</i>	Μεσογειακός κώνος	-	-	-	-	-	LC/NE	-	Το είδος αυτό απαντάται σε ρηχά νερά και σε πολλούς διαφορετικούς οικοτόπους, όπως λάσπη, άμμος, θαλάσσια χόρτα και βράχια βάθους μεταξύ 0,5 και 5 m. Θαλάσσιο νεριτικό. Βενθοπελαγικό		Δεν υπάρχουν δεδομένα.				Ps		Ps
<i>Diadema setosum</i>	-	-	-	-	-	-	NE/NE	-	Το Diadema setosum συνδέεται συνήθως με τους κοραλλιογενείς υφάλους, αλλά βρίσκεται επίσης σε αμμώδεις επιφάνειες και σε πυθμένες με θαλάσσια βλάστηση. Μαζί με τα άλλα μέλη της οικογένειας, το D. setosum τρέφεται με βόσκηση. Είναι γνωστό ότι τρέφεται με μια ποικιλία ειδών φυκιών που είναι κοινά στους τροπικούς κοραλλιογενείς υφάλους. Η οικολογική σημασία της ταξινομικής ομάδας στο σύνολό της έχει τονιστεί λόγω των φυτοφάγων συνηθειών της	[Εγγραφές πεδίου]: Κρήτη: LF2: Διαδρομή ΧΘ: 0,196 km και 0,391 km από την LF2. Εμφανίζεται εντός της ακτογραμμής της Κρήτης.	Το είδος είναι γνωστό ότι αναπαράγεται τόσο εποχιακά όσο και καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, ανάλογα με την τοποθεσία του πληθυσμού ωοτοκίας.	P	Pr				
<i>Deosergestes henseni</i>	-	-	-	-	-	-	NE/NE	-	Απαντάται στο θαλάσσιο περιβάλλον της Μεσογείου		Δεν υπάρχουν δεδομένα.	P		Ps			
<i>Diastyloides carpinei</i>	-	-	-	-	-	-	NE/NE	-	Απαντάται στο θαλάσσιο περιβάλλον της Μεσογείου		Δεν υπάρχουν δεδομένα.	P		Ps			



Είδος		Κατάσταση προστασίας							Οικολογία	Παρουσία εντός της Περιοχής Μελέτης	Ευαίσθητες Οικολογικές Περίοδοι	Περιοχές του Έργου (Παρουσία εντός της Περιοχής Μελέτης*)						
Επιστημονική ονομασία	Κοινή ονομασία	ΠΔ 67/1981	Σύμβαση της Βέρνης	Σύμβαση της Βόννης	Σύμβαση της Βαρκελώνης	Οδηγία 92/43/ΕΟΚ	IUCN/Βιβλίο δεδομένων κινδύνου	CITES				Νότιο Κρητικό Πέλαγος	Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)	Νότιο Αιγαίο Πέλαγος	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)	Πατραϊκός Κόλπος	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια Ζώνη & LF5)
<i>Eopaijenborchella malaiensis</i>	-	-	-	-	-	-	NE/NE	-	Απαντάται στο θαλάσσιο περιβάλλον της Μεσογείου		Δεν υπάρχουν δεδομένα.	P		Ps				
<i>Eusergestes arcticus</i>	-	-	-	-	-	-	NE/NE	-	Απαντάται στο θαλάσσιο περιβάλλον της Μεσογείου		Δεν υπάρχουν δεδομένα.	P		Ps				
<i>Flexopecten glaber</i>	-	-	-	-	-	-	NE/NE	-	Απαντάται στο θαλάσσιο περιβάλλον του Αμβρακικού Κόλπου		Δεν υπάρχουν δεδομένα.							Ps
<i>Funchalia villosa</i>	-	-	-	-	-	-	NE/NE	-	Απαντάται στο θαλάσσιο περιβάλλον της Μεσογείου		Δεν υπάρχουν δεδομένα.	P		Ps				
<i>Gennadas elegans</i>	-	-	-	-	-	-	NE/NE	-	Απαντάται στο θαλάσσιο περιβάλλον της Μεσογείου		Δεν υπάρχουν δεδομένα.	P		Ps				
<i>Gracilechinus acutus</i>	-	-	-	-	-	-	NE/NE	-	Απαντάται στο θαλάσσιο περιβάλλον της Μεσογείου		Δεν υπάρχουν δεδομένα.	P		Ps				
<i>Guynia annulata</i>	-	-	-	-	-	-	NE/NE	-	Απαντάται στο θαλάσσιο περιβάλλον της Μεσογείου		Δεν υπάρχουν δεδομένα.	P		Ps				
<i>Haliotis tuberculata</i>	Αυτί της Θάλασσας	-	-	-	-	-	VU/-	-	Αυτό το είδος εγκαθίσταται σε φύκη κρουστόζης κοραλλιών (Lithothamnium spp.) όπως συνηθίζουν και τα περισσότερα άλλα κοχύλια Haliotis, το οποίο στο είδος αυτό προκαλείται περαιτέρω από τις βλεννώδεις ράγες που υπάρχουν στα ενήλικα άτομα του είδους. Προτιμά τις ρωγμές και τις σχισμές σε βράχους και την κάτω πλευρά των πετρώων, ιδιαίτερα του σχιστόλιθου και των βράχων στην άμμο, όπου μπορεί να κρυφτεί από τα αρπακτικά. Εύρος βάθους 0 - 200 m.		Η ωοτοκία πραγματοποιείται από την άνοιξη έως τα τέλη του φθινοπώρου.				Ps	Ps	Ps	
<i>Hemityphis tenuimanus</i>	-	-	-	-	-	-	NE/NE	-	Ζωοπλαγκτόν του Νότιου Ατλαντικού Ωκεανού. Μήκος 5-7 mm. Με χαρακτηριστικά του γένους Hemityphis.		Δεν υπάρχουν δεδομένα.	P		Ps				
<i>Heteroteuthis serventyi</i>	-	-	-	-	-	-	NE/NE	-	Απαντάται στο θαλάσσιο περιβάλλον της Μεσογείου		Δεν υπάρχουν δεδομένα.	P		Ps				

Είδος		Κατάσταση προστασίας							Οικολογία	Παρουσία εντός της Περιοχής Μελέτης	Ευαίσθητες Οικολογικές Περίοδοι	Περιοχές του Έργου (Παρουσία εντός της Περιοχής Μελέτης*)						
Επιστημονική ονομασία	Κοινή ονομασία	ΠΔ 67/1981	Σύμβαση της Βέρνης	Σύμβαση της Βόννης	Σύμβαση της Βαρκελώνης	Οδηγία 92/43/ΕΟΚ	IUCN/Βιβλίο δεδομένων κινδύνου	CITES				Νότιο Κρητικό Πέλαγος	Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)	Νότιο Αιγαίο Πέλαγος	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)	Πατραϊκός Κόλπος	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια Ζώνη & LF5)
<i>Nematocarcinus exilis</i>	-	-	-	-	-	-	NE/NE	-	Απαντάται στο θαλάσσιο περιβάλλον της Μεσογείου		Δεν υπάρχουν δεδομένα.	P		Ps				
<i>Oncaea scottodicarloi</i>	-	-	-	-	-	-	NE/NE	-	Απαντάται στο θαλάσσιο περιβάλλον της Μεσογείου		Δεν υπάρχουν δεδομένα.	P		Ps				
<i>Paracalanus denudatus</i>	-	-	-	-	-	-	NE/NE	-	Ζωοπλαγκτόν του Νότιου Ατλαντικού Ωκεανού. Θηλυκά: P4 Expr2 χωρίς αγκάθια που μοιάζουν με φύλλα		Δεν υπάρχουν δεδομένα.	P		Ps				
<i>Paracentrotus lividus</i>	Μωβ αχινός	-	III	-	III	-	NE/VU	-	Το P. lividus απαντάται σε όλη τη Μεσόγειο Θάλασσα και στον ανατολικό Ατλαντικό Ωκεανό και εκτείνεται σε βάθη 0-80m. Προτιμά τους βραχώδεις πυθμένες και συναντάται και στα λιβάδια <i>P. oceanica</i> .		Δεν υπάρχουν δεδομένα.	P	P	Ps	Ps	Ps		
<i>Paracyathus pulchellus</i>	Κοράλλι	-	-	-	-	-	NE/NE	-	Azooxanthellate, στην εξωτερική υφαλοκρηπίδα σε βάθη 50 έως 200 m. Γνωστό από τις περιπαράλιες και bathyal ζώνες.		Δεν υπάρχουν δεδομένα.	P		Ps				
<i>Parasergestes vigilax</i>	-	-	-	-	-	-	NE/NE	-	Απαντάται στο θαλάσσιο περιβάλλον της Μεσογείου		Δεν υπάρχουν δεδομένα.	P		Ps				
<i>Pasiphaea multidentata</i>	-	-	-	-	-	-	NE/NE	-	Πελαγικά είδη, μέχρι περίπου 10-2000 m, πιο συχνά από 100-500 m.		Η μεγαλύτερη αναπαραγωγική δραστηριότητα εμφανίζεται τον Απρίλιο-Μάιο και τον Αύγουστο-Σεπτέμβριο	P	P	Ps				
<i>Pasiphaea sivado</i>	-	-	-	-	-	-	NE/NE	-	Πελαγικό, μέχρι περίπου 20-500 m.		Αναπαράγεται δύο φορές το χρόνο, στις αρχές του καλοκαιριού και στις αρχές του χειμώνα.	P	P	Ps				



Είδος		Κατάσταση προστασίας							Οικολογία	Παρουσία εντός της Περιοχής Μελέτης	Ευαίσθητες Οικολογικές Περίοδοι	Περιοχές του Έργου (Παρουσία εντός της Περιοχής Μελέτης*)						
Επιστημονική ονομασία	Κοινή ονομασία	ΠΔ 67/1981	Σύμβαση της Βέρνης	Σύμβαση της Βόννης	Σύμβαση της Βαρκελώνης	Οδηγία 92/43/ΕΟΚ	IUCN/Βιβλίο δεδομένων κινδύνου	CITES				Νότιο Κρητικό Πέλαγος	Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)	Νότιο Αιγαίο Πέλαγος	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)	Πατραϊκός Κόλπος	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια Ζώνη & LF5)
<i>Pinna nobilis</i>	Πίννα η ευγενής	-	-	-	II	IV	CR/VU	-	Αυτό το είδος είναι ένα μακρόβιο δίθυρο που εμφανίζεται σε παράκτιες περιοχές, σε βάθη μεταξύ 0,5 και 60 m. Τα λιβάδια Posidonia oceanica περιγράφονται ως ο κύριος βιότοπος του P. nobilis. Γενικά απουσιάζει από λασπώδη ιζήματα και σε περιοχές με σοβαρή διαταραχή των ιζημάτων. Θαλάσσιο νεριτικό είδος.		Η αναπαραγωγή του έχει αναφερθεί ότι συμβαίνει κυρίως μεταξύ Μαΐου και Αυγούστου.	P	P	Ps		Ps	PS	PS
<i>Platyscelus ovoides</i>	-	-	-	-	-	-	NE/NE	-	Μήκος έως 20 mm. Πελαγικό. Εύρος βάθους 0 - 800 m.		Δεν υπάρχουν δεδομένα.	P	P	Ps				
<i>Polycheles typhlops</i>	-	-	-	-	-	-	LC/NE	-	Βενθικό. Εύρος βάθους 70 - 2195 m.		Δεν υπάρχουν δεδομένα.	P		Ps				
<i>Procampylaspis armata</i>	-	-	-	-	-	-	NE/NE	-	Βενθοπελαγικό. Υποτροπικό. Μεσόγειος Θάλασσα.		Δεν υπάρχουν δεδομένα.	P		Ps				
<i>Procampylaspis bonnieri</i>	-	-	-	-	-	-	NE/NE	-	Απαντάται στο θαλάσσιο περιβάλλον της Μεσογείου		Δεν υπάρχουν δεδομένα.	P		Ps				
<i>Puellina atlantis</i>	-	-	-	-	-	-	NE/NE	-	Το σύμπλεγμα ειδών Puellina flabellifera: ένα αξιοσημείωτο παράδειγμα παγκόσμιας εμβέλειας βρυόζων cribrimorph.		Δεν υπάρχουν δεδομένα.	P		Ps				
<i>Pyroteuthis margaritifera</i>	-	-	-	-	-	-	LC/NE	-	Είναι ένα ευρέως κατανεμημένο είδος που εμφανίζεται σε όλο τον τροπικό και εύκρατο Ατλαντικό, τον Ινδικό και τον Νότιο Ειρηνικό Ωκεανό, αλλά δεν έχει καταγραφεί στον ανατολικό Ειρηνικό. Περιγράφηκε αρχικά από τον Γερμανό φυσιοδίφη Eduard Rüppell το 1844 ως Enoploteuthis margaritifera από δείγματα που συνέλεξε στη Μεσόγειο.		Δεν υπάρχουν δεδομένα.	P		Ps				
<i>Robustosergia robusta</i>	-	-	-	-	-	-	NE/NE	-	Πελαγικό είδος, που φτάνει μέχρι τα 4900 m. Παγκόσμια κατανομή: Ατλαντικός Ωκεανός και Μεσόγειος Θάλασσα.		Δεν υπάρχουν δεδομένα.	P		Ps				

Είδος		Κατάσταση προστασίας							Οικολογία	Παρουσία εντός της Περιοχής Μελέτης	Ευαίσθητες Οικολογικές Περίοδοι	Περιοχές του Έργου (Παρουσία εντός της Περιοχής Μελέτης*)					
Επιστημονική ονομασία	Κοινή ονομασία	ΠΔ 67/1981	Σύμβαση της Βέρνης	Σύμβαση της Βόννης	Σύμβαση της Βαρκελώνης	Οδηγία 92/43/ΕΟΚ	IUCN/Βιβλίο δεδομένων κινδύνου	CITES				Νότιο Κρητικό Πέλαγος	Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)	Νότιο Αιγαίο Πέλαγος	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)	Πατραϊκός Κόλπος
<i>Sabella spallanzani</i>	Σπειρογράφος	-	-	-	-	-	NE/NE	-	Απαντάται στα 10-40 m. Θαλάσσιο νεριτικό. Προσαρμόζεται σε μεγάλη ποικιλία σκληρών επιφανειών, συμπεριλαμβανομένων πετρωμάτων, ξύλου, χάλυβα, σκυροδέματος, οστρακόδερμων και τεχνητών υλικών και συνηθέστερα εξαπλώνεται ως είδη ρύπανσης σε αγκυροβολημένα πλοία. Μεγάλο σκουλήκι με τρίχες που κατοικεί σε σωλήνες που βρίσκεται συνήθως σε εκβολές ποταμών και προστατευμένες τοποθεσίες μέχρι βάθη περίπου 30 μέτρων		Δεν υπάρχουν δεδομένα.				Pr	Pr	
<i>Savalia savaglia (Gerardia savaglia)</i>	Χρυσό κοράλι	-	-	II	II	--	NT/	-	Θαλάσσιο, νεριτικό. Βάθος 15-750m		Δεν υπάρχουν δεδομένα.				Pr	Pr	
<i>Scopelocheirus hopei</i>	-	-	-	-	-	-	NE/NE	-	Εύρος βάθους από 20 έως 250 μέτρα. Βορειοανατολικός Ατλαντικός, Ισλανδία, Ευρώπη. Έχει καταγραφεί πολύ ευρέως από τη δυτική Νορβηγία έως τη δυτική Μεσόγειο.		Δεν υπάρχουν δεδομένα.	P		Ps			
<i>Scyphopodium ingolfi</i>	-	-	-	-	-	-	NE/NE	-	Απαντάται στο θαλάσσιο περιβάλλον της Μεσογείου		Δεν υπάρχουν δεδομένα.	P		Ps			
<i>Spongia sp.</i>	-	-	-	-	-	-	NE/NE	-	Συγγενικά είδη: <i>Hippospongia communis</i> (Med.) <i>Spongia agaricina</i> (Med.) <i>Spongia officinalis</i> (Med.) <i>Spongia zimocca</i> (Med)	[Εγγραφές πεδίου]: Νότια Κρήτη LF2: Διαδρομή ΧΘ: 0,196 km, 0,391 km και 0,472 km από την LF2. Εμφανίζεται εντός της ακτογραμμής της Κρήτης.	Δεν υπάρχουν δεδομένα.	P	Pr	Pr			

Είδος		Κατάσταση προστασίας							Οικολογία	Παρουσία εντός της Περιοχής Μελέτης	Ευαίσθητες Οικολογικές Περίοδοι	Περιοχές του Έργου (Παρουσία εντός της Περιοχής Μελέτης*)					
Επιστημονική ονομασία	Κοινή ονομασία	ΠΔ 67/1981	Σύμβαση της Βέρνης	Σύμβαση της Βόννης	Σύμβαση της Βαρκελώνης	Οδηγία 92/43/ΕΟΚ	IUCN/Βιβλίο δεδομένων κινδύνου	CITES				Νότιο Κρητικό Πέλαγος	Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)	Νότιο Αιγαίο Πέλαγος	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)	Πατραϊκός Κόλπος
Triconia elongata	-	-	-	-	-	-	NE/NE	-	Αυτό το θαλάσσιο είδος απαντάται στον Ινδικό Ωκεανό, στη νότια Μοζαμβίκη και στη βορειοανατολική Νότια Αφρική.		Δεν υπάρχουν δεδομένα.	P		Ps			
Triconia furcula	-	-	-	-	-	-	NE/NE	-	Απαντάται στη Μεσόγειο (Πορθμός της Σικελίας, Ιόνιο Πέλαγος, Λεκάνη του Λιβάνου).		Δεν υπάρχουν δεδομένα.	P		Ps			
Vanadis formosa	-	-	-	-	-	-	NE/NE	-	Βενθικό. Τροπικό. Απαντάται στον Ινδο-Ειρηνικό, στον Δυτικό Κεντρικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο Θάλασσα.		Δεν υπάρχουν δεδομένα.	P		Pr			

Υπόμνημα

- Δ/Υ: Δεν υφίσταται, μη διαθέσιμη πληροφορία.
- ΠΔ 67/1981: Προεδρικό Διάταγμα περί προστασίας της αυτοφυούς χλωρίδος, και αγρίας πανίδος.
- Σύμβαση της Βέρνης για τη διατήρηση της ευρωπαϊκής άγριας ζωής και των φυσικών οικοτόπων: **Παράρτημα I** – Αυστηρά προστατευόμενα είδη χλωρίδας | **Παράρτημα II** – Αυστηρά προστατευόμενα είδη πανίδας | **Παράρτημα III** – Προστατευόμενα είδη πανίδας.
- Σύμβαση της Βόννης για τη διατήρηση των αποδημητικών ειδών της άγριας πανίδας: **Προσάρτημα I** – Απειλούμενα αποδημητικά είδη | **Προσάρτημα II** – Αποδημητικά είδη που διατηρούνται μέσω Συμφωνιών.
- Σύμβαση της Βαρκελώνης: Η περιοχή στην οποία εφαρμόζεται το παρόν Πρωτόκολλο θα είναι η περιοχή της Μεσογείου Θάλασσας όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Σύμβασης. Μεταξύ άλλων, η σύμβαση αποσκοπεί α) στην προστασία, διατήρηση και διαχείριση με βιώσιμο και περιβαλλοντικά ορθό τρόπο περιοχών ιδιαίτερης φυσικής ή πολιτιστικής αξίας, ιδίως με τη δημιουργία ειδικά προστατευόμενων περιοχών· β) στην προστασία, διατήρηση και διαχείριση απειλούμενων ή υπό εξαφάνιση ειδών χλωρίδας και πανίδας CITES – Σύμβαση διεθνούς εμπορίας ειδών της άγριας πανίδας και χλωρίδας που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν: **Προσάρτημα I** – Κάθε είδος που απειλείται με εξαφάνιση και που είναι ή θα μπορούσε να είναι αντικείμενο εμπορίου. Το εμπόριο των δειγμάτων των εν λόγω ειδών πρέπει να διέπεται από ιδιαίτερα αυστηρούς κανόνες, ώστε να μην απειλείται περισσότερο η επιβίωσή τους, και δεν πρέπει να επιτρέπεται παρά μόνο σε εξαιρετικές περιστάσεις | **Προσάρτημα II** – α) Κάθε είδος το οποίο, αν και προς το παρόν δεν απειλείται κατ'ανάγκη με εξαφάνιση, θα μπορούσε να απειληθεί στο μέλλον αν το εμπόριο των δειγμάτων του είδους αυτού δεν υπαχθεί σε ιδιαίτερα αυστηρούς κανόνες, ώστε να αποφεύγεται η ασυμβίβαστη με την επιβίωσή τους εκμετάλλευση· και β) Ορισμένα είδη που πρέπει να υπαχθούν σε κανόνες ώστε το εμπόριο δειγμάτων των ειδών που περιλαμβάνονται στο στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου να τεθεί υπό αποτελεσματικό έλεγχο | Προσάρτημα III – Κάθε είδος που ένα συμβαλλόμενο μέρος, στο πλαίσιο της δικαιοδοσίας του, ορίζει ότι το υπάγει σε κανόνες με σκοπό να εμποδίσει ή να περιορίσει την εκμετάλλευσή του, και ότι χρειάζεται τη συνεργασία άλλων συμβαλλόμενων μερών για τον έλεγχο του εμπορίου.
- Οδηγία 92/43/ΕΟΚ:** Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας: **Παράρτημα I** – Τύποι οικοτόπων κοινοτικού ενδιαφέροντος / (*) Οικότοποι προτεραιότητας | **Παράρτημα II** – Ζωικά και φυτικά είδη κοινοτικού ενδιαφέροντος των οποίων η διατήρηση επιβάλλει τον χαρακτηρισμό ειδικών ζωνών διατήρησης / (*) Είδη προτεραιότητας | **Παράρτημα IV** – Ζωικά και φυτικά είδη κοινοτικού ενδιαφέροντος που χρήζουν αυστηρής προστασίας | **Παράρτημα V** – Ζωικά και φυτικά είδη κοινοτικού ενδιαφέροντος των οποίων η απόσπαση από το φυσικό τους περιβάλλον και η εκμετάλλευση είναι δυνατό να ρυθμίζονται με διαχειριστικά μέτρα.
- IUCN/Βιβλίο δεδομένων κινδύνου:** Διεθνής Ένωση Προστασίας της Φύσης (International Union for Conservation of Nature) / Το κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων ζώων της Ελλάδας (2009): **CR:** Κρισίμως Κινδυνεύον | **EN:** Κινδυνεύον | **VU:** Ευάλωτο | **NT:** Σχεδόν Απειλούμενο | **LR:** Χαμηλότερου Κινδύνου | **LC:** Μειωμένου Ενδιαφέροντος | **DD:** Ανεπαρκώς Γνωστό | **NE:** Μη αξιολογηθέν.

Δεδομένα από: (Imsiridou, Anastasia & Galinou-Mitsoudi, Sofia, 2013), (THE NOBLE PEN SHELL (Pinna nobilis) NOW CRITICALLY ENDANGERED, n.d.), (IUCN red list of threatened species, 2021)

	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED		 	
	Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων		Αρ.Εγγρ: PERM-GREE-ESIA-A08_0012_0_Annex8G	
			Αναθ. :	00
			Σελ.:	106 από 106