

ΕΡΓΟ:

Έργο αγωγού EastMed



Τίτλος Εγγράφου:	Ελληνικό Τμήμα EastMed- Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων
Υπότιτλος Εγγράφου	Παράρτημα 8Θ- Μελέτη Βάσης για την Ορνιθοπανίδα
Αρ. εγγράφου Έργου:	PERM-GREE-ESIA-A08_0013_O_Annex8H

	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED			
	Ελληνικό Τμήμα EastMed - Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων		Αρ. Εγγρ: PERM-GREE-ESIA-A08_0013_0_Annex8H	Αναθ. : 00
			Σελ:	2 από 70

Στοιχεία εγγράφου	
Τίτλος Εγγράφου	Ελληνικό Τμήμα EastMed - Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων
Υπότιτλος Εγγράφου	Παράρτημα 8Θ - Μελέτη Βάσης για την Ορνιθοπανίδα
Εταιρεία	IGI Poseidon
Συγγραφέας	Ecomed
Έργο	Έργο αγωγού EastMed
Αριθμός Εγγράφου Έργου	PERM-GREE-ESIA-A08_0013_0_Annex8H
Ημερομηνία	03/06/2022
Αναθεώρηση	00

Ιστορικό εγγράφου					
Αναθεώρηση	Συντάκτης	Έλεγχος από	Έγκριση από	Ημερομηνία	Έκδοση
00	Ecomed	ASPROFOS, ERM	IGI POSEIDON	03/06/2022	Για υποβολή στις Υπηρεσίες

Για τον Φορέα του Έργου

Digitally signed by: RESTELLI MATTEO
Location: Milan
Date: 07/06/2022 17:03:28





Digitally signed
by Michail Folas
Date: 2022.06.07
19:43:07 +03'00'

Για τον Περιβαλλοντικό Μελετητή

Signed by DANIELE ZOLI

Date: 06/06/2022 14:34:06 UTC



FILIPPOS
MARKOS
SPANIDIS

Digitally signed by FILIPPOS
MARKOS SPANIDIS
DN: cn=FILIPPOS MARKOS
SPANIDIS, c=GR,
email=pspani@asprofos.gr
Date: 2022.06.03 14:39:26 +03'00'

dimitrios
hourmouziadis

Digitally signed by dimitrios
hourmouziadis
DN: cn=dimitrios hourmouziadis,
c=GR,
email=dhourmouziadis@asprofos.gr
Date: 2022.06.03 14:05:13 +03'00'

GEORGIOS
VALAIS

Digitally signed by GEORGIOS
VALAIS
DN: cn=GEORGIOS VALAIS,
c=GR, email=gvalais@asprofos.gr
Date: 2022.06.03 13:12:44 +03'00'

Παράρτημα 8Θ- Μελέτη Βάσης για την Ορνιθοπανίδα

 IGI Poseidon	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED	
	Ελληνικό Τμήμα EastMed - Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων	Αρ. Εγγρ: PERM-GREE-ESIA- A08_0013_0 Annex8H Αναθ. : 00 Σελ: 3 από 70

Πίνακας περιεχομένων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 Θ	ΜΕΛΕΤΗ ΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑ.....	5
8 Θ.1.	Μεθοδολογία για τους Πίνακες των Ειδών	6
8 Θ.2.	Αποτελέσματα	6

Κατάλογος πινάκων

Πίνακας Θ-1	Είδη πτηνών που υπάρχουν και αναμένονται στην Περιοχή μελέτης	7
-------------	---	---

	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED		
	Ελληνικό Τμήμα EastMed - Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων	Αρ. Εγγρ: PERM-GREE-ESIA- A08_0013_0 Annex8H	
		Αναθ. :	00
		Σελ:	4 από 70

Ακρωνύμια

Ακρωνύμιο	Περιγραφή
CITES	Σύμβαση για το Διεθνές Εμπόριο των Ειδών της Άγριας Πανίδας και Χλωρίδας που Κινδυνεύουν με Εξαφάνιση (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)
EC	Ευρωπαϊκή Επιτροπή
ΕΟΚ	Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα
ΜΠΚΕ	Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων
GBIF	Παγκόσμιος Μηχανισμός Πληροφοριών για τη Βιοποικιλότητα (Global Biodiversity Information Facility)
IUCN	Διεθνής Ένωση Προστασίας της Φύσης (International Union for Conservation of Nature)
LF	Θέση προσαγιάλωσης
RAC/SPA	Περιφερειακό Κέντρο Δραστηριότητας για Ζώνες Ειδικής Προστασίας

	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED		
	Ελληνικό Τμήμα EastMed - Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων		Αρ. Εγγρ: PERM-GREE-ESIA- A08_0013_0 Annex8H
		Αναθ. :	00
		Σελ:	5 από 70

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 Θ ΜΕΛΕΤΗ ΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑ

 IGI Poseidon	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED	
	Ελληνικό Τμήμα EastMed - Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων	Αρ. Εγγρ: PERM-GREE-ESIA- A08_0013_0 Annex8H
		Αναθ. : 00
		Σελ: 6 από 70

8 Θ.1. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ

Κατάλογος ειδών:

Χρησιμοποιήθηκαν οι ακόλουθες βάσεις δεδομένων και αναφορές:

- 4^η Εθνική Έκθεση για την οδηγία σχετικά με τη διατήρηση των άγριων πτηνών (2009/147/ΕΚ) για την περίοδο αξιολόγησης 2013-2018. Άρθρο 17 της οδηγίας για τους οικοτόπους.
- Παγκόσμιος Μηχανισμός Πληροφοριών για τη Βιοποικιλότητα (GBIF)
- Κεντρικό αποθετήριο δεδομένων Eionet και
- Πηγές από RAC/SPA, IUCN, Ίδρυμα MAVA.

Επιπλέον, χρησιμοποιήθηκαν οι Ειδικές Οικολογικές Αξιολογήσεις της ΜΠΚΕ για τις Περιοχές Natura 2000 που επηρεάζονται από το έργο και περιείχαν δεδομένα που συλλέχθηκαν από συγκεκριμένες εργασίες πεδίου για να επιβεβαιωθεί η παρουσία ειδών στην Περιοχή Μελέτης.

Κατάσταση Προστασίας:

Για τον καθορισμό του καθεστώτος προστασίας και απειλής θα ακολουθηθεί η πρόβλεψη της εθνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Όλα τα είδη θα κατηγοριοποιηθούν σε κατηγορίες προστασίας με βάση τη συμπερίληψή τους: α) στην οδηγία 79/409/ΕΟΚ & την οδηγία για τα πτηνά 2009/147/ΕΚ, β) στην Κόκκινη Λίστα Απειλούμενων ειδών της IUCN (ευρωπαϊκή, έκδ. 3-2021), γ) στη Σύμβαση της Βέρνης για τη διατήρηση της ευρωπαϊκής άγριας ζωής και των φυσικών οικοτόπων, δ) στη Σύμβαση της Βόννης για τη διατήρηση των αποδημητικών ειδών της άγριας πανίδας, ε) στο Προεδρικό Διάταγμα 67/1981 και στ) στη Σύμβαση για το Διεθνές Εμπόριο των Ειδών της Άγριας Πανίδας και Χλωρίδας που Κινδυνεύουν με Εξαφάνιση (CITES)

8 Θ.2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει τα είδη πανίδας που υπάρχουν και αναμένονται στην Περιοχή Μελέτης.

Πίνακας Θ-1 Είδη πτηνών που υπάρχουν και αναμένονται στην Περιοχή μελέτης

Επιστημονική ονομασία	Κοινή ονομασία	ΠΔ 67/1981	Βέρνη	Βόννη	Σύμβαση της Βαρκελώνης	Οδηγία 92/43/ΕΟΚ	Οδηγία 2009/147/ΕΟΚ	IUCN/Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων ζώων της Ελλάδας	CITES	Οικολογία	Παρουσία εντός της Περιοχής Μελέτης	Ευαίσθητη Οικολογική Περίοδος	Περιοχές έργου										
													Πελοπόννησος (Χερσαίο Τμήμα)	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Χερσαία Ζώνη)	Κρήτη (Χερσαίο Τμήμα)	Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)	Νότιο Κρητικό Πέλαγος	Νότιο Αιγαίο Πέλαγος	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια Ζώνη & LF5)	Πατραϊκός Κόλπος	
<i>Accipiter brevipes</i>	Σαΐνι			II			I	LC/NE	II	ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΟ Αναπαράγεται σε δάση από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια ανατολικά έως τη νότια Ρωσία. Είναι αποδημητικό και διαχειμάζει από την Αίγυπτο μέχρι το νοτιοδυτικό Ιράν. Αποδημεί σε μεγάλα σμήνη, σε αντίθεση με το πιο διαδεδομένο ξεφτέρι. Το σαΐνι φωλιάζει στα δέντρα. Κυνηγάει μικρά πουλιά, έντομα και σαύρες στα δάση.	Δάση Το είδος είναι πιθανό να απαντηθεί σε ολόκληρη την Περιοχή Μελέτης. Μπορεί επίσης να αναζητά την τροφή του στην παραλία, αν και θεωρείται πολύ απίθανο. Παρά τις εντατικές προσπάθειες αναζήτησης στη βορειοανατολική Κρήτη, τη νοτιοδυτική Κρήτη και γύρω από το νησί της Καρπάθου, δεν έχει παρατηρηθεί εκεί.	Μάρτιος - Ιούνιος	*	*					*	*	*	*	*
<i>Accipiter gentilis</i>	Διπλοσάινο			II				LC/NE	II	Ευρέως διαδεδομένο είδος που κατοικεί στα εύκρατα μέρη του βόρειου ημισφαιρίου. Φαίνεται να ευδοκιμεί μόνο σε περιοχές με ώριμα, παλιάς ανάπτυξης δάση και συνήθως σε μέρη σε σχετικά περιορισμένη ανθρώπινη δραστηριότητα. Κατά την περίοδο της φωλεοποίησης, προτιμά τα ψηλά δέντρα με ενδιάμεση κάλυψη και μικρά ανοίγματα από κάτω για να μπορεί να κυνηγά. Μπορεί να εντοπιστεί σχεδόν σε οποιοδήποτε υψόμετρο. Τους χειμερινούς μήνες, οι βορειότεροι πληθυσμοί μετακινούνται προς τα θερμότερα δάση με χαμηλότερα υψόμετρα.	Δάση φυλλοβόλων και κωνοφόρων.	Μάρτιος - Ιούνιος	*	*									
<i>Accipiter nisus</i>	Ξεφτέρι			II				LC/NE	II	Είναι ένα από τα πιο κοινά αρπακτικά πτηνά στην Ευρώπη. Αυτό το είδος είναι κοινό στους περισσότερους τύπους δασών στο εύρος	Δασικές εκτάσεις	Μάρτιος - Ιούνιος	*	*									

Επιστημονική ονομασία	Κοινή ονομασία	ΠΔ 67/1981	Βέρνη	Βόννη	Σύμβαση της Βαρκελώνης	Οδηγία 92/43/ΕΟΚ	Οδηγία 2009/147/ΕΟΚ	IUCN/Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων ζώων της Ελλάδας	CITES	Οικολογία	Παρουσία εντός της Περιοχής Μελέτης	Ευαίσθητη Οικολογική Περίοδος	Περιοχές έργου									
													Πελοπόννησος (Χερσαίο Τμήμα)	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Χερσαία Ζώνη)	Κρήτη (Χερσαίο Τμήμα)	Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)	Νότιο Κρητικό Πέλαγος	Νότιο Αιγαίο Πέλαγος	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια Ζώνη & LF5)	Πατραϊκός Κόλπος
										εξάπλωσής του και επίσης σε πιο ανοιχτά τοπία με διάσπαρτα δέντρα. Τα ξεφτέρια προτιμούν να κυνηγούν στα όρια των δασικών τοπίων, αλλά σαν αποδημητικά πουλιά μπορούν να εντοπιστούν σε οποιονδήποτε οικότοπο.												
<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	Τσιχλοποταμίδα							LC/NE		ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΟ Αναπαράγεται σε ψηλούς, πυκνούς και κατά προτίμηση εκτεταμένους καλαμιώνες, συχνά στις άκρες μέσα σε κενά ή ανοιχτά ύδατα. Αν χρειαστεί, αρκείται σε μικρότερους καλαμιώνες, π.χ. κατά μήκος καναλιών και αναχωμάτων. Καλοκαιρινός επισκέπτης και τους χειμώνες απαντάται στην τροπική Αφρική. Φτιάχνει τη φωλιά του σε σχήμα καλαθιού μέσα σε πολλά δυνατά καλάμια σε μεσαίο ύψος πάνω από το νερό.	Καλαμιώνες	Μάρτιος - Ιούνιος	*	*								
<i>Acrocephalus palustris</i>	Βαλτοποταμίδα							LC/NE		ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΟ Αναπαράγεται σε ποώδη βλάστηση, συχνά σε υγρές συστάδες φιλιπένδουλας, τσουκνίδας, άγριου ανθρίσκου κ.λπ., συχνά δίπλα σε υγρές τάφρους ή εγκαταλελειμμένες εκτάσεις, μερικές φορές στις άκρες καλαμιώνων εάν αναπτύσσονται σε ελαφρώς πιο ξηρό έδαφος και είναι αναμειγμένοι με χόρτα βοσκής. Καλοκαιρινοί επισκέπτες, ξεχειμωνιάζουν στην τροπική Αφρική. Αδιάφορες συνήθειες.	Λιβάδια	Μάρτιος - Ιούνιος		*								
<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	Σχοινοποταμίδα							LC/NE		Προσαρμόζεται σε δροσερές, συννεφιασμένες και υγρές συνθήκες. Αν και απαντάται συχνά σε υγροτόπους, μπορεί να αναπαραχθεί σε απόσταση 500 και άνω μέτρων από το νερό. Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγικής περιόδου, είναι ένα είδος που απαντάται σε καλαμιώνες, συχνά με θάμνους, τάφρους και οικοτόπους μακριά από το νερό, ακόμη και σε θαμνοστοιχίες, εκτάσεις με τσουκνίδα και αροτραίες καλλιέργειες.	Καλαμιώνες	Μάρτιος - Ιούνιος		*								

Επιστημονική ονομασία	Κοινή ονομασία	ΠΔ 67/1981	Βέρνη	Βόννη	Σύμβαση της Βαρκελώνης	Οδηγία 92/43/ΕΟΚ	Οδηγία 2009/147/ΕΟΚ	IUCN/Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων ζώων της Ελλάδας	CITES	Οικολογία	Παρουσία εντός της Περιοχής Μελέτης	Ευαίσθητη Οικολογική Περίοδος	Περιοχές έργου												
													Πελοπόννησος (Χερσαίο Τμήμα)	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Χερσαία Ζώνη)	Κρήτη (Χερσαίο Τμήμα)	Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)	Νότιο Κρητικό Πέλαγος	Νότιο Αιγαίο Πέλαγος	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια Ζώνη & LF5)	Πατραϊκός Κόλπος			
<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	Καλαμποποταμίδα							LC/NE		Αυτό το μικρό στρουθιόμορφο πουλί είναι ένα είδος που απαντάται σχεδόν αποκλειστικά σε καλαμιώνες, συνήθως με μερικούς θάμνους. Γεννάει 3-5 αυγά σε μια φωλιά σε σχήμα καλαθιού μέσα σε καλάμια.	Καλαμιώνες	Μάρτιος - Ιούνιος	*	*							*				
<i>Actitis hypoleucos</i>	Ποταμότρυγγας							LC/NE		Διαδεδομένο και κοινό είδος. Φωλιάζει στο έδαφος κοντά σε γλυκό νερό. Αναζητά την τροφή του με την όρασή του στο έδαφος ή σε ρηχά νερά, συλλέγοντας μικρά ζώα όπως έντομα, καρκινοειδή και άλλα ασπόνδυλα.	Γλυκό νερό	Μάρτιος - Ιούνιος	*												
<i>Aegithalos caudatus</i>	Αιγίθαλος							LC/NE		Κοινό πουλί που απαντάται σε όλη την Ευρώπη και την Ασία. Κατοικεί σε δάση φυλλοβόλων και μικτά δάση με ανεπτυγμένη θαμνώδη βλάστηση, ενώ προτιμά τα όρια των οικοτόπων. Μπορεί επίσης να εντοπιστεί σε θάμνους, ερείκη με διάσπαρτα δέντρα, θάμνους και φράχτες, σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις και σε παραποτάμια δάση, πάρκα και κήπους. Η διατροφή του είδους καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου με έντομα και η συνήθειά να αναζητά τροφή ομαδικά (κοινωνική αναζήτηση τροφής) καθορίζει την επιλογή οικοτόπων τον χειμώνα που βρίσκονται σε δάση φυλλοβόλων, συνήθως από δρυς (Quercus sp.), Φράξινο (Fraxinus sp.) και τοπικά είδη Συκομουριάς. Για τη φωλεοποίηση, παρουσιάζεται έντονη προτίμηση στις θαμνώδεις περιοχές. Κατασκευάζει τη φωλιά του συνήθως σε αγκαθωτούς θάμνους σε απόσταση μικρότερη των 3 μέτρων πάνω από το έδαφος.	Δάση φυλλοβόλων και μικτά δάση	Μάρτιος - Ιούνιος	*	*											
<i>Aegolius funereus</i>	Αιγωλιός			II			I	LC/DD	II	Αναπαράγεται σε πυκνά δάση με μικρούς βάλτους και ξέφωτα. Κυρίως μη αποδημητικό, ωστόσο ορισμένες φορές πολλά άτομα μεταναστεύουν νότια κατά την φθινοπωρινή περίοδο, πιθανώς κυρίως θηλυκά και νεαρά. Αυστηρά νυχτόβιο, δύσκολο να παρατηρηθεί εκτός της περιοχής γύρω από τη φωλιά του. Τρέφεται	Δάση	Μάρτιος - Ιούνιος													

Επιστημονική ονομασία	Κοινή ονομασία	ΠΔ 67/1981	Βέρνη	Βόννη	Σύμβαση της Βαρκελώνης	Οδηγία 92/43/ΕΟΚ	Οδηγία 2009/147/ΕΟΚ	IUCN/Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων ζώων της Ελλάδας	CITES	Οικολογία	Παρουσία εντός της Περιοχής Μελέτης	Ευαίσθητη Οικολογική Περίοδος	Περιοχές έργου										
													Πελοπόννησος (Χερσαίο Τμήμα)	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Χερσαία Ζώνη)	Κρήτη (Χερσαίο Τμήμα)	Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)	Νότιο Κρητικό Πέλαγος	Νότιο Αιγαίο Πέλαγος	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια Ζώνη & LF5)	Πατραϊκός Κόλπος	
										κυρίως με αρουραίους των αγρών. Φωλιάζει σε τρύπες μέσα στα δέντρα (παλιές φωλιές μαύρου δρυοκολάπτη) ή τεχνητές φωλιές.													
<i>Alauda arvensis</i>	Σταρήθρα							LC/NT		Αναπαράγεται συνήθως σε ανοιχτές, καλλιεργούμενες εκτάσεις, καθώς και σε λιβάδια και ρείκια. Κυρίως μη-αποδημητικό είδος, αλλά μετακινείται τον χειμώνα από τον Βορρά. Μεγάλα σμήνη μπορεί να συγκεντρωθούν σε καλαμιές και στέπες με χόρτα τον χειμώνα.	Λιβάδια και καλλιεργούμενες εκτάσεις.	Μάρτιος - Ιούνιος	*	*									
<i>Alcedo atthis</i>	Αλκυόνη		II				I	LC/DD		Είναι ένα κοινό είδος που αναπαράγεται σε μεγάλο εύρος της ευρασίας. Στη Βόρεια Αφρική είναι κυρίως χειμερινός επισκέπτης, αν και σπανίως κατοικεί στο παράκτιο Μαρόκο και την Τυνησία. Σε εύκρατες περιοχές, αυτή η αλκυόνα κατοικεί σε καθαρά, αργής ροής ρυάκια και ποτάμια, και σε λίμνες με όχθες με πλούσια βλάστηση. Συχνάζει σε θάμνους με κλαδιά που προεξέχουν κοντά σε ρηχά ανοιχτά ύδατα στα οποία κυνηγά. Τον χειμώνα είναι πιο παραθαλάσσιο, συχνά τρέφεται στις εκβολές των ποταμών ή σε λιμάνια και κατά μήκος βραχωδών ακτών.	Λίμνες, ποτάμια, Δάση κατακλυζόμενων πεδιάδων, (Παρόχθιο δάσος/Ποταμιαίο δάσος). Το είδος απαντάται σε ολόκληρη την παράκτια Περιοχή Μελέτης.	Μάρτιος - Ιούνιος	*	*							*		
<i>Alectoris chukar</i>	Νησοπέρδικα							LC/NE		Αναπαράγεται σε παρόμοιους οικοτόπους μαζί με τη συγγενική του πετροπέρδικα, αλλά κατεβαίνει επίσης χαμηλότερα και βρίσκεται γύρω από καλλιέργειες, βοσκοτόπια με άγρονο έδαφος κ.λπ. καθώς και σε ορεινές ερήμους. Στην Ευρώπη η παρουσία του έχει μειωθεί.	Βράχοι LF3: Το είδος απαντάται σε ολόκληρη την παράκτια Περιοχή Μελέτης.	Μάρτιος - Ιούνιος			*				*				
<i>Alectoris graeca</i>	Πετροπέρδικα						I	NT/VU		Αναπαράγεται σε βραχώδεις αλπικές πλαγιές γενικά πάνω από το όριο δεντροφυΐας (αλλά και σε ξέφωτα και ανάμεσα σε διάσπαρτα δέντρα), κυρίως στα 1000-2000 m, συχνά με γρασίδι, θάμνους και χαμηλούς θάμνους. Αποφεύγει τις πλαγιές με βόρειο προσανατολισμό.	Βράχοι	Μάρτιος - Ιούνιος	*										
<i>Anas clypeata</i>	Χουλιαρόπαπια			II				LC/NE		Κατοικεί σε ανοιχτούς υγρότοπους, όπως υγρά λιβάδια ή έλη με μικρή αναδυόμενη βλάστηση. Η χουλιαρόπαπια προτιμά να	Έλη	Μάρτιος - Ιούνιος		*									

Επιστημονική ονομασία	Κοινή ονομασία	ΠΑ 67/1981	Βέρνη	Βόννη	Σύμβαση της Βαρκελώνης	Οδηγία 92/43/ΕΟΚ	Οδηγία 2009/147/ΕΟΚ	IUCN/Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων ζώων της Ελλάδας	CITES	Οικολογία	Παρουσία εντός της Περιοχής Μελέτης	Ευαίσθητη Οικολογική Περίοδος	Περιοχές έργου											
													Πελοπόννησος (Χερσαίο Τμήμα)	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Χερσαία Ζώνη)	Κρήτη (Χερσαίο Τμήμα)	Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)	Νότιο Κρητικό Πέλαγος	Νότιο Αιγαίο Πέλαγος	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια Ζώνη & LF5)	Πατραϊκός Κόλπος		
										φωλιάζει σε εκτάσεις με γρασίδι μακριά από ανοιχτά ύδατα. Η φωλιά της είναι μια ρηχή κοιλότητα στο έδαφος, επενδεδυμένη με φυτά και πούπουλα. Τα θηλυκά συνήθως γεννούν περίπου εννέα αυγά.														
Anas crecca	Κιρκίρι			II			II	LC/NE		Κοινή και διαδεδομένη πάπια που αναπαράγεται στην εύκρατη Ευρασία και μεταναστεύει νότια τον χειμώνα.	Λίμνες	Μάρτιος - Ιούνιος												
Anas penelope	Σφυριχτάρι			II			II	LC/NE		Αναπαράγεται σε λίμνες και έλη βόρειων δασών, λίμνες τούνδρας, καθώς και σε εύκρατα ρηχά γλυκά ύδατα. Μεταναστεύει στον Βορρά, διαχειμάζει σε μεγάλο βαθμό σε θαλάσσιους οικοτόπους, καθώς και σε λίμνες και ταμιευτήρες. Κοινωνικό, εκτός από την περίοδο φωλεοποίησης. Φυτοφάγο. Συχνά βόσκει σε καλλιεργήσιμα χωράφια τον χειμώνα.	Λίμνες	Μάρτιος - Ιούνιος		*										
Anas platyrhynchos	Πρασινοκέφαλη πάπια			II			II	LC/NE		Η πρασινοκέφαλη πάπια είναι ευρέως διαδεδομένη σε όλη την Ευρώπη. Είναι έντονα μεταναστευτικό είδος αναπαράγονται σε βόρειες περιοχές και διαχειμάζει νοτιότερα. Απαντάται τόσο σε υγροτόπους γλυκού νερού όσο και σε αλμυρά ύδατα, συμπεριλαμβανομένων πάρκων, μικρών λίμνων, ποταμών και εκβολών ποταμών, καθώς και σε ρηχούς κολπίσκους και ανοιχτή θάλασσα σε ορατή απόσταση από την ακτογραμμή. Προτιμά βάθη μικρότερα από 1 μέτρο (3,3 πόδια), ενώ αποφεύγει περιοχές με βάθος μεγαλύτερο από μερικά μέτρα. Ελκύεται από υδάτινα σώματα με υδρόβια βλάστηση.	Λίμνες	Μάρτιος - Ιούνιος	*	*										
Anas querquedula	Σαρσέλα							LC/VU		ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΟ Αναπαράγεται σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης και της δυτικής Ασίας, αλλά είναι αυστηρά μεταναστευτικό, με ολόκληρο τον πληθυσμό να μετακινείται στη νότια Αφρική, την Ινδία και την Αυστραλία τον χειμώνα, όπου μπορούν να εμφανιστούν μεγάλα σμήνη. Ο	Το είδος μπορεί να απαντηθεί σε ολόκληρη την παραθαλάσσια περιοχή μελέτης κατά τη μετανάστευση του. Μπορεί επίσης να αναζητά	Μάρτιος - Ιούνιος	*	*				*	*	*	*	*		

Επιστημονική ονομασία	Κοινή ονομασία	ΠΔ 67/1981	Βέρνη	Βόνη	Σύμβαση της Βαρκελώνης	Οδηγία 92/43/ΕΟΚ	Οδηγία 2009/147/ΕΟΚ	IUCN/Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων ζώων της Ελλάδας	CITES	Οικολογία	Παρουσία εντός της Περιοχής Μελέτης	Ευαίσθητη Οικολογική Περίοδος	Περιοχές έργου											
													Πελοπόννησος (Χερσαίο Τμήμα)	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Χερσαία Ζώνη)	Κρήτη (Χερσαίο Τμήμα)	Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)	Νότιο Κρητικό Πέλαγος	Νότιο Αιγαίο Πέλαγος	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια Ζώνη & LF5)	Πατραϊκός Κόλπος		
										οικότοπος αναπαραγωγής του είναι τα λιβάδια δίπλα σε ρηχά έλη και στέπες.	την τροφή του στην παραλία, αν και θεωρείται πολύ απίθανο. Το είδος μπορεί να απαντηθεί και να πετάει πάνω από ένα τμήμα της θαλάσσιας περιοχής μελέτης στο Νότιο Αιγαίο και τον Πατραϊκό Κόλπο.													
<i>Anthus campestris</i>	Ωχροκελάδα						I	LC/LC		Αναζητεί σπάνια την τροφή του σε αμμόλοφους, αμμώδεις ανοιχτές εκτάσεις, σε χαλικόδεις εκτάσεις και σε ξέφωτα, καθώς και σε άγονες βουνοπλαγιές.	Ανοιχτό έδαφος	Μάρτιος - Ιούνιος	*	*	*									
<i>Anthus spinoletta</i>	Νεροκελάδα							LC/NE		Μεταναστεύει σε μικρές αποστάσεις και μετακινείται σε υγρά ανοιχτά πεδινά εδάφη, όπως έλη και πλημμυρισμένα χωράφια τον χειμώνα.	Έλη	Μάρτιος - Ιούνιος												
<i>Anthus trivialis</i>	Δεντροκελάδα							LC/NE		Ο οικότοπος αναπαραγωγής του είναι τα ανοιχτά δάση και οι θάμνοι. Δημιουργεί τη φωλιά του στο έδαφος. Πρόκειται για ένα εντομοφάγο είδος, όπως και τα άλλα συγγενικά είδη του, αλλά τρέφεται και με σπόρους.	Δασικές εκτάσεις	Μάρτιος - Ιούνιος	*											
<i>Arus arus</i>	Μαυροσταχτάρα							LC/NE		Αναπαράγεται σε πόλεις και χωριά και, σπάνια, σε ερημικές δασώδεις περιοχές ή γκρεμούς. Καλοκαιρινός επισκέπτης, διαχειμάζει στη Νότια Αφρική. Φωλιάζει σε φρεάτια εξαερισμού, ρωγμές κ.λπ. σε τοίχους, κάτω από κυρτά κεραμίδια ή στους θόλους των εκκλησιών, τους οποίους χώρους χρησιμοποιεί τακτικά χρόνο με τον χρόνο. Τα ζευγάρια μένουν μαζί σε όλη τους τη ζωή.	Ευρέως διαδεδομένο είδος	Μάρτιος - Ιούνιος	*	*	*									
<i>Arus pallidus</i>	Ωχροσταχτάρα		II					LC/NE		Αναπαράγεται σε γκρεμούς και στο άκρο από στέγες. Είναι μεταναστευτικό είδος που διαχειμάζει στη νότια Αφρική.	Γκρεμοί	Μάρτιος - Ιούνιος	*	*	*									

Επιστημονική ονομασία	Κοινή ονομασία	ΠΔ 67/1981	Βέρνη	Βόννη	Σύμβαση της Βαρκελώνης	Οδηγία 92/43/ΕΟΚ	Οδηγία 2009/147/ΕΟΚ	IUCN/Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων ζώων της Ελλάδας	CITES	Οικολογία	Παρουσία εντός της Περιοχής Μελέτης	Ευαίσθητη Οικολογική Περίοδος	Περιοχές έργου									
													Πελοπόννησος (Χερσαίο Τμήμα)	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Χερσαία Ζώνη)	Κρήτη (Χερσαίο Τμήμα)	Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)	Νότιο Κρητικό Πέλαγος	Νότιο Αιγαίο Πέλαγος	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια Ζώνη & LF5)	Πατραϊκός Κόλπος
Ardea alba	Αργυροτσικνιάς			II			I	LC/VU		ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΟ: Ευρέως κατανεμημένο είδος. Απαντάται στις περισσότερες από τις τροπικές και θερμότερες εύκρατες περιοχές του κόσμου και είναι περισσότερο εντοπισμένο στη νότια Ευρώπη. Ο Αργυροτσικνιάς είναι εν μέρει αποδημητικός, με τα άτομα του βορείου ημισφαιρίου να μετακινούνται νότια από περιοχές με ψυχρότερους χειμώνες. Αναπαράγεται σε αποικίες σε δέντρα κοντά σε μεγάλες λίμνες με καλαμιώνες ή άλλους εκτεταμένους υγροτόπους.	Το είδος μπορεί να απαντηθεί σε ολόκληρη τη Παράκτια περιοχή μελέτης κατά τη μετανάστευση του. Το πτηνό μπορεί να απαντηθεί και να πετάει πάνω από ένα τμήμα της Θαλάσσιας περιοχής μελέτης στο Νότιο Αιγαίο και τον Πατραϊκό Κόλπο.	Μάρτιος - Ιούνιος						*	*	*	*	*
Ardea cinerea	Σταχτοτσικνιάς							LC/NE		Απαντάται σε δάση με ψηλά δέντρα δίπλα σε λίμνες και υφάλμυρους κόλπους. Περιμένει υπομονετικά, αναζητεί την τροφή του στις όχθες των λιμνών και των ποταμών. Στηρίζεται στο ένα πόδι. Φωλιάζει σε επίπεδα καλάθια από ξυλάκια στα κλαδιά των δέντρων.	Δασικές εκτάσεις. Μπορεί επίσης να αναζητά την τροφή του στην παραλία, αν και θεωρείται πολύ απίθανο.	Μάρτιος - Ιούνιος	*	*						*		
Ardea purpurea	Πορφυροτσικνιάς		II	II			I	LC/EN		ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΟ: Αναπαράγεται σε αποικίες σε εκτεταμένες, ρηχές βαλτώδεις λίμνες με καλαμιώνες. Αναζητεί την τροφή του σε ρηχά νερά και σε κενά ανάμεσα σε καλάμια και κατά μήκος των ποταμών, ή πιο συχνά σε ανοίγματα σε υγρά λιβάδια. Καλοκαιρινός επισκέπτης (κυρίως Απρίλιος-Οκτώβριος), ο οποίος διαχειμάζει στην τροπική Αφρική. Τρέφεται με ψάρια, βατράχους και έντομα. Φωλιάζει σε καλάμια (συνήθως στην Ευρώπη) ή δέντρα.	Λίμνες. Το είδος απαντάται σε ολόκληρη την παράκτια Περιοχή Μελέτης. Το πτηνό μπορεί να απαντηθεί πάνω από ένα τμήμα της θαλάσσιας περιοχής μελέτης στο Νότιο Αιγαίο και τον Πατραϊκό Κόλπο.	Μάρτιος - Ιούνιος						*	*	*	*	

Επιστημονική ονομασία	Κοινή ονομασία	ΠΔ 67/1981	Βέρνη	Βόννη	Σύμβαση της Βαρκελώνης	Οδηγία 92/43/ΕΟΚ	Οδηγία 2009/147/ΕΟΚ	IUCN/Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων ζώων της Ελλάδας	CITES	Οικολογία	Παρουσία εντός της Περιοχής Μελέτης	Ευαίσθητη Οικολογική Περίοδος	Περιοχές έργου										
													Πελοπόννησος (Χερσαίο Τμήμα)	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Χερσαία Ζώνη)	Κρήτη (Χερσαίο Τμήμα)	Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)	Νότιο Κρητικό Πέλαγος	Νότιο Αιγαίο Πέλαγος	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια Ζώνη & LF5)	Πατραϊκός Κόλπος	
Ardeola ralloides	Κρυπτοτσικνιάς		II				I	LC/VU		ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΟ: Ο κρυπτοτσικνιάς είναι μεταναστευτικό είδος, που διαχειμάζει στην Αφρική. Απαντάται σπάνια βόρεια της περιοχής αναπαραγωγής του. Ο οικότοπος αναπαραγωγής του είναι ελώδεις υγράτοποι σε θερμές χώρες. Τα πτηνά φωλιάζουν σε μικρές αποικίες, συχνά με άλλα πουλιά, συνήθως σε συστάδες από κλαδιά σε δέντρα ή θάμνους. Τρέφονται με ψάρια, βατράχια και έντομα.	Έλη. Το είδος μπορεί να απαντηθεί σε ολόκληρη την παραθαλάσσια περιοχή μελέτης κατά τη μετανάστευση του. Μπορεί επίσης να αναζητά την τροφή του στην παραλία, αν και θεωρείται πολύ απίθανο. Το πτηνό μπορεί να απαντηθεί πάνω από ένα τμήμα της θαλάσσιας περιοχής μελέτης στο Νότιο Αιγαίο και τον Πατραϊκό Κόλπο.	Μάρτιος - Ιούνιος		*				*	*	*	*	*	
Asio otus	Νανόμπουφος							LC/NE	II	Το πουλί αυτό είναι εν μέρει μεταναστευτικό, μετακινείται νότια το χειμώνα από τα βόρεια μέρη της εύκρατης περιοχής του. Ο οικότοπός του είναι δάση κοντά σε ανοιχτές εκτάσεις. Φωλιάζει σε δέντρα, συχνά κωνοφόρα, χρησιμοποιώντας παλιές φωλιές από κλαδιά άλλων πτηνών. Χρησιμοποιεί εύκολα τεχνητά καλάθια για φωλιές.	Ανοιχτό έδαφος	Μάρτιος - Ιούνιος	*		*								
Athene noctua	Μικρή κουκουβάγια		II					LC/NE	II	Πρόκειται για ένα μη-αποδημητικό είδος που απαντάται σε ανοιχτά εδάφη, όπως μικτές γεωργικές εκτάσεις και πάρκα. Το θήραμά του είναι έντομα, γαιοσκώληκες, αμφίβια, αλλά και μικρά πτηνά και θηλαστικά. Μπορεί να επιτεθεί σε πτηνά μεγάλου μεγέθους, όπως πτερωτά θηράματα. Είναι εν μέρει ημερόβιο και κουρνιάζει συχνά σε εμφανή σημεία και κατά τη διάρκεια της ημέρας.	Ανοιχτό έδαφος	Μάρτιος - Ιούνιος	*	*	*								

Επιστημονική ονομασία	Κοινή ονομασία	ΠΔ 67/1981	Βέρνη	Βόννη	Σύμβαση της Βαρκελώνης	Οδηγία 92/43/ΕΟΚ	Οδηγία 2009/147/ΕΟΚ	IUCN/Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων ζώων της Ελλάδας	CITES	Οικολογία	Παρουσία εντός της Περιοχής Μελέτης	Ευαίσθητη Οικολογική Περίοδος	Περιοχές έργου											
													Πελοπόννησος (Χερσαίο Τμήμα)	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Χερσαία Ζώνη)	Κρήτη (Χερσαίο Τμήμα)	Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)	Νότιο Κρητικό Πέλαγος	Νότιο Αιγαίο Πέλαγος	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια Ζώνη & LF5)	Πατραϊκός Κόλπος		
Aythya ferina	Γκισάρι			II			II	LC/LC		ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΟ: Ο οικότοπος αναπαραγωγής τους είναι έλη και λίμνες με βάθος ένα μέτρο ή μεγαλύτερο. Το γκισάρι αναπαράγεται σε μεγάλο μέρος της εύκρατης και βόρειας Ευρώπης μέχρι την Ασία. Είναι μεταναστευτικά, και διαχειμάζει στη νότια και δυτική Ευρώπη. Είναι κοινωνικά πτηνά, που σχηματίζουν μεγάλα σμήνη το χειμώνα, ενώ αναμειγνύονται συχνά με άλλες βουτόπαπιες όπως η μαυροκέφαλη πάπια, με την οποία είναι γνωστό ότι υβριδοποιούνται. Αυτά τα πτηνά αναζητούν το θήραμά τους κυρίως στο νερό. Τρώνε υδρόβια φυτά και μερικά μαλάκια, υδρόβια έντομα και μικρά ψάρια. Συνήθως τρέφονται τη νύχτα και είναι γνωστά για τις χαρακτηριστικές καταδύσεις τους.	Έλη, λίμνες	Μάρτιος - Ιούνιος		*										
Aythya nyroca	Βαλτόπαπια			II			I	NT/VU		ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΟ: Ο οικότοπος αναπαραγωγής τους είναι έλη και λίμνες με βάθος ένα μέτρο ή μεγαλύτερο. Αυτές οι πάπιες αναπαράγονται στη νότια και ανατολική Ευρώπη και στη νότια και δυτική Ασία. Είναι κοινωνικά πτηνά, που σχηματίζουν μεγάλα σμήνη το χειμώνα, ενώ αναμειγνύονται συχνά με άλλες βουτόπαπιες όπως η μαυροκέφαλη πάπια και το γκισάρι. Είναι εν μέρει μεταναστευτικό, και διαχειμάζει πιο νότια και στη βόρεια Αφρική. Αυτά τα πτηνά αναζητούν το θήραμά τους κυρίως στο νερό. Τρώνε υδρόβια φυτά και μερικά μαλάκια, υδρόβια έντομα και μικρά ψάρια. Συνήθως τρέφονται τη νύχτα και είναι γνωστά για τις χαρακτηριστικές καταδύσεις τους.	Έλη, λίμνες. Το είδος μπορεί να απαντηθεί σε ολόκληρη την παράκτια περιοχή μελέτης κατά τη μετανάστευση του. Μπορεί επίσης να αναζητά την τροφή του στην παραλία, αν και θεωρείται πολύ απίθανο. Το πτηνό μπορεί να απαντηθεί πάνω από ένα τμήμα της θαλάσσιας περιοχής μελέτης στο Νότιο Αιγαίο.	Μάρτιος - Ιούνιος	*	*					*	*	*	*	*	*

Επιστημονική ονομασία	Κοινή ονομασία	ΠΔ 67/1981	Βέρνη	Βόννη	Σύμβαση της Βαρκελώνης	Οδηγία 92/43/ΕΟΚ	Οδηγία 2009/147/ΕΟΚ	IUCN/Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων ζώων της Ελλάδας	CITES	Οικολογία	Παρουσία εντός της Περιοχής Μελέτης	Ευαίσθητη Οικολογική Περίοδος	Περιοχές έργου											
													Πελοπόννησος (Χερσαίο Τμήμα)	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Χερσαία Ζώνη)	Κρήτη (Χερσαίο Τμήμα)	Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)	Νότιο Κρητικό Πέλαγος	Νότιο Αιγαίο Πέλαγος	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια Ζώνη & LF5)	Πατραϊκός Κόλπος		
Bonasa bonasia	Αγριόκοτα						I	LC/DD		Δεν είναι αποδημητικό είδος, αναπαράγεται σε όλη τη βόρεια Ευρασία μέχρι το Hokkaido, και δυτικά ως την κεντρική και ανατολική Ευρώπη, σε πυκνά, υγρά, μικτά δάση κωνοφόρων, κατά προτίμηση με λίγη ερυθρελάτη. Το πτηνό αυτό τρέφεται στο έδαφος, λαμβάνοντας κυρίως φυτικές τροφές, τις οποίες συμπληρώνει με έντομα κατά την αναπαραγωγή.	Δάση	Μάρτιος - Ιούνιος												
Bubo bubo	Ευρασιατικός μπούφος						I	LC/LC	II	Ο μπούφος παρουσιάζει αραιή κατανομή σε βραχώδεις περιοχές, αλλά μπορεί να κατοικήσει ενδεχομένως σε ένα ευρύ φάσμα οικοτόπων. Έχει απαντηθεί σε διαφορετικούς οικοτόπους από βόρεια δάση κωνοφόρων έως τα όρια αχανών ερήμων. Απαντάται συχνά σε μεγαλύτερα πλήθη σε περιοχές με βράχια και χαράδρες που περιβάλλονται από διάσπαρτα δέντρα και θάμνους. Μπορεί επίσης να επισκεφτεί βραχώδεις ακτές, στέπες και λιβάδια, κυρίως για να κυνηγήσει στα ευρεία εδάφη του. Λόγω της προτίμησής τους στις βραχώδεις περιοχές, το είδος απαντάται συχνά σε ορεινές περιοχές και μπορεί να απαντηθεί σε υψόμετρα έως και 2.000 m (6.600 πόδια) στην Ευρώπη. Μπορεί να απαντηθεί όμως και στο επίπεδο της θάλασσας. Αν και απαντάται σε μεγαλύτερα πλήθη σε αραιοκατοικημένες περιοχές, κάποιες φορές κατοικεί και σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις και μάλιστα έχει παρατηρηθεί να ζει σε πάρκα μέσα σε ευρωπαϊκές πόλεις.	Ευρείας εμβέλειας	Μάρτιος - Ιούνιος	*	*										
Bubulcus ibis	Γελαδάρης							LC/NE		Φωλιάζει σε αποικίες, συνήθως κοντά σε υδάτινα σώματα και συχνά με άλλα πουλιά. Η φωλιά είναι μια πλατφόρμα από κλαδιά σε δέντρα ή θάμνους. Ο γελαδάρης εκμεταλλεύεται πιο ξηρούς και ανοιχτούς οικότοπους περισσότερο από άλλα είδη ερωδιών. Οι οικότοποι στους οποίους τρέφεται περιλαμβάνουν εποχικά πλημμυρισμένα λιβάδια, βοσκοτόπια, γεωργικές εκτάσεις, υγροτόπους και ορυζώνες. Συχνά συνοδεύουν βοοειδή ή άλλα	Λίμνες	Μάρτιος - Ιούνιος												

Επιστημονική ονομασία	Κοινή ονομασία	ΠΔ 67/1981	Βέρνη	Βόνη	Σύμβαση της Βαρκελώνης	Οδηγία 92/43/ΕΟΚ	Οδηγία 2009/147/ΕΟΚ	IUCN/Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων ζώων της Ελλάδας	CITES	Οικολογία	Παρουσία εντός της Περιοχής Μελέτης	Ευαίσθητη Οικολογική Περίοδος	Περιοχές έργου										
													Πελοπόννησος (Χερσαίο Τμήμα)	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Χερσαία Ζώνη)	Κρήτη (Χερσαίο Τμήμα)	Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)	Νότιο Κρητικό Πέλαγος	Νότιο Αιγαίο Πέλαγος	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια Ζώνη & LF5)	Πατραϊκός Κόλπος	
										μεγάλα θηλαστικά, πιάνοντας έντομα και μικρά θηράματα σπονδυλωτών που ενοχλημένα προσπαθούν να απομακρυνθούν.													
<i>Burhinus oedichnemus</i>	Πετροτρίλιδα			II			I	LC/NT		ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΟ: Αναπαράγεται σε χέρσες εκτάσεις ή εκτάσεις με αραιή βλάστηση (ρεικόπεδα, ξηρά, πετρώδη βοσκοτόπια, αποξηραμένη λάσπη, όρια στεπών κ.λπ.). Καλοκαιρινός επισκέπτης (Μάρτιος-Οκτώβριος), διαχειμάζει στη ΝΔ Ευρώπη και την Αφρική. Δραστηριοποιείται από το σούρουπο μέχρι την αυγή, αλλά δεν αποκλείεται να δραστηριοποιηθεί και την ημέρα. Τρέφεται κυρίως με έντομα. Η φωλιά του είναι πρόχειρη.	Λιβάδια. Το είδος μπορεί να απαντηθεί σε ολόκληρη την παραθαλάσσια περιοχή μελέτης κατά τη μετανάστευση του. Μπορεί επίσης να αναζητά την τροφή του στην παραλία, αν και θεωρείται πολύ απίθανο. Το πτηνό μπορεί να απαντηθεί πάνω από ένα τμήμα της θαλάσσιας περιοχής μελέτης στο Νότιο Αιγαίο και τον Πατραϊκό Κόλπο.	Μάρτιος - Ιούνιος	*	*				*	*	*	*	*	*
<i>Buteo buteo</i>	Γερακίνα			II				LC/NE	II	Αναπαράγεται σε δασικές εκτάσεις, συνήθως στις παρυφές, αλλά προτιμά να κυνηγά σε ανοιχτές εκτάσεις. Τρώει κυρίως μικρά θηλαστικά, ακόμα και κουφάρια. Εξαιρετικά ευπροσάρμοστο είδος που τρέφεται με διάφορα είδη φασιανών, κουνελιών, άλλων μικρών θηλαστικών έως μεσαίων θηλαστικών, φιδιών και σαυρών και συχνά μπορεί να το δει κανείς να περπατά πάνω από πρόσφατα οργωμένα χωράφια αναζητώντας σκουλήκια και έντομα. Τα πτηνά αυτά έχουν απίστευτη δύναμη και ως εκ τούτου είναι σε θέση να σηκώνουν ακόμα και μεγάλου βάρους θηράματα.	Δασικές εκτάσεις	Μάρτιος - Ιούνιος	*	*	*						*		
<i>Calandrella brachydactyla</i>	Τρασηλούδα		II				I	LC/NE		Προτιμά καλλιεργήσιμες εκτάσεις και ξηρούς βοσκότοπους με κοντούς θάμνους. Συνηθίζεται σε ξηρές ανοιχτές εκτάσεις και	Αγροτικές εκτάσεις	Μάρτιος - Ιούνιος	*	*	*								

Επιστημονική ονομασία	Κοινή ονομασία	ΠΔ 67/1981	Βέρνη	Βόνη	Σύμβαση της Βαρκελώνης	Οδηγία 92/43/ΕΟΚ	Οδηγία 2009/147/ΕΟΚ	IUCN/Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων ζώων της Ελλάδας	CITES	Οικολογία	Παρουσία εντός της Περιοχής Μελέτης	Ευαίσθητη Οικολογική Περίοδος	Περιοχές έργου											
													Πελοπόννησος (Χερσαίο Τμήμα)	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Χερσαία Ζώνη)	Κρήτη (Χερσαίο Τμήμα)	Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)	Νότιο Κρητικό Πέλαγος	Νότιο Αιγαίο Πέλαγος	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια Ζώνη & LF5)	Πατραϊκός Κόλπος		
										καλλιέργειες. Φωλιάζει στο έδαφος και γεννά δύο έως τρία αυγά. Τρέφεται με σπόρους και έντομα, τα τελευταία ιδιαίτερα την περίοδο της αναπαραγωγής.														
<i>Caprimulgus europaeus</i>	Γιδοβύζι						I	LC/LC		Όψιμο μεταναστευτικό είδος, που εμφανίζεται σπάνια πριν από τα τέλη Απριλίου ή τις αρχές Μαΐου. Εμφανίζεται σε όλη τη βόρεια και κεντρική Ευρώπη και διαχειμάζει στην Αφρική, νότια ως το Ακρωτήρι. Αναζητεί το θήραμά του σε εκτάσεις από ρείκια, πεδινές εκτάσεις, πλαγιές καλυμμένες από πέτρες και ανοιχτά δάση.	Λιβάδια	Μάρτιος - Ιούνιος	*	*	*									
<i>Carduelis carduelis</i>	Καρδερίνα		II					LC/NE		Αναπαράγεται σε χαμηλά φυλλοβόλα και μικτά δάση, σε πευκώνες και σε οπωρώνες και κήπους. Συχνά εμφανίζεται σε κοπάδια μετά την αναπαραγωγή. Τρέφεται συχνά με σπόρους αγριαγκινάρας, κολλιτσίδες κ.λπ. Φωλιάζει στα δέντρα, συχνά ανάμεσα στα λεπτότερα εξωτερικά κλαδιά.	Δασικές εκτάσεις	Μάρτιος - Ιούνιος	*	*	*									
<i>Cecropis daurica</i>	Μιλοτοχελίδονο		II					LC/NE		Αναπαράγεται σε γκρεμούς σε ορεινές εκτάσεις και κατά μήκος απότομων ακτών, μερικές φορές και σε κοιλότητες σε ερείπια, κάτω από γέφυρες κ.λπ. Μεταναστευτικό είδος που διαχειμάζει στην τροπική Αφρική. Κατασκευάζει μια κλειστή φωλιά από λάσπη με μια σήραγγα στην είσοδο, στερεωμένη στην οροφή σπηλαίων, σε εσοχές ή σε παρόμοια σημεία. Συχνά κυνηγά έντομα σε απομακρυσμένες ορεινές περιοχές.	Το είδος απαντάται σε ολόκληρη την παραθαλάσσια περιοχή μελέτης κατά τη μετανάστευση του.	Μάρτιος - Ιούνιος	*	*	*						*			
<i>Cercotrichas galactotes</i>	Κουφαηδόνι		II					LC/NE		ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΟ: Αναπαράγεται σε ξηρές, ανοιχτές εκτάσεις με πυκνούς θάμνους, φράκτες, οπωρώνες. Λατρεύει τα αλμυρίκια, τους κάκτους φραγκοσουκιάς, τις φιστικιές και συχνάζει κοντά στα σπίτια των ανθρώπων. Θερινός επισκέπτης, τους χειμώνες απαντάται στη Νότια Αφρική.	Φράκτες, θάμνοι, περιβόλια	Μάρτιος - Ιούνιος	*	*	*									

Επιστημονική ονομασία	Κοινή ονομασία	ΠΔ 67/1981	Βέρνη	Βόννη	Σύμβαση της Βαρκελώνης	Οδηγία 92/43/ΕΟΚ	Οδηγία 2009/147/ΕΟΚ	IUCN/Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων ζώων της Ελλάδας	CITES	Οικολογία	Παρουσία εντός της Περιοχής Μελέτης	Ευαίσθητη Οικολογική Περίοδος	Περιοχές έργου										
													Πελοπόννησος (Χερσαίο Τμήμα)	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Χερσαία Ζώνη)	Κρήτη (Χερσαίο Τμήμα)	Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)	Νότιο Κρητικό Πέλαγος	Νότιο Αιγαίο Πέλαγος	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια Ζώνη & LF5)	Πατραϊκός Κόλπος	
<i>Certhia brachydactyla</i>	Καμποδεντροβάτ ης		II					LC/NE		Αναπαράγεται σε εύκρατα δάση σε όλη την Ευρώπη από την Πορτογαλία μέχρι την Τουρκία και την Ελλάδα και στη βορειοδυτική Αφρική. Προτιμά τα μεγάλα δέντρα, ιδιαίτερα τη βελανιδιά και αποφεύγει τις καθαρές συστάδες κωνοφόρων. Στα μέρη της Ευρώπης όπου απαντάται με τον βουνοδεντροβάτη, το τελευταίο είδος τείνει να απαντάται κυρίως σε δάση κωνοφόρων και σε μεγαλύτερα υψόμετρα. Απαντάται συνήθως στα πεδινά, αλλά αναπαράγεται τοπικά σε ισόθερμες θερμοκρασίες μεταξύ 17–18 °C και 26 °C.	Δασικές εκτάσεις	Μάρτιος - Ιούνιος	*	*	*								
<i>Certhia familiaris</i>	Βουνοδεντροβάτ ης							LC/NE		Απαντάται συνήθως σε δάση κωνοφόρων ή σε μεγαλύτερα υψόμετρα. Φωλιάζει σε σχισμές δέντρων ή πίσω από φλοιούς κορμών. Είναι μη μεταναστευτικό είδος που απαντάται στα ηπιότερα δυτικά και νότια της περιοχής αναπαραγωγής του, αλλά μερικά βόρεια πτηνά μετακινούνται νότια τον χειμώνα και τα άτομα που αναπαράγονται στα βουνά μπορεί να κατέβουν σε χαμηλότερο υψόμετρο τον χειμώνα.	Δάση κωνοφόρων	Μάρτιος - Ιούνιος		*									
<i>Cettia cetti</i>	Ψευταηδόνι							LC/NE		Αναπαράγεται σε πυκνή, μάλλον ψηλή και συχνά καλά οριοθετημένη βλάστηση, κατά προτίμηση κοντά αλλά όχι μέσα στο νερό, π.χ. σε πιο στεγνά ψηλά καλάμια με διάσπαρτους θάμνους, διάφορους χοντρούς θάμνους κ.λπ. Μερικές φορές αναπαράγεται κοντά στα σπίτια των ανθρώπων, σε πυκνά δασώδη πάρκα, δίπλα σε δεξαμενές και κανάλια κ.λπ. Κυρίως μη-αποδημητικό είδος, αλλά και μεταναστευτικό. Παραμένει συνήθως κρυμμένο μέσα στη βλάστηση, ενώ συχνά κρύβεται μέσα στο έδαφος ή χαμηλά σε θάμνους. Φωλιάζει χαμηλά σε πυκνή βλάστηση.	Θάμνοι	Μάρτιος - Ιούνιος	*	*	*								
<i>Charadrius alexandrinus</i>	Θαλασσοσφυριχτ ής		II	II			I	LC/LC		Αυτό το είδος αναπαράγεται σε αμμώδεις ακτές και υφάλμυρες λίμνες της ενδοχώρας και δεν συνηθίζεται σε γλυκό νερό. Φωλιάζει στο έδαφος.	Λίμνες	Μάρτιος έως Οκτώβριος	*	*									

Επιστημονική ονομασία	Κοινή ονομασία	ΠΑ 67/1981	Βέρνη	Βόννη	Σύμβαση της Βαρκελώνης	Οδηγία 92/43/ΕΟΚ	Οδηγία 2009/147/ΕΟΚ	IUCN/Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων ζώων της Ελλάδας	CITES	Οικολογία	Παρουσία εντός της Περιοχής Μελέτης	Ευαίσθητη Οικολογική Περίοδος	Περιοχές έργου											
													Πελοπόννησος (Χερσαίο Τμήμα)	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Χερσαία Ζώνη)	Κρήτη (Χερσαίο Τμήμα)	Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)	Νότιο Κρητικό Πέλαγος	Νότιο Αιγαίο Πέλαγος	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια Ζώνη & LF5)	Πατραϊκός Κόλπος		
										Τρέφεται με έντομα και άλλα ασπόνδυλα, τα οποία αιχμαλωτίζει με μια τεχνική τρεξίματος και παύσης.														
Charadrius dubius	Ποταμοσφυριχτή ς		II	II				LC/NE		Αποδημητικό Αναπαράγεται σε γυμνά, συνήθως αμμώδη ή χαλικώδη εδάφη κοντά σε γλυκό νερό, π.χ. άκρες ποταμών ή λιμνών ή νησιών, συχνά σε ανθρωπογενείς τοποθεσίες όπως περιοχές εξόρυξης αμμοχάλικου, δεξαμενές ή αλυκές. Ο ευρωπαϊκός πληθυσμός μεταναστεύει στην έρημο Σαχάρα από τα τέλη Ιουλίου έως τις αρχές Σεπτεμβρίου (εγκαταλείποντας τις περιοχές αναπαραγωγής τον Ιούνιο έως τα μέσα Ιουλίου) για να εγκατασταθεί στις περιοχές διαχείμασής του στην τροπική Αφρική από τα τέλη Αυγούστου και μετά. Αυτοί οι πληθυσμοί επιστρέφουν στις περιοχές αναπαραγωγής τους από τα μέσα Μαρτίου, όπου αναπαράγονται από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο (Ευρώπη) (Wiersma et al. 2013)	Λίμνες, ποτάμια	Μάρτιος – Οκτώβριος	*	*										
Chloris chloris	Φλώρος							NE/NE		Αυτό το πουλί είναι διαδεδομένο σε όλη την Ευρώπη, τη βόρεια Αφρική και τη νοτιοδυτική Ασία. Εντοπίζεται στα όρια των δασών, σε φράκτες γεωργικών εκτάσεων και σε κήπους με σχετικά πυκνή βλάστηση που προτιμά για να αναπαραχθεί. Φωλιάζει σε δέντρα ή θάμνους και γεννά 3-8 αυγά. Κυρίως μόνιμοι κάτοικοι, αλλά ορισμένοι βορειότεροι πληθυσμοί μεταναστεύουν νοτιότερα.	Δασικές εκτάσεις	Μάρτιος - Ιούνιος	*	*	*									
Ciconia ciconia	Λευκός πελαργός		II	II			I	LC/VU		ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΟ: Ο λευκός πελαργός είναι ένας μετανάστης μεγάλων αποστάσεων, που διαχειμάζει στην Αφρική από την τροπική Υποσαχάρια Αφρική μέχρι νότια ως τη Νότια Αφρική ή στην ινδική υποήπειρο. Αναχωρεί κυρίως από τις ευρωπαϊκές περιοχές αναπαραγωγής του τον Αύγουστο και ταξιδεύει σε μεγάλα σμήνη, και φτάνει στην	Το είδος μπορεί να απαντηθεί σε ολόκληρη την περιοχή μελέτης κατά τη μετανάστευση του. Μπορεί επίσης να αναζητά την τροφή του στην	Μάρτιος – Οκτώβριος							*	*	*	*	*	

Επιστημονική ονομασία	Κοινή ονομασία	ΠΔ 67/1981	Βέρνη	Βόωνη	Σύμβαση της Βαρκελώνης	Οδηγία 92/43/ΕΟΚ	Οδηγία 2009/147/ΕΟΚ	IUCN/Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων ζώων της Ελλάδας	CITES	Οικολογία	Παρουσία εντός της Περιοχής Μελέτης	Ευαίσθητη Οικολογική Περίοδος	Περιοχές έργου										
													Πελοπόννησος (Χερσαίο Τμήμα)	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Χερσαία Ζώνη)	Κρήτη (Χερσαίο Τμήμα)	Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)	Νότιο Κρητικό Πέλαγος	Νότιο Αιγαίο Πέλαγος	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια Ζώνη & LF5)	Πατραϊκός Κόλπος	
										Αφρική στις αρχές Οκτωβρίου. Κατά τη μετανάστευσή του, αποφεύγει να διασχίσει τη Μεσόγειο Θάλασσα και την παρακάμπτη μέσω του Λεβάντε στα ανατολικά ή του στενού του Γιβραλτάρ στα δυτικά, επειδή τα θερμικά αέρια από τα οποία εξαρτάται δεν σχηματίζονται πάνω από το νερό. Το είδος είναι σαρκοφάγο και έχει ποικίλη και ευκαιριακή διατροφή. Τρέφεται με μικρά θηλαστικά, μεγάλα έντομα, ενήλικα και ανήλικα αμφίβια, φίδια, σαύρες, γαιοσκώληκες, αυγά ψαριών και νεοσσούς που φωλιάζουν στο έδαφος, μαλάκια και καρκινοειδή. Κατασκευάζει τη φωλιά του με ραβδιά και συνήθως την τοποθετεί έως και 30 μέτρα πάνω από το έδαφος σε δέντρα ή σε στέγες κτιρίων, καθώς και σε πυλώνες, τηλεγραφικούς στύλους, στοίβες από άχυρο και σε άλλες ανθρωπογενείς τοποθεσίες, γκρεμούς και περιστασιακά ανάμεσα σε καλάμια στο έδαφος.	παραλία, αν και θεωρείται πολύ απίθανο. Το πτηνό μπορεί να απαντηθεί πάνω από ένα τμήμα της θαλάσσιας περιοχής μελέτης στο Νότιο Αιγαίο και τον Πατραϊκό Κόλπο.												
Cinclus cinclus	Νεροκότσουφας		II							Ο Νεροκότσουφας συνδέεται με ποτάμια με τρεχούμενα νερά και ρυάκια ή στις λίμνες στις οποίες καταλήγουν. Συχνά σκαφαλώνει σπασμωδικά με τη κοντή ουρά του σηκωμένη σε βράχια όπου υπάρχει νερό. Οι χειμερινές συνήθειές του ποικίλλουν σημαντικά ανάλογα με το άτομο. Όταν τα ρυάκια στους λόφους παγώνουν, αναγκάζεται να κατέβει στα πεδινά, ακόμη και να επισκεφτεί τις ακτές, ωστόσο κάποια πτηνά θα παραμείνουν εκεί εάν υπάρχουν ύδατα. Η φωλιά του αποτελείται από βρύα, ξερό γρασίδι και φύλλα. Η σφαιρική αυτή κατασκευή αποτελεί, ωστόσο, απλώς ένα καταφύγιο. Συνήθως κρύβεται κάτω από μια προεξοχή, στην είσοδο της πραγματικής φωλιάς, μέσα στο γρασίδι ή σε φασκομηλιές, η οποία είναι σχεδόν τόσο μεγάλη όσο η φωλιά ενός κότσουφα και είναι επενδεδυμένη με φύλλα βελανιδιάς, οξιάς ή άλλων δέντρων.	Μάρτιος - Ιούνιος	*	*										

Επιστημονική ονομασία	Κοινή ονομασία	ΠΑ 67/1981	Βέρνη	Βόννη	Σύμβαση της Βαρκελώνης	Οδηγία 92/43/ΕΟΚ	Οδηγία 2009/147/ΕΟΚ	IUCN/Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων ζώων της Ελλάδας	CITES	Οικολογία	Παρουσία εντός της Περιοχής Μελέτης	Ευαίσθητη Οικολογική Περίοδος	Περιοχές έργου									
													Πελοπόννησος (Χερσαίο Τμήμα)	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Χερσαία Ζώνη)	Κρήτη (Χερσαίο Τμήμα)	Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)	Νότιο Κρητικό Πέλαγος	Νότιο Αιγαίο Πέλαγος	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια Ζώνη & LF5)	Πατραϊκός Κόλπος
Circaetus gallicus	Φιδαετός			II			I	LC/NT	II	ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΟ: Είναι διαδεδομένο είδος σε όλη τη λεκάνη της Μεσογείου και στη Ρωσία και τη Μέση Ανατολή καθώς και σε μέρη της Ασίας, κυρίως στην Ινδική υποήπειρο και επίσης ανατολικότερα σε ορισμένα νησιά της Ινδονησίας. Απαντάται σε ανοικτές καλλιεργήσιμες πεδιάδες, άνυδρες πετρώδεις φυλλοβόλες θαμνώδεις περιοχές και στους πρόποδες βουνών και σε ημιορεινικές περιοχές. Φτιάχνει τη φωλιά του στα δέντρα.	Το είδος μπορεί να απαντηθεί σε ολόκληρη την περιοχή μελέτης κατά τη μετανάστευση του. Μπορεί επίσης να αναζητά την τροφή του στην παραλία, αν και θεωρείται πολύ απίθανο. Το πτηνό μπορεί να απαντηθεί πάνω από ένα τμήμα της θαλάσσιας περιοχής μελέτης στο Νότιο Αιγαίο και τον Πατραϊκό Κόλπο.	Μάρτιος - Ιούνιος	*	*	*				*	*	*	*
Circus aeruginosus	Καλαμόκιρκος			II			I	LC/VU	II	ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΟ: Αναπαράγεται σε ρηχές λίμνες ή ποτάμια γλυκού νερού. Εκτός από το ότι μεταναστεύει στα νότια και στα δυτικά, διαχειμάζει στην Αφρική. Μικρός πληθυσμός απαντάται στην Α. Βρετανία. Τρέφεται με μικρά θηλαστικά, πουλιά, έντομα. Φωλιάζει σε ψηλούς καλαμιώνες.	Το είδος μπορεί να απαντηθεί σε ολόκληρη την περιοχή μελέτης κατά τη μετανάστευση του. Μπορεί επίσης να αναζητά την τροφή του στην παραλία, αν και θεωρείται πολύ απίθανο. Το πτηνό μπορεί να απαντηθεί πάνω από ένα τμήμα της θαλάσσιας περιοχής μελέτης στο Νότιο Αιγαίο και τον Πατραϊκό Κόλπο.	Μάρτιος - Ιούνιος	*	*				*	*		*	*

Επιστημονική ονομασία	Κοινή ονομασία	ΠΔ 67/1981	Βέρνη	Βόννη	Σύμβαση της Βαρκελώνης	Οδηγία 92/43/ΕΟΚ	Οδηγία 2009/147/ΕΟΚ	IUCN/Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων ζώων της Ελλάδας	CITES	Οικολογία	Παρουσία εντός της Περιοχής Μελέτης	Ευαίσθητη Οικολογική Περίοδος	Περιοχές έργου									
													Πελοπόννησος (Χερσαίο Τμήμα)	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Χερσαία Ζώνη)	Κρήτη (Χερσαίο Τμήμα)	Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)	Νότιο Κρητικό Πέλαγος	Νότιο Αιγαίο Πέλαγος	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια Ζώνη & LF5)	Πατραϊκός Κόλπος
<i>Cisticola juncidis</i>	Κιστικόλη							LC/NE		Αναπαράγεται σε ανοιχτές πεδινές εκτάσεις με θερμά κλίματα, σε ψηλό γρασίδι ή σε χωράφια. Προτιμά το πιο ξηρό έδαφος και αποφεύγει τα δέντρα. Μόνιμο είδος. Φωλιάζει σε χαμηλή βλάστηση.	Λιβάδια	Μάρτιος - Ιούνιος	*	*	*							
<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	Κοκκοθραύστης		II					LC/NE		Αναπαράγεται σε δάση φυλλοβόλων και μικτά δάση, όμως προτιμά τα δάση με ώριμα ψηλά φυλλοβόλα δέντρα όπου αφθονούν η βελανιδιά, ο γαύρο, η οξιά, ο φράξινος και η φτελιά. Προσελκύεται επίσης από τα οπωροφόρα δέντρα, ειδικά τις κερασιές, τους πυρήνες των οποίων σπάει με το δυνατό του ράμφος (μπορεί να ασκήσει δύναμη πάνω από 50 κιλά!). Η διατροφή του περιλαμβάνει επίσης έντομα. Πολύ επιφυλακτικό και ντροπαλό. Συχνάζει επάνω σε φυλλωσιές ή του αρέσει να πετάει γρήγορα ψηλά μέσα στα δάση. Συνήθως φωλιάζει σε φυλλοβόλα δέντρα, πάνω στον κορμό ή στις διχάλες που σχηματίζουν τα κλαδιά, σε αρκετά εκτεθειμένες τοποθεσίες.	Δάση φυλλοβόλων και μικτά δάση.	Μάρτιος - Ιούνιος	*	*								
<i>Columba livia</i>	Περιστέρι						II	LC/NE		Οι οικότοποι περιλαμβάνουν διάφορα ανοιχτά και ημιανοιχτά ενδιαιτήματα. Χρησιμοποιεί τα βράχια και τις προεξοχές των βράχων για να κουρνιάσει και αναπαράγεται στην άγρια φύση. Αρχικά βρέθηκε στην άγρια μορφή του στην Ευρώπη, τη Βόρεια Αφρική και τη δυτική Ασία, όμως έχει εγκατασταθεί μέσα σε πόλεις σε όλο τον κόσμο. Το είδος είναι άφθονο, με εκτιμώμενο πληθυσμό από 17 έως 28 εκατομμύρια άγρια πτηνά στην Ευρώπη.	Το είδος μπορεί να απαντηθεί σε ολόκληρη την Περιοχή Μελέτης. Το πτηνό μπορεί να απαντηθεί και πάνω από ένα τμήμα της θαλάσσιας περιοχής μελέτης στο Νότιο Κρητικό Πέλαγος.	Μάρτιος - Ιούνιος	*	*	*		*					

Παράρτημα 8Θ- Μελέτη Βάσης για την Ορνιθοπανίδα

Επιστημονική ονομασία	Κοινή ονομασία	ΠΔ 67/1981	Βέρνη	Βόννη	Σύμβαση της Βαρκελώνης	Οδηγία 92/43/ΕΟΚ	Οδηγία 2009/147/ΕΟΚ	IUCN/Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων ζώων της Ελλάδας	CITES	Οικολογία	Παρουσία εντός της Περιοχής Μελέτης	Ευαίσθητη Οικολογική Περίοδος	Περιοχές έργου											
													Πελοπόννησος (Χερσαίο Τμήμα)	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Χερσαία Ζώνη)	Κρήτη (Χερσαίο Τμήμα)	Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)	Νότιο Κρητικό Πέλαγος	Νότιο Αιγαίο Πέλαγος	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια Ζώνη & LF5)	Πατραϊκός Κόλπος		
<i>Columba palumbus</i>	Φάσσα		III				II	LC/NE		Μεγάλο είδος στην οικογένεια των περιστεριών. Ανήκει στο γένος Columba και, όπως όλα τα περιστέρια, ανήκει στην οικογένεια των Columbidae. Απαντάται συνήθως στη νοτιοανατολική Αγγλία. Αναπαράγεται σε δέντρα σε δάση, πάρκα και κήπους και γεννά δύο λευκά αυγά σε μια απλή φωλιά από κλαδιά, και τα αυγά του εκκολάπτονται μετά από 17 έως 19 ημέρες. Οι φάσσες φαίνεται να προτιμούν τα δέντρα κοντά σε δρόμους και ποτάμια. Οι φωλιές τους είναι ευάλωτες στις επιθέσεις, ιδιαίτερα από κοράκια, και ιδιαίτερα στις αρχές κάθε έτους που δεν την έχουν ακόμη προστατεύσει πλήρως από φύλλα.	Δασικές εκτάσεις	Μάρτιος - Ιούνιος	*	*	*									
<i>Corvus corax</i>	Κοράκι							LC/NE		Το Κοράκι (Corvus corax), γνωστό και ως κόρακας, είναι ένα μεγάλο, ολόμαυρο στρουθιόμορφο πουλί. Απαντάται σε όλο το βόρειο ημισφαίριο και είναι η πιο διαδεδομένη από όλες τις κορακίδες. Το κοράκι συνυπάρχει με τον άνθρωπο για χιλιάδες χρόνια και σε ορισμένες περιοχές ήταν τόσο πολυπληθές που θεωρείται παράσιτο. Μέρος της αντοχής του οφείλεται στο γεγονός ότι είναι παμφάγο. Τα κοινά κοράκια είναι εξαιρετικά ευέλικτα και ευκαιριακά στην αναζήτηση τροφής, ενώ τρέφονται με πτώματα, έντομα, δημητριακά, μούρα, φρούτα, μικρά ζώα και υπολείμματα τροφών. Τα κοράκια μπορούν να ευδοκιμήσουν σε ποικίλα κλίματα. Αυτό το είδος έχει τη μεγαλύτερη εμβέλεια από οποιοδήποτε άλλο μέλος του γένους του και ένα από τα μεγαλύτερα από οποιοδήποτε άλλο στρουθιόμορφο είδος. Τα περισσότερα κοράκια προτιμούν τις δασώδεις περιοχές, που γειτνιάζουν με μεγάλες ανοικτές εκτάσεις, ή παράκτιες περιοχές στις οποίες δημιουργούν τη φωλιά τους και αναζητούν την τροφή τους.	Εμφανίζεται στην περιοχή μελέτης. Το πτηνό μπορεί να απαντηθεί και πάνω από ένα τμήμα της θαλάσσιας περιοχής μελέτης στο Νότιο Κρητικό Πέλαγος.	Μάρτιος - Ιούνιος	*	*	*		*							
<i>Corvus corone</i>	Μαυροκουρούνα		III				II	LC/NE		Είδη που το συναντάμε παντού. Φωλιάζει γενικά σε απομονωμένα δέντρα, αν και συνήθως είναι πιο κοινωνικό τον χειμώνα.	Εμφανίζεται στην περιοχή μελέτης.	Μάρτιος - Ιούνιος	*	*	*									

Επιστημονική ονομασία	Κοινή ονομασία	ΠΔ 67/1981	Βέρνη	Βόνη	Σύμβαση της Βαρκελώνης	Οδηγία 92/43/ΕΟΚ	Οδηγία 2009/147/ΕΟΚ	IUCN/Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων ζώων της Ελλάδας	CITES	Οικολογία	Παρουσία εντός της Περιοχής Μελέτης	Ευαίσθητη Οικολογική Περίοδος	Περιοχές έργου											
													Πελοπόννησος (Χερσαίο Τμήμα)	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Χερσαία Ζώνη)	Κρήτη (Χερσαίο Τμήμα)	Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)	Νότιο Κρητικό Πέλαγος	Νότιο Αιγαίο Πέλαγος	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια Ζώνη & LF5)	Πατραϊκός Κόλπος		
<i>Corvus monedula</i>	Κάργια		III					LC/NE		Το είδος μπορεί να απαντηθεί παντού. Κατοικεί σε δασώδεις στέπες, βοσκοτόπια, καλλιεργήσιμες εκτάσεις, παράκτιους βράχους και σε πόλεις	Εντοπίζεται στην περιοχή μελέτης.	Μάρτιος - Ιούνιος	*	*	*									
<i>Coturnix coturnix</i>	Ορτύκι			II				LC/NE		Κατοικεί σε λιβάδια και καλλιεργήσιμες εκτάσεις αλλά προτιμά τις περιοχές με πυκνή, ψηλή βλάστηση.	Λιβάδια	Μάρτιος - Ιούνιος	*	*										
<i>Cuculus canorus</i>	Κούκος							LC/NE		Κατοικεί σε δάση και δασικές εκτάσεις	Δασικές εκτάσεις	Μάρτιος - Ιούνιος	*	*										
<i>Cyanistes caeruleus</i>	Γαλαζοπαπαδίτσα		II					LC/NE		Η γαλαζοπαπαδίτσα φωλιάζει σε οποιαδήποτε κατάλληλη τρύπα μέσα σε δέντρα, σε τοίχους ή κορμούς ή μέσα σε τεχνητές φωλιές	Εντοπίζεται στην περιοχή μελέτης.	Μάρτιος - Ιούνιος	*	*	*									
<i>Cygnus olor</i>	Βουβόκυκνος			II				LC/LC		Το είδος φωλιάζει μέσα σε μεγάλους σωρούς που χτίζει με παραθαλάσσια βλάστηση σε ρηχά νερά σε νησιά, στη μέση ή στις άκρες λιμνών. Είναι μονογαμικό και επαναχρησιμοποιεί συχνά την ίδια φωλιά κάθε χρόνο, αποκαθιστώντας ή ανακατασκευάζοντάς την ανάλογα με τις ανάγκες. Οι αρσενικοί και οι θηλυκοί κύκνοι φροντίζουν μαζί τη φωλιά, και μόλις οι μικροί κύκνοι αρχίσουν να πετούν, δεν είναι ασυνήθιστο ολόκληρη η οικογένεια να αναζητά τροφή. Τρέφονται με διάφορα είδη βλάστησης, τόσο με υδρόβια φυτά που βρίσκουν μέσα στο νερό τα οποία φτάνουν με τον μακρύ λαιμό τους όσο και στη στεριά.	Λίμνες	Μάρτιος - Ιούνιος		*										
<i>Delichon urbicum</i>	Λευκοχελίδονο		II					LC/NE		ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΟ. Προτιμά τα δάση, τις σαβάννες, τα λιβάδια, τις βραχώδεις περιοχές (π.χ. βράχια στην ενδοχώρα, κορυφές βουνών), τεχνητές/χερσαίες εκτάσεις.	Το είδος απαντάται σε ολόκληρη την περιοχή μελέτης κατά τη μετανάστευση του.	Μάρτιος - Ιούνιος	*	*	*						*			
<i>Dendrocopos leucotos</i>	Λευκονώτης						I	LC/NT		Στην αναπαραγωγική περίοδο, φτιάχνει τη φωλιά του μέσα σε τρύπες πλάτους περίπου 7 εκατοστών και βάθους 30 εκατοστών σε	Δάση	Μάρτιος - Ιούνιος	*	*										

Επιστημονική ονομασία	Κοινή ονομασία	ΠΔ 67/1981	Βέρνη	Βόνη	Σύμβαση της Βαρκελώνης	Οδηγία 92/43/ΕΟΚ	Οδηγία 2009/147/ΕΟΚ	IUCN/Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων ζώων της Ελλάδας	CITES	Οικολογία	Παρουσία εντός της Περιοχής Μελέτης	Ευαίσθητη Οικολογική Περίοδος	Περιοχές έργου									
													Πελοπόννησος (Χερσαίο Τμήμα)	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Χερσαία Ζώνη)	Κρήτη (Χερσαίο Τμήμα)	Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)	Νότιο Κρητικό Πέλαγος	Νότιο Αιγαίο Πέλαγος	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια Ζώνη & LF5)	Πατραϊκός Κόλπος
										κορμούς δέντρων που βρίσκονται σε αποσύνθεση. Γεννά τρία έως πέντε λευκά αυγά τα οποία επωάζονται για 10-11 ημέρες. Τρέφεται κυρίως με σκαθάρια που βρίσκει στα δέντρα, καθώς και με τις προνύμφες τους και άλλα έντομα, με ξηρούς καρπούς, σπόρους και μούρα.												
<i>Dendrocopos major</i>	Πευκοδρυοκολάπτης								LC/NE	Τρέφεται κυρίως με σκαθάρια που βρίσκει στα δέντρα, καθώς και με τις προνύμφες τους και άλλα έντομα, με ξηρούς καρπούς, σπόρους και μούρα.	Δάση	Μάρτιος - Ιούνιος	*									
<i>Dendrocopos syriacus</i>	Βαλκανοτσικλητάρρα						I		LC/NE	Αναπαράγεται σε ανοιχτές, καλλιεργούμενες εκτάσεις, σε περιβόλια, κήπους, πάρκα, δενδροστοιχίες, αμπέλια κ.λπ.	Λιβάδια	Μάρτιος - Ιούνιος										
<i>Dryobates minor</i>	Μικρή τσικλιτάρρα								LC/NE	Όταν κυνηγάει προνύμφες από σαράκια, κόβει το σάπιο ξύλο και τα θραύσματα στη βάση των δέντρων αποτελούν συχνά την πρώτη ένδειξη ότι τα έντομα επιτίθενται στα ανώτερα κλαδιά. Από το φθινόπωρο μέχρι την άνοιξη κυνηγάει κυρίως τις προνύμφες εντόμων που ζουν στα δέντρα, συνήθως στα λεπτά νεκρά κλαδιά πάνω σε ζωντανά δέντρα. Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγικής περιόδου, τρέφεται συχνά με τα επιφανειακά έντομα που βρίσκει στο φύλλωμα και τον φλοιό των δέντρων. Οι νεοσσοί τρέφονται κυρίως με επιφανειακά έντομα, όπως αφιδοειδή και προνύμφες εντόμων. Τη νύχτα κουρνιάζει μέσα σε παλιές τρύπες.	Δάση	Μάρτιος - Ιούνιος	*									
<i>Dryocopus martius</i>	Μαύρος δρυοκολάπτης						I		LC/LC	Φωλιάζει μέσα σε ώριμα δάση, συχνά σε πευκοδάση και μικτά δάση, αλλά και σε οξιές. Το εύρος εξάπλωσής του φτάνει έως τη ΒΔ Ευρώπη. Επιφυλακτικό αλλά και διερευνητικό, μπορεί να ανταποκριθεί σε κάποιον που μιμείται τη φωνή του.	Όριμα δάση	Μάρτιος - Ιούνιος	*									
<i>Egretta garzetta</i>	Λευκοτσικνιάς		II				I		LC/VU	ΦΩΛΙΑΖΕΙ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΣΕ ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ: Η αναπαραγωγική του εξάπλωση είναι σε υγροτόπους που βρίσκονται σε θερμά εύκρατα έως τροπικά μέρη της Ευρώπης, της	Το είδος απαντάται σε ολόκληρη την Περιοχή Μελέτης.	Μάρτιος - Ιούνιος	*	*			*	*	*	*	*	

Επιστημονική ονομασία	Κοινή ονομασία	ΠΔ 67/1981	Βέρνη	Βόνη	Σύμβαση της Βαρκελώνης	Οδηγία 92/43/ΕΟΚ	Οδηγία 2009/147/ΕΟΚ	IUCN/Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων ζώων της Ελλάδας	CITES	Οικολογία	Παρουσία εντός της Περιοχής Μελέτης	Ευαίσθητη Οικολογική Περίοδος	Περιοχές έργου									
													Πελοπόννησος (Χερσαίο Τμήμα)	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Χερσαία Ζώνη)	Κρήτη (Χερσαίο Τμήμα)	Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)	Νότιο Κρητικό Πέλαγος	Νότιο Αιγαίο Πέλαγος	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια Ζώνη & LF5)	Πατραϊκός Κόλπος
										Αφρικής, της Ασίας και της Αυστραλίας. Σε θερμότερες τοποθεσίες, τα περισσότερα πουλιά είναι μόνιμοι κάτοικοι. Οι βόρειοι πληθυσμοί, συμπεριλαμβανομένων πολλών ευρωπαϊκών πτηνών, μεταναστεύουν στην Αφρική και τη νότια Ασία. Μπορεί επίσης να να περιπλανώνται βόρεια στα τέλη του καλοκαιριού μετά την περίοδο αναπαραγωγής, το οποίο μπορεί να έχει συμβάλει στην εξάπλωση της εμβέλειάς του. Τα πτηνά φωλιάζουν σε αποικίες, συχνά με άλλα πουλιά, συνήθως σε πλατφόρμες από κλαδιά σε δέντρα ή θάμνους ή σε καλαμιώνες ή μέσα σε άλση από μπαμπού. Τρώνε ψάρια, έντομα, αμφίβια, καρκινοειδή και ερπετά. Καταδιώκουν το θήραμά τους σε ρηχά νερά, τρέχοντας συχνά με ανασηκωμένα φτερά ή πλατσουρίζοντας τα πόδια τους για να ταράξουν τα μικρά ψάρια. Μπορεί επίσης να στέκονται ακίνητα περιμένοντας να στήσουν ενέδρα στο θήραμα.	Μπορεί επίσης να αναζητήσει την τροφή του στην ακτογραμμή. Το πτηνό μπορεί να απαντηθεί και πάνω από ένα τμήμα της θαλάσσιας περιοχής μελέτης.											
<i>Emberiza caesia</i>	Φρυγανοτσίχλονο		II				I	LC/LC		ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΟ: Αναπαράγεται σε απότομους παράκτιους βράχους ή σε βουνά, καθώς και σε γκρεμούς σε πεδινές εκτάσεις και στο έδαφος σε ανοιχτούς βάλτους στην тайγκα. Μεταναστεύει βόρεια και ανατολικά. Τρέφεται με μικρού ή μεσαίου μεγέθους πτηνά, τα οποία πιάνει στον αέρα μετά από γρήγορη οριζόντια καταδίωξη ή πέφτοντας από ύψος με κλειστά φτερά. Φωλιάζει σε γκρεμούς, σπάνια σε παλιές φωλιές σε δέντρα ή (ιδίως στη βορειοανατολική тайγκα) στο έδαφος.	Το είδος μπορεί να απαντηθεί σε ολόκληρη την παραθαλάσσια περιοχή μελέτης κατά τη μετανάστευση του. Μπορεί επίσης να αναζητά την τροφή του στην παραλία, αν και θεωρείται πολύ απίθανο.	Μάρτιος - Ιούνιος	*	*				*				
<i>Emberiza calandra</i>	Τσιφτάς							LC/NE		ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΟ: Αναπαράγεται σε απότομους παράκτιους βράχους ή σε βουνά, καθώς και σε γκρεμούς σε πεδινές εκτάσεις και στο έδαφος σε ανοιχτούς βάλτους στην тайγκα. Μεταναστεύει βόρεια και ανατολικά. Τρέφεται με μικρού ή μεσαίου μεγέθους πτηνά, τα οποία πιάνει στον αέρα μετά από γρήγορη οριζόντια καταδίωξη ή	Το είδος μπορεί να απαντηθεί σε ολόκληρη την παραθαλάσσια περιοχή μελέτης κατά τη μετανάστευση του.	Μάρτιος - Ιούνιος	*	*	*							

Επιστημονική ονομασία	Κοινή ονομασία	ΠΑ 67/1981	Βέρνη	Βόννη	Σύμβαση της Βαρκελώνης	Οδηγία 92/43/ΕΟΚ	Οδηγία 2009/147/ΕΟΚ	IUCN/Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων ζώων της Ελλάδας	CITES	Οικολογία	Παρουσία εντός της Περιοχής Μελέτης	Ευαίσθητη Οικολογική Περίοδος	Περιοχές έργου									
													Πελοπόννησος (Χερσαίο Τμήμα)	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Χερσαία Ζώνη)	Κρήτη (Χερσαίο Τμήμα)	Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)	Νότιο Κρητικό Πέλαγος	Νότιο Αιγαίο Πέλαγος	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια Ζώνη & LF5)	Πατραϊκός Κόλπος
										πέφτοντας από ύψος με κλειστά φτερά. Φωλιάζει σε γκρεμούς, σπάνια σε παλιές φωλιές σε δέντρα ή (ιδίως στη βορειοανατολική τάιγκα) στο έδαφος.												
Emberiza cia	Βουνοτσιχλονο		II					LC/NE		ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΟ: Αναπαράγεται σε απότομους παράκτιους βράχους ή σε βουνά, καθώς και σε γκρεμούς σε πεδινές εκτάσεις και στο έδαφος σε ανοιχτούς βάλτους στην τάιγκα. Μεταναστεύει βόρεια και ανατολικά. Τρέφεται με μικρού ή μεσαίου μεγέθους πτηνά, τα οποία πιάνει στον αέρα μετά από γρήγορη οριζόντια καταδίωξη ή πέφτοντας από ύψος με κλειστά φτερά. Φωλιάζει σε γκρεμούς, σπάνια σε παλιές φωλιές σε δέντρα ή (ιδίως στη βορειοανατολική τάιγκα) στο έδαφος.	Το είδος μπορεί να απαντηθεί σε ολόκληρη την παραθαλάσσια περιοχή μελέτης κατά τη μετανάστευση του.	Μάρτιος - Ιούνιος	*	*	*							
Emberiza cirlus	Σιρλοτσιχλονο		II					LC/NE		ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΟ: Αναπαράγεται σε απότομους παράκτιους βράχους ή σε βουνά, καθώς και σε γκρεμούς σε πεδινές εκτάσεις και στο έδαφος σε ανοιχτούς βάλτους στην τάιγκα. Μεταναστεύει βόρεια και ανατολικά. Τρέφεται με μικρού ή μεσαίου μεγέθους πτηνά, τα οποία πιάνει στον αέρα μετά από γρήγορη οριζόντια καταδίωξη ή πέφτοντας από ύψος με κλειστά φτερά. Φωλιάζει σε γκρεμούς, σπάνια σε παλιές φωλιές σε δέντρα ή (ιδίως στη βορειοανατολική τάιγκα) στο έδαφος.	Το είδος μπορεί να απαντηθεί σε ολόκληρη την παραθαλάσσια περιοχή μελέτης κατά τη μετανάστευση του. Μπορεί επίσης να αναζητά την τροφή του στην παραλία, αν και θεωρείται πολύ απίθανο.	Μάρτιος - Ιούνιος	*	*	*							

Επιστημονική ονομασία	Κοινή ονομασία	ΠΔ 67/1981	Βέρνη	Βόννη	Σύμβαση της Βαρκελώνης	Οδηγία 92/43/ΕΟΚ	Οδηγία 2009/147/ΕΟΚ	IUCN/Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων ζώων της Ελλάδας	CITES	Οικολογία	Παρουσία εντός της Περιοχής Μελέτης	Ευαίσθητη Οικολογική Περίοδος	Περιοχές έργου									
													Πελοπόννησος (Χερσαίο Τμήμα)	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Χερσαία Ζώνη)	Κρήτη (Χερσαίο Τμήμα)	Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)	Νότιο Κρητικό Πέλαγος	Νότιο Αιγαίο Πέλαγος	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια Ζώνη & LF5)	Πατραϊκός Κόλπος
Emberiza citrinella	Χρυσοσίχλονο		II					LC/NE		ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΟ: Αναπαράγεται σε απότομους παράκτιους βράχους ή σε βουνά, καθώς και σε γκρεμούς σε πεδινές εκτάσεις και στο έδαφος σε ανοιχτούς βάλτους στην τάιγκα. Μεταναστεύει βόρεια και ανατολικά. Τρέφεται με μικρού ή μεσαίου μεγέθους πτηνά, τα οποία πιάνει στον αέρα μετά από γρήγορη οριζόντια καταδίωξη ή πέφτοντας από ύψος με κλειστά φτερά. Φωλιάζει σε γκρεμούς, σπάνια σε παλιές φωλιές σε δέντρα ή (ιδίως στη βορειοανατολική τάιγκα) στο έδαφος.	Το είδος μπορεί να απαντηθεί σε ολόκληρη την παραθαλάσσια περιοχή μελέτης κατά τη μετανάστευση του.	Μάρτιος - Ιούνιος		*								
Emberiza hortulana	Βλάχος						I	LC/LC		ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΟ: Ιθαγενής των περισσότερων ευρωπαϊκών χωρών και της δυτικής Ασίας, ο βλάχος μεταναστεύει το φθινόπωρο στην τροπική Αφρική και επιστρέφει στα τέλη Απριλίου ή στις αρχές Μαΐου. Η κατανομή του σε όλο το φάσμα αναπαραγωγής του φαίνεται να είναι πολύ τοπική, το οποίο δεν μπορεί να αποδοθεί σε προφανή λόγο. Τοποθετεί τις φωλιές του πάνω ή κοντά στο έδαφος.	Το είδος απαντάται σε ολόκληρη την περιοχή μελέτης κατά τη μετανάστευση του.	Μάρτιος - Ιούνιος	*	*	*						*	
Emberiza melanocephala	Αμπελουργός		II					LC/NE		ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΟ: Αναπαράγεται σε απότομους παράκτιους βράχους ή σε βουνά, καθώς και σε γκρεμούς σε πεδινές εκτάσεις και στο έδαφος σε ανοιχτούς βάλτους στην τάιγκα. Μεταναστεύει βόρεια και ανατολικά. Τρέφεται με μικρού ή μεσαίου μεγέθους πτηνά, τα οποία πιάνει στον αέρα μετά από γρήγορη οριζόντια καταδίωξη ή πέφτοντας από ύψος με κλειστά φτερά. Φωλιάζει σε γκρεμούς, σπάνια σε παλιές φωλιές σε δέντρα ή (ιδίως στη βορειοανατολική τάιγκα) στο έδαφος.	Το είδος μπορεί να απαντηθεί σε ολόκληρη την παραθαλάσσια περιοχή μελέτης κατά τη μετανάστευση του.	Μάρτιος - Ιούνιος	*	*	*							

Επιστημονική ονομασία	Κοινή ονομασία	ΠΔ 67/1981	Βέρνη	Βόννη	Σύμβαση της Βαρκελώνης	Οδηγία 92/43/ΕΟΚ	Οδηγία 2009/147/ΕΟΚ	IUCN/Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων ζώων της Ελλάδας	CITES	Οικολογία	Παρουσία εντός της Περιοχής Μελέτης	Ευαίσθητη Οικολογική Περίοδος	Περιοχές έργου									
													Πελοπόννησος (Χερσαίο Τμήμα)	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Χερσαία Ζώνη)	Κρήτη (Χερσαίο Τμήμα)	Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)	Νότιο Κρητικό Πέλαγος	Νότιο Αιγαίο Πέλαγος	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια Ζώνη & LF5)	Πατραϊκός Κόλπος
Emberiza schoeniclus	Καλαμοτσίχλονο		II					LC/NE		ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΟ: Αναπαράγεται σε απότομους παράκτιους βράχους ή σε βουνά, καθώς και σε γκρεμούς σε πεδινές εκτάσεις και στο έδαφος σε ανοιχτούς βάλτους στην τάιγκα. Μεταναστεύει βόρεια και ανατολικά. Τρέφεται με μικρού ή μεσαίου μεγέθους πτηνά, τα οποία πιάνει στον αέρα μετά από γρήγορη οριζόντια καταδίωξη ή πέφτοντας από ύψος με κλειστά φτερά. Φωλιάζει σε γκρεμούς, σπάνια σε παλιές φωλιές σε δέντρα ή (ιδίως στη βορειοανατολική τάιγκα) στο έδαφος.	Το είδος μπορεί να απαντηθεί σε ολόκληρη την παραθαλάσσια περιοχή μελέτης κατά τη μετανάστευση του.	Μάρτιος - Ιούνιος		*								
Erithacus rubecula	Κοκκινολαίμης		II					LC/NE		ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΟ. Προτιμά τα δάση, τις θαμνώδεις εκτάσεις, τα λιβάδια τόσο τεχνητά όσο και χερσαία.	Δάση, λιβάδια	Μάρτιος - Ιούνιος	*	*								
Falco eleonora	Μαυροπετρίτης			II			I	LC/LC		ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΟ: Αναπαράγεται σε αποικίες κυρίως σε νησιά της Μεσογείου και παράκτιους βράχους. Η αναπαραγωγή του καθυστερεί έως τα τέλη του καλοκαιριού-φθινοπώρου για να συμπίσει με τη φθινοπωρινή μετανάστευση των μικρών στρουθιόμορφων πουλιών, που αλιεύονται στη θάλασσα. Τρέφεται με μικρά πουλιά. Φωλιάζει σε γκρεμούς ή στις σχισμές των βράχων.	Γκρεμοί. Το πτηνό μπορεί να απαντηθεί και πάνω από ένα τμήμα της θαλάσσιας περιοχής μελέτης στο Νότιο Κρητικό Πέλαγος. Το είδος μπορεί επίσης να απαντηθεί σε ολόκληρη την παραθαλάσσια περιοχή μελέτης στην LF2 κατά τη μετανάστευση του. Μπορεί επίσης να αναζητά την τροφή του στην παραλία, αν και θεωρείται πολύ απίθανο.	Μάρτιος - Ιούνιος	*		*	*	*					

Επιστημονική ονομασία	Κοινή ονομασία	ΠΔ 67/1981	Βέρνη	Βόννη	Σύμβαση της Βαρκελώνης	Οδηγία 92/43/ΕΟΚ	Οδηγία 2009/147/ΕΟΚ	IUCN/Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων ζώων της Ελλάδας	CITES	Οικολογία	Παρουσία εντός της Περιοχής Μελέτης	Ευαίσθητη Οικολογική Περίοδος	Περιοχές έργου											
													Πελοπόννησος (Χερσαίο Τμήμα)	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Χερσαία Ζώνη)	Κρήτη (Χερσαίο Τμήμα)	Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)	Νότιο Κρητικό Πέλαγος	Νότιο Αιγαίο Πέλαγος	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια Ζώνη & LF5)	Πατραϊκός Κόλπος		
<i>Falco naumanni</i>	Κιρκινέζι			I, II			I	LC/VU	II	Το είδος αυτό αναπαράγεται από τη Μεσόγειο έως την Κίνα και τη Μογγολία κατά μήκος της νότιας κεντρικής Ασίας. Είναι καλοκαιρινός μετανάστης διαχειμάζει στην Αφρική και το Πακιστάν και μερικές φορές ακόμη και στην Ινδία και το Ιράκ. Είναι σπάνιο βόρεια της αναπαραγωγικής του εμβέλειας και μειώνεται στην ευρωπαϊκή του εμβέλεια. Το κιρκινέζι τρώει έντομα, αλλά και μικρά πουλιά, ερπετά και τρωκτικά (ιδιαίτερα ποντίκια), τα οποία συχνά βρίσκει πάνω στο έδαφος. Φωλιάζει δημιουργώντας αποικίες σε κτίρια, γκρεμούς ή σε τρύπες δέντρων και γεννά έως και 3-6 αυγά. Δεν χτίζει συμπαγείς φωλιές, το οποίο είναι χαρακτηριστικό στα γεράκια.	Το είδος μπορεί να απαντηθεί σε ολόκληρη την Περιοχή Μελέτης. Μπορεί επίσης να αναζητά την τροφή του στην παραλία, αν και θεωρείται πολύ απίθανο. Το πτηνό μπορεί να απαντηθεί και πάνω από ένα τμήμα της θαλάσσιας περιοχής μελέτης στο Νότιο Αιγαίο και τον Πατραϊκό Κόλπο.	Μάρτιος - Ιούνιος	*						*	*	*	*	*	*
<i>Falco peregrinus</i>	Πετρίτης			II			I	LC/LC	II	Αναπαράγεται σε απότομους παράκτιους βράχους ή σε βουνά, καθώς και σε γκρεμούς σε πεδινές εκτάσεις και στο έδαφος σε ανοιχτούς βάλτους στην τάιγκα. Μεταναστεύει βόρεια και ανατολικά. Τρέφεται με μικρού ή μεσαίου μεγέθους πτηνά, τα οποία πιάνει στον αέρα μετά από γρήγορη οριζόντια καταδίωξη ή πέφτοντας από ύψος με κλειστά φτερά. Φωλιάζει σε γκρεμούς, σπάνια σε παλιές φωλιές σε δέντρα ή (ιδίως στη βορειοανατολική τάιγκα) στο έδαφος.	Το είδος μπορεί να απαντηθεί σε ολόκληρη την Περιοχή Μελέτης. Μπορεί επίσης να αναζητά την τροφή του στην παραλία, αν και θεωρείται πολύ απίθανο. Το πτηνό μπορεί να απαντηθεί και πάνω από ένα τμήμα της θαλάσσιας περιοχής μελέτης στο Νότιο Κρητικό Πέλαγος. Το είδος μπορεί επίσης να απαντηθεί σε ολόκληρη την παραθαλάσσια περιοχή	Μάρτιος - Ιούνιος	*	*	*	*	*	*	*					

Επιστημονική ονομασία	Κοινή ονομασία	ΠΔ 67/1981	Βέρνη	Βόνη	Σύμβαση της Βαρκελώνης	Οδηγία 92/43/ΕΟΚ	Οδηγία 2009/147/ΕΟΚ	IUCN/Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων ζώων της Ελλάδας	CITES	Οικολογία	Παρουσία εντός της Περιοχής Μελέτης	Ευαίσθητη Οικολογική Περίοδος	Περιοχές έργου														
													Πελοπόννησος (Χερσαίο Τμήμα)	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Χερσαία Ζώνη)	Κρήτη (Χερσαίο Τμήμα)	Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)	Νότιο Κρητικό Πέλαγος	Νότιο Αιγαίο Πέλαγος	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια Ζώνη & LF5)	Πατραϊκός Κόλπος					
											μελέτης στην LF2 κατά τη μετανάστευση του. Μπορεί επίσης να αναζητά την τροφή του στην παραλία, αν και θεωρείται πολύ απίθανο. Το πτηνό μπορεί να απαντηθεί και πάνω από ένα τμήμα της θαλάσσιας περιοχής μελέτης στο Νότιο Αιγαίο.																
<i>Falco subbuteo</i>	Δεντρογέρακο			II				LC/NE	II	Είναι πουλί που κατοικεί στην ύπαιθρο, όπως σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις, έλη, στην τάιγκα και τη σαβάνα. Είναι ευρέως διαδεδομένο στις πεδινές εκτάσεις με διάσπαρτα μικρά δέντρα.	Λιβάδια	Μάρτιος - Ιούνιος	*	*													
<i>Falco tinnunculus</i>	Βραχοκιρκίνεζο			II				LC/NE	II	Ημερόβιο ζώο που ζει στις πεδιάδες και προτιμά ανοιχτούς βιότοπους όπως χωράφια, ρείκια, θαμνώδεις εκτάσεις και βάλτους. Δεν εντοπίζεται μόνο σε δασικές εκτάσεις, εφόσον υπάρχουν εναλλακτικές τοποθεσίες για να κουρνιάσει και να φωλιάσει, όπως βράχοι ή κτίρια. Ευδοκιμεί στις άδενδρες στέπες όπου υπάρχουν άφθονα ποώδη φυτά και θάμνοι για να μπορέσει να βρει το θήραμά του. Το βραχοκιρκίνεζο προσαρμόζεται εύκολα στους ανθρώπινους οικισμούς, εφόσον υπάρχουν επαρκείς εκτάσεις βλάστησης, και μπορεί ακόμη και να απαντηθεί σε υγροτόπους, βαλτότοπους και άνυδρες σαβάνες.	Λιβάδια	Μάρτιος - Ιούνιος	*	*	*												
<i>Ficedula albicollis</i>	Κρικομυγοχάφτης		II	II			I	LC/NE		ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΟ: Αναπαράγεται στη νοτιοανατολική Ευρώπη (απομονωμένοι πληθυσμοί υπάρχουν και στα στα νησιά Gotland και Oland στη Βαλτική Θάλασσα, Σουηδία) και στη νοτιοδυτική Ασία και είναι	Μεσογειακά φυλλοβόλα δάση και μικτά δάση. Το είδος απαντάται σε ολόκληρη την	Μάρτιος - Ιούνιος	*								*						

Επιστημονική ονομασία	Κοινή ονομασία	ΠΑ 67/1981	Βέρνη	Βόννη	Σύμβαση της Βαρκελώνης	Οδηγία 92/43/ΕΟΚ	Οδηγία 2009/147/ΕΟΚ	IUCN/Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων ζώων της Ελλάδας	CITES	Οικολογία	Παρουσία εντός της Περιοχής Μελέτης	Ευαίσθητη Οικολογική Περίοδος	Περιοχές έργου													
													Πελοπόννησος (Χερσαίο Τμήμα)	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Χερσαία Ζώνη)	Κρήτη (Χερσαίο Τμήμα)	Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)	Νότιο Κρητικό Πέλαγος	Νότιο Αιγαίο Πέλαγος	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια Ζώνη & LF5)	Πατραϊκός Κόλπος				
										μεταναστευτικό και διαχειμάζει στην Αφρική νοτίως της Σαχάρας. Σπανίως περιπλανάται στη δυτική Ευρώπη.	παραθαλάσσια περιοχή μελέτης κατά τη μετανάστευση του.															
<i>Ficedula semitorquata</i>	Πατσαλομαντού						I	LC/DD		ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΟ: Αναπαράγεται σε δάση φυλλοβόλων ή σε μικτά δάση, σε χαμηλότερου και μεσαίου υψομέτρου βουνά και συχνά κατά μήκος των ποταμών. Καλοκαιρινοί επισκέπτες που διαχειμάζουν στην Αφρική. Είναι πτηνά των φυλλοβόλων δασών, των πάρκων και των κήπων, τα οποία προτιμούν τα γέρικα δέντρα με κοιλότητες στις οποίες φωλιάζουν. Χτίζουν μια ανοιχτή φωλιά σε μια τρύπα μέσα στα δέντρα ή σε τεχνητές φωλιές.	Μεσογειακά φυλλοβόλα δάση και μικτά δάση. Το είδος απαντάται σε ολόκληρη την παραθαλάσσια περιοχή μελέτης κατά τη μετανάστευση του.	Μάρτιος - Ιούνιος		*												
<i>Fringilla coelebs</i>	Κοινός σπίνος							LC/NE		ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΟ. Αυτό το είδος κατοικεί σε πεδινά και κατώτερα ορεινά δάση φυλλοβόλων, κωνοφόρων δασών και μικτών δασών με ελαφρά προτίμηση στην οξιά (Fagus), το γαύρο (Carpinus), την ώριμη βελανιδιά (Quercus), την ερυθρελάτη (Picea) και το πεύκο (Pinus). Απαντάται επίσης στις άκρες και τα ξέφωτα των δασών, τις ακτές, τα ρείκια, τις άκρες της τούνδρας και τις γεωργικές περιοχές, τους φράχτες, τους οπωρώνες, τα πάρκα και τους κήπους. Στα Κανάρια Νησιά απαντάται σε περιοχές όπου υπάρχει δάφνη (Lauraceae) και σε περιοχές με πυκνή βλάστηση.	Το είδος απαντάται σε ολόκληρη την περιοχή μελέτης κατά τη μετανάστευση του.	Μάρτιος - Ιούνιος	*	*	*									*		
<i>Fulica atra</i>	Φαλαρίδα			II			II	LC/NE		Αυτό το είδος χτίζει τη φωλιά του με νεκρά καλάμια ή χόρτα, αλλά και κομμάτια χαρτιού ή πλαστικού κοντά σε όχθες ή σε υποβρύχια εμπόδια που προεξέχουν από το νερό, όπου γεννά έως και 10 αυγά, μερικές φορές 2 ή 3 φορές σε κάθε εποχή. Συνήθως επιβιώνουν λίγα μόνο μικρά. Αποτελεί συχνά λεία πτηνών όπως οι ερωδιοί και οι γλάροι.	Λίμνες	Μάρτιος - Ιούνιος	*	*												

Επιστημονική ονομασία	Κοινή ονομασία	ΠΔ 67/1981	Βέρνη	Βόνη	Σύμβαση της Βαρκελώνης	Οδηγία 92/43/ΕΟΚ	Οδηγία 2009/147/ΕΟΚ	IUCN/Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων ζώων της Ελλάδας	CITES	Οικολογία	Παρουσία εντός της Περιοχής Μελέτης	Ευαίσθητη Οικολογική Περίοδος	Περιοχές έργου											
													Πελοπόννησος (Χερσαίο Τμήμα)	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Χερσαία Ζώνη)	Κρήτη (Χερσαίο Τμήμα)	Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)	Νότιο Κρητικό Πέλαγος	Νότιο Αιγαίο Πέλαγος	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια Ζώνη & LF5)	Πατραϊκός Κόλπος		
										Οι φαλαρίδες μπορεί να είναι πολύ βάνουσες με τα μικρά τους, για παράδειγμα, όταν δεν βρίσκουν τροφή. Δαγκώνουν τα μικρά τους όταν ζητούν φαγητό και το κάνουν επανειλημμένα μέχρι να σταματήσουν να ζητούν και να πεθάνουν από την πείνα. Αν συνεχίσουν να τους ζητούν τροφή, μπορεί να τα δαγκώσουν τόσο δυνατά ώστε να τα σκοτώσουν. Η φαλαρίδα είναι παμφάγο και τρέφεται με διάφορα μικρά ζωντανά θηράματα, όπως αυγά άλλων υδρόβιων πτηνών, καθώς και φύκια, βλάστηση, σπόρους και φρούτα. Παρουσιάζει σημαντική διαφοροποίηση στις τεχνικές διατροφής του, ενώ βόσκει στην ξηρά ή στο νερό. Στο νερό μπορεί να αναποδογυρίσει όπως η πρασινοκέφαλη πάπια ή να βουτήξει για να αναζητήσει τροφή.														
<i>Galerida cristata</i>	Κατσουλιέρης									Το είδος αυτό κατοικεί σε ξηρές πεδιάδες με αραιή βλάστηση και ξηρές καλλιέργειες. Μπορεί αρχικά να κατοικούσε σε ζεστά ημι-ερημικά τοπία και σε στέπες, αλλά έχει επίσης προσαρμοστεί σε τοπία τροποποιημένα από τον άνθρωπο, όπως η ανοιχτή ύπαιθρος στη βόρεια λεκάνη της Μεσογείου.	Το είδος απαντάται σε ολόκληρη την Περιοχή Μελέτης.	Μάρτιος - Ιούνιος	*	*	*						*			
<i>Garrulus glandarius</i>	Κίσσα						II		LC/NE	Αναπαράγεται σε διάφορους τύπους δασικών εκτάσεων, τόσο κωνοφόρων όσο και φυλλοβόλων, και σε μεγαλύτερα δασώδη πάρκα. Προτιμά περιοχές με βελανίδια (δευτερευόντως καρπούς οξιάς, σπόρους κερατίνου), που αποθηκεύει το φθινόπωρο ως τροφή για τον χειμώνα. Μεταφέρει την τροφή του πολλά χιλιόμετρα μακριά. Πρόκειται κυρίως για «μόνιμο κάτοικο», αν και οι βόρειοι πληθυσμοί μεταναστεύουν Ν και ΝΔ κάποιες φορές το φθινόπωρο. Είναι διαρκώς άγρυπνο και ντροπαλό και δύσκολο να προσεγγιστεί. Είναι παμφάγο. Η καλοκαιρινή διατροφή του περιλαμβάνει πολλά αυγά και νεοσσούς. Φωλιάζει συνήθως στα δέντρα.	Δασικές εκτάσεις	Μάρτιος - Ιούνιος	*	*	*									

Επιστημονική ονομασία	Κοινή ονομασία	ΠΔ 67/1981	Βέρνη	Βόννη	Σύμβαση της Βαρκελώνης	Οδηγία 92/43/ΕΟΚ	Οδηγία 2009/147/ΕΟΚ	IUCN/Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων ζώων της Ελλάδας	CITES	Οικολογία	Παρουσία εντός της Περιοχής Μελέτης	Ευαίσθητη Οικολογική Περίοδος	Περιοχές έργου									
													Πελοπόννησος (Χερσαίο Τμήμα)	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Χερσαία Ζώνη)	Κρήτη (Χερσαίο Τμήμα)	Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)	Νότιο Κρητικό Πέλαγος	Νότιο Αιγαίο Πέλαγος	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια Ζώνη & LF5)	Πατραϊκός Κόλπος
<i>Gelochelidon nilotica</i>	Γελογλάρονο		II				I	LC/VU		ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΚΑΙ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΟ. Αυτό το είδος αναπαράγεται σε αποικίες σε λίμνες, έλη και ακτές. Φωλιάζει σε προεξοχές στο έδαφος και γεννά δύο έως πέντε αυγά. Ενώ είναι ευρέως κατανεμημένο σε περιοχές με γλυκό νερό στην Ευρασία, συνδέεται σχεδόν αποκλειστικά με περιοχές όπου υπάρχει θαλασσινό νερό, παράκτιες περιοχές της Βόρειας Αμερικής.	Το είδος μπορεί να απαντηθεί σε ολόκληρη την Περιοχή Μελέτης. Μπορεί επίσης να αναζητήσει την τροφή του στην ακτογραμμή. Το πτηνό μπορεί να απαντηθεί και πάνω από ένα τμήμα της θαλάσσιας περιοχής μελέτης στο Νότιο Κρητικό Πέλαγος, Νότιο Αιγαίο και τον Πατραϊκό Κόλπο. Το είδος μπορεί επίσης να απαντηθεί σε ολόκληρη την παραθαλάσσια περιοχή μελέτης στην LF2 κατά τη μετανάστευση του. Μπορεί επίσης να αναζητά την τροφή του στην παραλία, αν και θεωρείται πολύ απίθανο.	Μάρτιος - Ιούνιος				*	*	*	*	*	*	*
<i>Glaucidium passerinum</i>	Σπουργιτόγλαυκα		II				I	LC/NE	II	Είναι μη αποδημητικό είδος, που σημαίνει ότι τα ενήλικα άτομα είναι «μόνιμοι κάτοικοι» καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους στο εύρος αξάπλωσής του. Αυτό δεν ισχύει τους κρύους χειμώνες, όταν τα ενήλικα άτομα μπορεί να μεταναστεύσουν νότια. Τα μικρά του είδους μεταναστεύουν συνήθως το φθινόπωρο ή το χειμώνα. Φωλιάζουν σε κοιλότητες στα δέντρα και πολλές φορές σε παλιές τρύπες από δρυοκολάπτες. Τα δέντρα είναι συνήθως κωνοφόρα	Δάση	Απρίλιος – Ιούλιος										

Επιστημονική ονομασία	Κοινή ονομασία	ΠΔ 67/1981	Βέρνη	Βόνη	Σύμβαση της Βαρκελώνης	Οδηγία 92/43/ΕΟΚ	Οδηγία 2009/147/ΕΟΚ	IUCN/Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων ζώων της Ελλάδας	CITES	Οικολογία	Παρουσία εντός της Περιοχής Μελέτης	Ευαίσθητη Οικολογική Περίοδος	Περιοχές έργου													
													Πελοπόννησος (Χερσαίο Τμήμα)	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Χερσαία Ζώνη)	Κρήτη (Χερσαίο Τμήμα)	Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)	Νότιο Κρητικό Πέλαγος	Νότιο Αιγαίο Πέλαγος	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια Ζώνη & LF5)	Πατραϊκός Κόλπος				
										όπως και τα δάση στα οποία προτιμούν να ζουν. Σε ορισμένες περιπτώσεις φωλιάζουν όμως και σε σημύδες και οξιές. Οι κουκουβάγιες αυτές ζευγαρώνουν το φθινόπωρο και τα τέλη του χειμώνα/αρχές της άνοιξης.																
<i>Haematopus ostralegus</i>	Στρειδοφάγος							NT/NE		Αναπαράγεται σε ανοιχτές, επίπεδες ακτές. Συνήθως τρέφεται σε παλιρροϊκά επίπεδα ή χωράφια και άλλες ανοιχτές εκτάσεις (γενικά σε απόσταση όχι άνω των 20 χλμ από τη θάλασσα, αλλά τοπικά πολύ πιο μέσα στην ενδοχώρα). Κουρνιάζει σε αποικίες τον χειμώνα. Τρέφεται κυρίως με μύδια, σκουλήκια, μαλακόστρακα και έντομα. Διαθέτει πλατύ και αμβλύ ράμφος που μοιάζει με λεπίδα, ειδικά προσαρμοσμένο για να ανοίγει κυδώνια, μύδια κ.λπ. Φτιάχνει τη φωλιά του ξύνοντας απλώς το έδαφος, ενώ προτιμά βότσαλα, άμμο ή βραχώδες έδαφος σε λιβάδια με βλάστηση.	Ακτές	Μάρτιος - Ιούνιος		*												
<i>Hieraaetus fasciatus</i>	Σπιζαετός							LC/ VU		Δάση, θαμνώδεις εκτάσεις, λιβάδια, υγρότοποι (ενδοχώρα), βραχώδεις περιοχές (π.χ. βράχοι της ενδοχώρας, βουνοκορφές).	Γκρεμοί	Μάρτιος - Ιούνιος							*							
<i>Himantopus himantopus</i>	Καλαμοκανάς		II	II			I	LC/LC		Ο βιότοπος αναπαραγωγής όλων αυτών των ειδών είναι έλη, ρηχές λίμνες και υδάτινες στάθμες. Ορισμένοι πληθυσμοί είναι μεταναστευτικοί και μετακινούνται στις ακτές των ωκεανών το χειμώνα. Αυτοί που κατοικούν σε θερμότερες περιοχές είναι γενικά μόνιμα είδη ή μεταναστεύουν σε μικρή εμβέλεια. Στην Ευρώπη, ο καλαμοκανάς μετακινείται βόρεια της κανονικής του εμβέλειας, και περιστασιακά παραμένει για να αναπαραχθεί σε χώρες της βόρειας Ευρώπης, για παράδειγμα στη Βρετανία το 1987. Αυτά τα πουλιά αναζητούν την τροφή τους στην άμμο ή το νερό. Τρώνε κυρίως έντομα και καρκινοειδή. Τοποθετεί τη φωλιά του σε ένα γυμνό σημείο στο έδαφος κοντά στο νερό. Αυτά τα πουλιά φωλιάζουν συχνά σε μικρές ομάδες, μερικές φορές μαζί με αβοκέτες.	Βάλτοι και έλη, ρηχές άκρες λιμνών, κοίτες ποταμών, πλημμυρισμένα χωράφια, αρδευόμενες περιοχές, υδάτινες στάθμες λυμάτων και δεξαμενές ιχθυοκαλλιέργειας.	Μάρτιος - Ιούνιος	*	*												

Επιστημονική ονομασία	Κοινή ονομασία	ΠΔ 67/1981	Βέρνη	Βόνη	Σύμβαση της Βαρκελώνης	Οδηγία 92/43/ΕΟΚ	Οδηγία 2009/147/ΕΟΚ	IUCN/Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων ζώων της Ελλάδας	CITES	Οικολογία	Παρουσία εντός της Περιοχής Μελέτης	Ευαίσθητη Οικολογική Περίοδος	Περιοχές έργου									
													Πελοπόννησος (Χερσαίο Τμήμα)	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Χερσαία Ζώνη)	Κρήτη (Χερσαίο Τμήμα)	Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)	Νότιο Κρητικό Πέλαγος	Νότιο Αιγαίο Πέλαγος	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια Ζώνη & LF5)	Πατραϊκός Κόλπος
<i>Hippolais olivetorum</i>	Ελιοτριβιτούρα						I	LC/NT		ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΟ. Αναπαράγεται στη νοτιοανατολική Ευρώπη και την εγγύς ανατολή. Είναι μεταναστευτικό, διαχειμάζει στην ανατολική και νότια Αφρική, από την Κένυα νότια στη Νότια Αφρική.	Το είδος μπορεί να απαντηθεί σε ολόκληρη την περιοχή μελέτης κατά τη μετανάστευση του. Μπορεί επίσης να αναζητά την τροφή του στην παραλία, αν και θεωρείται πολύ απίθανο. Το πτηνό μπορεί να απαντηθεί και πάνω από ένα τμήμα της θαλάσσιας περιοχής μελέτης στο Νότιο Αιγαίο και τον Πατραϊκό Κόλπο.	Μάρτιος - Ιούνιος	*	*			*	*	*	*	*	
<i>Hirundo rustica</i>	Σταβλοχελίδονο		II					LC/NE		ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΟ. Προτιμά σαβάνες, θαμνώδεις εκτάσεις, λιβάδια, υγροτόπους (ενδοχώρα) – τεχνητές/χερσαίες, τεχνητές/υδάτινες και θαλάσσιες περιοχές.	Το είδος απαντάται σε ολόκληρη την Περιοχή Μελέτης. Μπορεί επίσης να αναζητήσει την τροφή του στην ακτογραμμή, αν και πιο σπάνια.	Μάρτιος - Ιούνιος	*	*	*					*		
<i>Iduna pallida</i>	Ωχροστριτίδα							LC/NE		Αυτό το μικρό στρουθιόμορφο πουλί απαντάται σε ξηρές ανοιχτές εκτάσεις, καθώς και σε καλλιέργειες, με θάμνους ή μερικά δέντρα. Όπως τα περισσότερα πτηνά του είδους του, είναι εντομοφάγο.	Το είδος απαντάται σε ολόκληρη την Περιοχή Μελέτης. Μπορεί επίσης να αναζητήσει την τροφή του	Μάρτιος - Ιούνιος	*	*	*							

Επιστημονική ονομασία	Κοινή ονομασία	ΠΔ 67/1981	Βέρνη	Βόνη	Σύμβαση της Βαρκελώνης	Οδηγία 92/43/ΕΟΚ	Οδηγία 2009/147/ΕΟΚ	IUCN/Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων ζώων της Ελλάδας	CITES	Οικολογία	Παρουσία εντός της Περιοχής Μελέτης	Ευαίσθητη Οικολογική Περίοδος	Περιοχές έργου										
													Πελοπόννησος (Χερσαίο Τμήμα)	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Χερσαία Ζώνη)	Κρήτη (Χερσαίο Τμήμα)	Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)	Νότιο Κρητικό Πέλαγος	Νότιο Αιγαίο Πέλαγος	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια Ζώνη & LF5)	Πατραϊκός Κόλπος	
											στην ακτογραμμή, αν και πιο σπάνια.												
<i>Ixobrychus minutus</i>	Μικροτσικνιάς		II	II			I	LC/LC		Ο βιότοπος αναπαραγωγής του είναι οι καλαμιώνες. Φωλιάζει σε πλατφόρμες από καλάμια σε θάμνους. Τρέφεται με ψάρια, έντομα και αμφίβια.	Καλαμιώνες	Μάρτιος - Ιούνιος	*	*									
<i>Jynx torquilla</i>	Στραβολαίμης							LC/NE		Προτιμά περιοχές που χρησιμοποιούνται για την καλλιέργεια λαχανικών όταν περιέχουν γυμνό έδαφος όπου μπορεί να αναζητήσει την τροφή του. Δεν επιλέγουν τυχαία το έδαφος, καθώς τα πτηνά που φθάνουν ευνοούν ορισμένες περιοχές έναντι άλλων ενώ αποικίζουν τις ίδιες περιοχές κάθε χρόνο. Ευνοϊκές περιοχές για τα πτηνά αυτά είναι οι οπωρώνες, γενικά, και οι παλαιότεροι ειδικότερα, πιθανώς επειδή στο πυκνό τους φύλλωμα μπορούν να αναπτυχθούν περισσότερα πτηνά και το έδαφος από κάτω έχει ελάχιστη βλάστηση, παράγοντες που αυξάνουν τη διαθεσιμότητα μυρμηγκιών, τα οποία αποτελούν το κύριο θήραμα των πτηνών.	Οπωρώνες	Μάρτιος - Ιούνιος		*									
<i>Lanius collurio</i>	Αετομάχος						I	LC/NE		ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΟ. Αναπαράγεται σε ανοιχτές καλλιεργήσιμες εκτάσεις, συχνά σε ρείκια και βοσκοτόπια με κράταιγο, τσάπουρνο και τριανταφυλλιά, καθώς και σε πλαγιές με άρκευθο. Καλοκαιρινός επισκέπτης που αγαπάει τον ήλιο και διαχειμάζει στην τροπική Αφρική ενώ επιστρέφει τον Μάιο. Εξειδικεύεται στα έντομα. Κάποια άτομα δημιουργούν απόθεμα και ρίχνουν το πλεόνασμα σε θάμνους με αγκάθια.	Μόνιμες καλλιέργειες, αρόσιμη γη, λιβάδια. Το είδος απαντάται σε όλη την Περιοχή Μελέτης και μπορεί να αναζητήσει την τροφή του στη ζώνη της παραλίας	Μάρτιος - Ιούνιος	*	*							*		
<i>Lanius minor</i>	Σταχτοκεφαλός			II			I	LC/NT		ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΟ. Αναπαράγεται σε ανοιχτές εκτάσεις με καλλιέργειες, οπωρώνες, δεντροστοιχίες με λεύκες και διάσπαρτα δέντρα και ελαιώνες (αλλά όχι σε δασικές εκτάσεις). Του αρέσει η ζέστη, γι’ αυτό προτιμά	Το είδος μπορεί να απαντηθεί σε ολόκληρη την περιοχή μελέτης κατά τη μετανάστευση του. Μπορεί επίσης να αναζητά	Μάρτιος - Ιούνιος	*	*				*	*	*	*	*	

Επιστημονική ονομασία	Κοινή ονομασία	ΠΑ 67/1981	Βέρνη	Βόννη	Σύμβαση της Βαρκελώνης	Οδηγία 92/43/ΕΟΚ	Οδηγία 2009/147/ΕΟΚ	IUCN/Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων ζώων της Ελλάδας	CITES	Οικολογία	Παρουσία εντός της Περιοχής Μελέτης	Ευαίσθητη Οικολογική Περίοδος	Περιοχές έργου										
													Πελοπόννησος (Χερσαίο Τμήμα)	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Χερσαία Ζώνη)	Κρήτη (Χερσαίο Τμήμα)	Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)	Νότιο Κρητικό Πέλαγος	Νότιο Αιγαίο Πέλαγος	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια Ζώνη & LF5)	Πατραϊκός Κόλπος	
										περισσότερο τις πεδιάδες. Συχνά, στέκεται παρατηρώντας πάνω σε τηλεφωνικά καλώδια στην άκρη του δρόμου.	την τροφή του στην παραλία, αν και θεωρείται πολύ απίθανο. Το πτηνό μπορεί να απαντηθεί και πάνω από ένα τμήμα της θαλάσσιας περιοχής μελέτης στο Νότιο Αιγαίο και τον Πατραϊκό Κόλπο.												
<i>Lanius nubicus</i>	Παρδαλοκεφαλάς						I	LC/NT		ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΟ. Αναπαράγεται στη νοτιοανατολική Ευρώπη και στο ανατολικό άκρο της Μεσογείου, ενώ υπάρχει ξεχωριστός πληθυσμός στο δυτικό Ιράν. Είναι κοινό είδος στην Τουρκία, την Κύπρο, το Ισραήλ και τη Συρία. Είναι μεταναστευτικό είδος και διαχειμάζει στη βορειοανατολική Αφρική. Αναπαράγεται σε ανοιχτά δάση και καλλιεργημένες εκτάσεις. Χτίζει τη φωλιά του στα δέντρα και γεννά 4-7 αυγά.	Το είδος μπορεί να απαντηθεί σε ολόκληρη την περιοχή μελέτης κατά τη μετανάστευση του. Μπορεί επίσης να αναζητά την τροφή του στην παραλία, αν και θεωρείται πολύ απίθανο. Το πτηνό μπορεί να απαντηθεί και πάνω από ένα τμήμα της θαλάσσιας περιοχής μελέτης στο Νότιο Κρητικό Πέλαγος. Το είδος μπορεί επίσης να απαντηθεί σε ολόκληρη την παραθαλάσσια περιοχή μελέτης στην LF2 κατά τη μετανάστευση του. Μπορεί επίσης να αναζητά την τροφή του στην παραλία,	Μάρτιος - Ιούνιος					*	*	*	*	*	*	*

Επιστημονική ονομασία	Κοινή ονομασία	ΠΔ 67/1981	Βέρνη	Βόνη	Σύμβαση της Βαρκελώνης	Οδηγία 92/43/ΕΟΚ	Οδηγία 2009/147/ΕΟΚ	IUCN/Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων ζώων της Ελλάδας	CITES	Οικολογία	Παρουσία εντός της Περιοχής Μελέτης	Ευαίσθητη Οικολογική Περίοδος	Περιοχές έργου										
													Πελοπόννησος (Χερσαίο Τμήμα)	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Χερσαία Ζώνη)	Κρήτη (Χερσαίο Τμήμα)	Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)	Νότιο Κρητικό Πέλαγος	Νότιο Αιγαίο Πέλαγος	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια Ζώνη & LF5)	Πατραϊκός Κόλπος	
											αν και θεωρείται πολύ απίθανο. Το πτηνό μπορεί να απαντηθεί και πάνω από ένα τμήμα της θαλάσσιας περιοχής μελέτης στο Νότιο Αιγαίο και τον Πατραϊκό Κόλπο.												
Lanius senator	Κοκκινοκεφαλός		II					LC/NE		ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΟ. Αυτό το είδος κατοικεί σε θαμνώδεις ή δενδρώδεις εκτάσεις, σε ανοιχτές εκτάσεις με πλήθος μεγάλων εντόμων και κουρνιάζει σε σημεία με επιβλητική θέα της περιοχής. Απαντάται συνήθως σε ημιυπαίθριες περιοχές με αραιούς θάμνους και δέντρα, όπως ανοιχτά δάση, παλιούς οπωρώνες, ελαιώνες (Olea), κήπους και πάρκα ή φράχτες με μεγάλους αγκαθωτούς θάμνους. Στην Ελλάδα προτιμά το ανοιχτό πευκοδάσος. Σε πολλές περιοχές εμφανίζεται σε καλλιεργημένες εκτάσεις με δέντρα και στα βόρεια της εμβέλειάς του είναι ένα τυπικό πουλί που απαντάται σε παλιούς παραδοσιακούς οπωρώνες, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν πρόβατα ή βοοειδή.	Το είδος απαντάται σε ολόκληρη την Περιοχή Μελέτης.	Μάρτιος - Ιούνιος	*	*	*					*			
Larus audouinii	Αιγαιόγλαρος		II	II		II	I	VU/VU		Αποικίες του βρίσκονται σε εκτεθειμένους βραχώδεις γκρεμούς και σε υπεράκτια νησιά ή βραχονησίδες, που συνήθως δεν ξεπερνούν τα 50 μέτρα πάνω από τη στάθμη της θάλασσας. Στο Αιγαίο αναπαράγεται σε ακατοίκητα νησιά με ήπια κλίση προς τη θάλασσα και καλυμμένα με μεγάλες πέτρες, ερύγγιο, γρασίδι και χαμηλούς θάμνους Pistacia lentiscus.	Ακατοίκητα νησιά, χαμηλοί θάμνοι	Μάρτιος - Ιούνιος				*	*	*	*				
Larus michahellis	Κιτρινοπόδης γλάρος						II	LC/NE		Κοντά στις ακτές, συχνά και στην ενδοχώρα, τρέφεται σε χωράφια, σκουπιδότοπους κ.λπ.	Το πτηνό μπορεί να απαντηθεί και πάνω από	Μάρτιος - Ιούνιος	*	*	*	*	*						

Επιστημονική ονομασία	Κοινή ονομασία	ΠΔ 67/1981	Βέρνη	Βόννη	Σύμβαση της Βαρκελώνης	Οδηγία 92/43/ΕΟΚ	Οδηγία 2009/147/ΕΟΚ	IUCN/Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων ζώων της Ελλάδας	CITES	Οικολογία	Παρουσία εντός της Περιοχής Μελέτης	Ευαίσθητη Οικολογική Περίοδος	Περιοχές έργου														
													Πελοπόννησος (Χερσαίο Τμήμα)	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Χερσαία Ζώνη)	Κρήτη (Χερσαίο Τμήμα)	Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)	Νότιο Κρητικό Πέλαγος	Νότιο Αιγαίο Πέλαγος	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια Ζώνη & LF5)	Πατραϊκός Κόλπος					
											ένα τμήμα της θαλάσσιας περιοχής μελέτης στο Νότιο Κρητικό Πέλαγος. Το είδος μπορεί επίσης να απαντηθεί σε ολόκληρη την παραθαλάσσια περιοχή μελέτης στην LF2 κατά τη μετανάστευση του. Μπορεί επίσης να αναζητά την τροφή του στην παραλία, αν και θεωρείται πολύ απίθανο.																
<i>Leiopicus medius</i>	Μεσαίος δρυοκολάπτης						I	LC/LC		Του αρέσει να αναζητεί την τροφή του ψηλά στα δέντρα, να κινείται συνεχώς και να παρεμποδίζει τη θέα. Στην αναπαραγωγική περίοδο, φτιάχνει τη φωλιά του μέσα σε τρύπες πλάτους περίπου 5 εκατοστών σε κορμούς δέντρων που βρίσκονται σε αποσύνθεση ή σε χοντρά κλαδιά. Γεννά τέσσερα έως επτά αυγά που επωάζονται για 11–14 ημέρες.	Δάση	Μάρτιος - Ιούνιος	*	*													
<i>Limosa limosa</i>	Λιμόζα			II				LC/NE		Ο οικότοπος αναπαραγωγής του είναι τέλματα σε κοιλάδες ποταμών, πλημμυρικές εκτάσεις στις παρυφές μεγάλων λιμνών, υγρές στέπες, υπερυψωμένοι βάλτοι και βαλτότοποι. Σημαντικό ποσοστό του ευρωπαϊκού πληθυσμού χρησιμοποιεί πλέον δευτερεύοντες οικοτόπους: υγρά πεδινά λιβάδια, παράκτιους βαλτότοπους, βοσκοτόπια, υγρότοπους κοντά σε υδατοκαλλιέργειες ή έργα αποχέτευσης και λιμνοθάλασσες με αλμυρό νερό.	Λίμνες	Μάρτιος - Ιούνιος		*													
<i>Linaria cannabina</i>	Φανέτο							LC/NE		Η αναπαραγωγή του ευνοείται σε ανοικτές εκτάσεις με πυκνούς θάμνους, συμπεριλαμβανομένων των χερσότοπων και των	Θάμνοι	Μάρτιος - Ιούνιος	*	*	*												

Επιστημονική ονομασία	Κοινή ονομασία	ΠΔ 67/1981	Βέρνη	Βόνη	Σύμβαση της Βαρκελώνης	Οδηγία 92/43/ΕΟΚ	Οδηγία 2009/147/ΕΟΚ	IUCN/Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων ζώων της Ελλάδας	CITES	Οικολογία	Παρουσία εντός της Περιοχής Μελέτης	Ευαίσθητη Οικολογική Περίοδος	Περιοχές έργου												
													Πελοπόννησος (Χερσαίο Τμήμα)	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Χερσαία Ζώνη)	Κρήτη (Χερσαίο Τμήμα)	Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)	Νότιο Κρητικό Πέλαγος	Νότιο Αιγαίο Πέλαγος	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια Ζώνη & LF5)	Πατραϊκός Κόλπος			
										περιβολιών. Φτιάχνει τη φωλιά του μέσα σε θάμνους, όπου γεννά τέσσερα έως επτά αυγά. Αυτό το είδος μπορεί να σχηματίσει μεγάλες ομάδες εκτός της αναπαραγωγικής περιόδου, στις οποίες μερικές φορές αναμειγνύονται και άλλοι σπίνοι, όπως ο κοινός σπίνος, σε ακτές και αλυκές.															
<i>Locustella luscinioides</i>	Νερομουγιούδι							LC/NE		Απαντάται σε καλαμιώνες, έλη και λιμνοθάλασσες με καλάμια, φασκόμηλο και άλλη ελώδη βλάστηση, ενίοτε με διάσπαρτους θάμνους.	Έλη, καλαμιώνες	Μάρτιος - Ιούνιος		*											
<i>Loxia curvirostra</i>	Σταυρομύτης		II					LC/NE		Αναπαράγεται σε διάφορα δάση κωνοφόρων στη Βόρεια Αμερική και την Ευρασία. Οι κινήσεις και η εμφάνισή του συνδέονται άμεσα με τη διαθεσιμότητα σπόρων κωνοφόρων, οι οποίοι αποτελούν την κύρια πηγή διατροφής του. Φωλιάζουν συνήθως στα τέλη του καλοκαιριού (Ιούνιος-Σεπτέμβριος) όταν ωριμάζουν οι σπόροι των περισσότερων ειδών κωνοφόρων, αλλά μπορούν να φωλιάσουν οποιαδήποτε εποχή του χρόνου εάν εντοπίσουν μια περιοχή με την κατάλληλη καλλιέργεια κωνοφόρων. Αυτό το είδος θεωρείται νομαδικό και ιδιαίτερα επιδορμικό, καθώς η παραγωγή σπόρων κωνοφόρων μπορεί να ποικίλλει σημαντικά από έτος σε έτος και τα πουλιά διασκορπίζονται ευρέως για να αναπαραχθούν και να αναζητήσουν τροφή όταν η καλλιέργεια κωνοφόρων στη συγκεκριμένη περιοχή στην οποία βρίσκονται δεν ευδοκιμήσει. Σε πολλές περιοχές της εμβέλειάς τους θεωρούνται ακανόνιστα γιατί μπορεί να υπάρχουν σε ορισμένες χρονιές και σε άλλες όχι.	Δάση κωνοφόρων	Μάρτιος - Ιούνιος	*	*											
<i>Lullula arborea</i>	Δεντροσταρήθρα						I	LC/LC		Αναπαράγεται σε ανοιχτά δάση, ενώ προτιμά τα πεύκα που βρίσκονται σε αμμώδες έδαφος, αλλά και σε μικτά ή πλατύφυλλα δάση με ξέφωτα και σε χερσότοπους με διάσπαρτες θαμνώδεις	Μεσογειακά δάση κωνοφόρων, μεσογειακά δάση φυλλοβόλων, μικτά	Μάρτιος - Ιούνιος	*	*	*				*						

Επιστημονική ονομασία	Κοινή ονομασία	ΠΔ 67/1981	Βέρνη	Βόνη	Σύμβαση της Βαρκελώνης	Οδηγία 92/43/ΕΟΚ	Οδηγία 2009/147/ΕΟΚ	IUCN/Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων ζώων της Ελλάδας	CITES	Οικολογία	Παρουσία εντός της Περιοχής Μελέτης	Ευαίσθητη Οικολογική Περίοδος	Περιοχές έργου														
													Πελοπόννησος (Χερσαίο Τμήμα)	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Χερσαία Ζώνη)	Κρήτη (Χερσαίο Τμήμα)	Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)	Νότιο Κρητικό Πέλαγος	Νότιο Αιγαίο Πέλαγος	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια Ζώνη & LF5)	Πατραϊκός Κόλπος					
										εκτάσεις. Τα πουλιά από τη Βόρεια Ευρώπη μεταναστεύουν στη Νότια Ευρώπη.	δάση. Το είδος απαντάται σε ολόκληρη την παράκτια Περιοχή Μελέτης.																
<i>Luscinia megarhynchos</i>	Αηδόνι		II					LC/NE		Εντομοφάγο είδος που αναπαράγεται σε δάση και θάμνους.	Δάση, λιβάδια	Μάρτιος - Ιούνιος	*	*	*												
<i>Merops apiaster</i>	Μελισσοφάγος		II	II				LC/NE		ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΟ. Στην Ευρώπη, αυτό το είδος κατοικεί σε μεγάλες κοιλάδες ποταμών, σε βοσκότοπους και σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις με φυτοφράκτες (σειρές δέντρων) και διάσπαρτα δέντρα, σε ηλιόλουστες βουνοπλαγιές, λιβάδια, χωράφια με τριφύλλι, πεδιάδες, στέπες, θαμνώδεις όχθες ποταμών σε ημερήμιους και σχεδόν κάθε ανοιχτή και πλούσια σε ξυλεία έκταση, όπως δάση με φελλόδρυες, ελαιώνες, αλμυρίκια, ορυζώνες, καλλιέργειες δημητριακών και ριζών, και μεσογειακή μακία.	Το είδος απαντάται σε ολόκληρη την Περιοχή Μελέτης.	Μάρτιος - Ιούνιος	*	*	*												
<i>Microcarbo pygmaeus</i>	Λαγγόνα			II			I	LC/LC		ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΟ: Αναπαράγεται στη νοτιοανατολική Ευρώπη και τη νοτιοδυτική Ασία. Είναι εν μέρει μεταναστευτικό, με τους βόρειους πληθυσμούς να διαχειμάζουν νοτιότερα, κυρίως εντός της περιοχής αναπαραγωγής του. Σπανίως εντοπίζεται στη δυτική Ευρώπη. Στη λαγγόνα αρέσουν οι υδάτινοι όγκοι με άφθονη βλάστηση, οι λίμνες και τα δέλτα των ποταμών. Εγκαταλείπει τις ορεινές και ψυχρές και ξηρές περιοχές. Λατρεύει τους ορυζώνες ή άλλες πλημμυρισμένες περιοχές όπου μπορεί να βρει θάμνους και δέντρα. Κατά τη διάρκεια του χειμώνα απαντάται επίσης συχνά σε νερά με υψηλότερη αλατότητα, σε εκβολές ποταμών ή σε τεχνητές λίμνες. Ζουν μοναχικά ή σε ομάδες και είναι κατά κάποιο τρόπο προσαρμοσμένα στην ανθρώπινη παρουσία. Φτιάχνουν τη φωλιά από κλαδιά και καλάμια σε περιοχές με πυκνή βλάστηση, σε	Λίμνες	Μάρτιος - Ιούνιος		*													

Επιστημονική ονομασία	Κοινή ονομασία	ΠΑ 67/1981	Βέρνη	Βόννη	Σύμβαση της Βαρκελώνης	Οδηγία 92/43/ΕΟΚ	Οδηγία 2009/147/ΕΟΚ	IUCN/Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων ζώων της Ελλάδας	CITES	Οικολογία	Παρουσία εντός της Περιοχής Μελέτης	Ευαίσθητη Οικολογική Περίοδος	Περιοχές έργου														
													Πελοπόννησος (Χερσαίο Τμήμα)	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Χερσαία Ζώνη)	Κρήτη (Χερσαίο Τμήμα)	Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)	Νότιο Κρητικό Πέλαγος	Νότιο Αιγαίο Πέλαγος	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια Ζώνη & LF5)	Πατραϊκός Κόλπος					
										δέντρα, θάμνους, ιτιές αλλά σποραδικά σε καλαμιές (πάνω σε μικρές πλωτές νησίδες). Στα τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου, και οι δύο γονείς επωάζουν τα αυγά τους για 27-30 ημέρες και οι νεοσσοί γίνονται ανεξάρτητοι μετά από 70 ημέρες. Τα μικρά τρέφονται από τους γονείς τους με μικρά ψάρια και άλλα υδρόβια ζώα (Kiss & Rekasi, 2002). Συχνά μοιράζονται τον ίδιο τύπο οικοτόπου με τους τσικνιάδες, τους ερωδιούς και τις πλαταλείνες.																	
Milvus migrans	Τσίφτης			II			I	LC/CR	II	ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΟ Καλοκαιρινοί επισκέπτες, τους χειμώνες απαντάται στην Αφρική. Αναπαράγεται σε δάση κοντά σε λίμνες, ποτάμια ή υγροτόπους, καθώς και κοντά σε ανθρώπινους οικισμούς. Φτιάχνει τη φωλιά του στα δέντρα.	Το είδος μπορεί να απαντηθεί σε ολόκληρη την περιοχή μελέτης κατά τη μετανάστευση του. Μπορεί επίσης να αναζητά την τροφή του στην παραλία, αν και θεωρείται πολύ απίθανο. Το πτηνό μπορεί να απαντηθεί και πάνω από ένα τμήμα της θαλάσσιας περιοχής μελέτης στο Νότιο Κρητικό Πέλαγος. Το είδος μπορεί επίσης να απαντηθεί σε ολόκληρη την παραθαλάσσια περιοχή μελέτης στην LF2 κατά τη μετανάστευση του. Μπορεί επίσης να αναζητά την τροφή του στην παραλία, αν και θεωρείται πολύ απίθανο.	Μάρτιος - Ιούνιος									*	*	*	*	*	*	*

Επιστημονική ονομασία	Κοινή ονομασία	ΠΔ 67/1981	Βέρνη	Βόννη	Σύμβαση της Βαρκελώνης	Οδηγία 92/43/ΕΟΚ	Οδηγία 2009/147/ΕΟΚ	IUCN/Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων ζώων της Ελλάδας	CITES	Οικολογία	Παρουσία εντός της Περιοχής Μελέτης	Ευαίσθητη Οικολογική Περίοδος	Περιοχές έργου									
													Πελοπόννησος (Χερσαίο Τμήμα)	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Χερσαία Ζώνη)	Κρήτη (Χερσαίο Τμήμα)	Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)	Νότιο Κρητικό Πέλαγος	Νότιο Αιγαίο Πέλαγος	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια Ζώνη & LF5)	Πατραϊκός Κόλπος
											Το πτηνό μπορεί να απαντηθεί και πάνω από ένα τμήμα της θαλάσσιας περιοχής μελέτης στο Νότιο Αιγαίο και τον Πατραϊκό Κόλπο.											
Milvus milvus	Ψαλιδιάρης			II			I	NT/DD	II	ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΟ: Αναπαράγεται σε δάση κοντά σε λίμνες που είναι διάσπαρτες σε ανοιχτές εκτάσεις. Τρέφεται με ψάρια, ψοφίμια , απορρίμματα, έντομα. Συχνά κλέβει τροφή από άλλα πουλιά. Φωλιάζει σε ψηλά δέντρα.	Το είδος μπορεί να απαντηθεί σε ολόκληρη την περιοχή μελέτης κατά τη μετανάστευση του. Μπορεί επίσης να αναζητά την τροφή του στην παραλία, αν και θεωρείται πολύ απίθανο. Το πτηνό μπορεί να απαντηθεί και πάνω από ένα τμήμα της θαλάσσιας περιοχής μελέτης στο Νότιο Κρητικό Πέλαγος. Το είδος μπορεί επίσης να απαντηθεί σε ολόκληρη την παραθαλάσσια περιοχή μελέτης στην LF2 κατά τη μετανάστευση του. Μπορεί επίσης να αναζητά την τροφή του στην παραλία, αν και θεωρείται πολύ απίθανο.	Μάρτιος - Ιούνιος				*	*		*	*	*	*

Επιστημονική ονομασία	Κοινή ονομασία	ΠΔ 67/1981	Βέρνη	Βόνη	Σύμβαση της Βαρκελώνης	Οδηγία 92/43/ΕΟΚ	Οδηγία 2009/147/ΕΟΚ	IUCN/Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων ζώων της Ελλάδας	CITES	Οικολογία	Παρουσία εντός της Περιοχής Μελέτης	Ευαίσθητη Οικολογική Περίοδος	Περιοχές έργου									
													Πελοπόννησος (Χερσαίο Τμήμα)	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Χερσαία Ζώνη)	Κρήτη (Χερσαίο Τμήμα)	Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)	Νότιο Κρητικό Πέλαγος	Νότιο Αιγαίο Πέλαγος	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια Ζώνη & LF5)	Πατραϊκός Κόλπος
											Το πτηνό μπορεί να απαντηθεί και πάνω από ένα τμήμα της θαλάσσιας περιοχής μελέτης στο Νότιο Αιγαίο και τον Πατραϊκό Κόλπο.											
Monticola saxatilis	Πετροκότσουφας		II					LC/NE		Αυτό το είδος αναπαράγεται σε ανοιχτές ξηρές λοφώδεις εκτάσεις, συνήθως σε υψόμετρο πάνω από 1500 m. Φωλιάζει σε κοιλότητες βράχων, όπου γεννά 4–5 αυγά. Είναι παμφάγο, τρώει διάφορα έντομα, μούρα και μικρά ερπετά	Λιβάδια	Μάρτιος - Ιούνιος	*									
Monticola solitarius	Γαλαζοκότσουφας		II					LC/NE		Αναπαράγεται σε ανοιχτές ορεινές περιοχές. Φωλιάζει σε κοιλότητες βράχων και σε τοίχους.	Λιβάδια	Μάρτιος - Ιούνιος	*	*	*							
Motacilla alba	Λευκοσουσουράδα		II					LC/NE		ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΟ. Το είδος κατοικεί σε μια πολύ μεγάλη ποικιλία μη δασικών υγρών και ξηρών οικοτόπων, συμπεριλαμβανομένων ακτών, βραχωδών ή αμμωδών ορεινών ποταμών και πεδινών ποταμών βραδείας ροής, σε ακτές λιμνών, γεωργικές εκτάσεις, κήπους, πάρκα και μικρών λιβαδιών, κοντά σε εργοστάσια σε πόλεις και κωμοπόλεις. Απαντάται επίσης συχνά σε πόλεις και χωριά.	Το είδος απαντάται σε ολόκληρη την περιοχή μελέτης κατά τη μετανάστευση του. Μπορεί επίσης να αναζητά την τροφή του στην παραλία, αν και θεωρείται πολύ απίθανο.	Μάρτιος - Ιούνιος	*	*						*		
Motacilla cinerea	Σταχτοσουσουράδα		II					LC/NE		ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΟ. Το είδος κατοικεί σε μια πολύ μεγάλη ποικιλία μη δασικών υγρών και ξηρών οικοτόπων, συμπεριλαμβανομένων ακτών, βραχωδών ή αμμωδών ορεινών ποταμών και πεδινών ποταμών βραδείας ροής, ακτών λιμνών, γεωργικών εκτάσεων, κήπων, πάρκων και μικρών λιβαδιών, κοντά σε εργοστάσια σε πόλεις και κωμοπόλεις. Απαντάται επίσης συχνά σε πόλεις και χωριά.	Το είδος απαντάται σε ολόκληρη την περιοχή μελέτης κατά τη μετανάστευση του. Μπορεί επίσης να αναζητά την τροφή του στην	Μάρτιος - Ιούνιος	*	*	*							

Επιστημονική ονομασία	Κοινή ονομασία	ΠΔ 67/1981	Βέρνη	Βόνη	Σύμβαση της Βαρκελώνης	Οδηγία 92/43/ΕΟΚ	Οδηγία 2009/147/ΕΟΚ	IUCN/Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων ζώων της Ελλάδας	CITES	Οικολογία	Παρουσία εντός της Περιοχής Μελέτης	Ευαίσθητη Οικολογική Περίοδος	Περιοχές έργου									
													Πελοπόννησος (Χερσαίο Τμήμα)	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Χερσαία Ζώνη)	Κρήτη (Χερσαίο Τμήμα)	Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)	Νότιο Κρητικό Πέλαγος	Νότιο Αιγαίο Πέλαγος	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια Ζώνη & LF5)	Πατραϊκός Κόλπος
											παραλία, αν και θεωρείται πολύ απίθανο.											
<i>Motacilla flava</i>	Κιτρινοσουσουράδα		II					LC/NE		ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΟ. Το είδος κατοικεί σε μια πολύ μεγάλη ποικιλία μη δασικών υγρών και ξηρών οικοτόπων, συμπεριλαμβανομένων ακτών, βραχωδών ή αμμωδών ορεινών ποταμών και πεδινών ποταμών βραδείας ροής, ακτών λιμνών, γεωργικών εκτάσεων, κήπων, πάρκων και μικρών λιβαδιών, κοντά σε εργοστάσια σε πόλεις και κωμοπόλεις. Απαντάται επίσης συχνά σε πόλεις και χωριά.	Το είδος απαντάται σε ολόκληρη την περιοχή μελέτης κατά τη μετανάστευση του. Μπορεί επίσης να αναζητά την τροφή του στην παραλία, αν και θεωρείται πολύ απίθανο.	Μάρτιος - Ιούνιος	*	*								
<i>Muscicapa striata</i>	Σταχτομυγοχάφτης							LC/NE		ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΟ. Το είδος αυτό κατοικεί σχεδόν σε κάθε αραιό δάσος ή ξυλώδη βλάστηση με υπερυψωμένα σημεία όπου μπορεί να κουρνιάσει απολαμβάνοντας τη θέα. Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγικής περιόδου προτιμά τα ώριμα δέντρα σε καλή απόσταση από τα νεότερα δέντρα και τους θάμνους, και έτσι έχει προσαρμοστεί καλά σε λεωφόρους, πάρκα, κήπους, περιβόλια και άλλους ανθρωπογενείς οικοτόπους, ενώ εγκαθίσταται επίσης σε πολλούς τύπους φυλλοβόλων ή κωνοφόρων δασών. Απαντάται επίσης στα όρια των δασών, σε ξέφωτα δασών και καμένες εκτάσεις και σε δέντρα κατά μήκος ρυακιών, ποταμών και στις άκρες βάλτων.	Το είδος απαντάται σε ολόκληρη την περιοχή μελέτης κατά τη μετανάστευση του. Μπορεί επίσης να αναζητά την τροφή του στην παραλία, αν και θεωρείται πολύ απίθανο.	Μάρτιος - Ιούνιος	*	*	*						*	
<i>Nycticorax nycticorax</i>	Νυχτοκόρακας		II				I	LC/NT		ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΟ. Ο οικότοπος αναπαραγωγής του είναι υγρότοποι γλυκού και αλμυρού νερού σε πολλά μέρη του κόσμου. Οι νυχτοκόρακες φωλιάζουν σε αποικίες σε πλατφόρμες με ξύλα σε συστάδες δέντρων ή στο έδαφος σε προστατευμένες τοποθεσίες όπως νησιά ή καλαμιώνες.	Το είδος μπορεί να απαντηθεί σε ολόκληρη την Περιοχή Μελέτης. Μπορεί επίσης να αναζητήσει την τροφή του στην ακτογραμμή.	Μάρτιος - Ιούνιος	*	*				*	*	*	*	*

Επιστημονική ονομασία	Κοινή ονομασία	ΠΑ 67/1981	Βέρνη	Βόννη	Σύμβαση της Βαρκελώνης	Οδηγία 92/43/ΕΟΚ	Οδηγία 2009/147/ΕΟΚ	IUCN/Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων ζώων της Ελλάδας	CITES	Οικολογία	Παρουσία εντός της Περιοχής Μελέτης	Ευαίσθητη Οικολογική Περίοδος	Περιοχές έργου									
													Πελοπόννησος (Χερσαίο Τμήμα)	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Χερσαία Ζώνη)	Κρήτη (Χερσαίο Τμήμα)	Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)	Νότιο Κρητικό Πέλαγος	Νότιο Αιγαίο Πέλαγος	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια Ζώνη & LF5)	Πατραϊκός Κόλπος
											Το πτηνό μπορεί να απαντηθεί και πάνω από ένα τμήμα της θαλάσσιας περιοχής μελέτης στο Νότιο Αιγαίο και τον Πατραϊκό Κόλπο.											
<i>Oenanthe hispanica</i>	Ασπροκωλίνα		II					LC/NE		ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΟ: Κατά την αναπαραγωγική περίοδο, απαντάται σε υπαίθριες εκτάσεις, άγονες εκτάσεις, άνυδρες εκτάσεις, στέπες, ψηλά οροπέδια και στις χαμηλότερες πλαγιές λόφων. Στις χειμερινές της περιοχές καταλαμβάνει παρόμοιους οικοτόπους σε ημίξηρες περιοχές, ανοιχτές εκτάσεις με αραιούς θάμνους και στα όρια καλλιεργημένων εκτάσεων, δείχνοντας ιδιαίτερη προτίμηση στο αμμώδες έδαφος.	Λιβάδια	Μάρτιος - Ιούνιος	*	*	*							
<i>Oenanthe oenanthe</i>	Σταχτοπετρόκλης		II					LC/NE		ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΟ: Κατά την αναπαραγωγική περίοδο, απαντάται σε υπαίθριες εκτάσεις, άγονες εκτάσεις, άνυδρες εκτάσεις, στέπες, ψηλά οροπέδια και στις χαμηλότερες πλαγιές λόφων. Στις χειμερινές της περιοχές καταλαμβάνει παρόμοιους οικοτόπους σε ημίξηρες περιοχές, ανοιχτές εκτάσεις με αραιούς θάμνους και στα όρια καλλιεργημένων εκτάσεων, δείχνοντας ιδιαίτερη προτίμηση στο αμμώδες έδαφος.	Λιβάδια	Μάρτιος - Ιούνιος	*	*	*							
<i>Oriolus oriolus</i>	Συκοφάγος		II					LC/NE		ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΟ. Το είδος απαντάται συνήθως σε ημι-ανοιχτά τοπία, μικτά πλατύφυλλα δάση και φυτείες, σε παραποτάμια δάση με ψηλές ιτιές (Salix) και λεύκες (Populus), δασωμένες στέπες, άλση, θαμνώδεις εκτάσεις, περιβόλια, πάρκα, μεγάλους κήπους,	Το είδος απαντάται σε ολόκληρη την Περιοχή Μελέτης.	Μάρτιος - Ιούνιος		*							*	

Επιστημονική ονομασία	Κοινή ονομασία	ΠΔ 67/1981	Βέρνη	Βόννη	Σύμβαση της Βαρκελώνης	Οδηγία 92/43/ΕΟΚ	Οδηγία 2009/147/ΕΟΚ	IUCN/Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων ζώων της Ελλάδας	CITES	Οικολογία	Παρουσία εντός της Περιοχής Μελέτης	Ευαίσθητη Οικολογική Περίοδος	Περιοχές έργου									
													Πελοπόννησος (Χερσαίο Τμήμα)	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Χερσαία Ζώνη)	Κρήτη (Χερσαίο Τμήμα)	Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)	Νότιο Κρητικό Πέλαγος	Νότιο Αιγαίο Πέλαγος	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια Ζώνη & LF5)	Πατραϊκός Κόλπος
										φυτοφράκτες, δεντροστοιχίες σε λεωφόρους και άλλες συστάδες δέντρων σε καλλιεργημένες εκτάσεις. Εμφανίζεται επίσης σε μεγαλύτερα και πιο συνεχή δάση φυλλοβόλων, κωνοφόρων ή μικτά δάση στην Ανατολική Ευρώπη												
<i>Otus scops</i>	Γκιώνης		II					LC/NE	II	ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΟ. Προτιμά τα δάση, τις σαβάνες, τις θαμνώδεις εκτάσεις, τα λιβάδια τόσο τεχνητά όσο και χερσαία.	Το είδος απαντάται σε ολόκληρη την περιοχή μελέτης κατά τη μετανάστευση του.	Μάρτιος - Ιούνιος	*	*							*	
<i>Panurus biarmicus</i>	Μουστακαλής		II					LC/NE		Το είδος ειδικεύεται στους υγροτόπους και αναπαράγεται αποικιακά σε μεγάλους καλαμιώνες δίπλα σε λίμνες ή βάλτους. Τρώει αφίδες καλαμιών το καλοκαίρι και σπόρους καλαμιών το χειμώνα, ενώ το πεπτικό του σύστημα αλλάζει για να αντιμετωπίσει τις πολύ διαφορετικές εποχιακές δίαιτες	Καλαμιώνες	Μάρτιος - Ιούνιος	*	*								
<i>Parus major</i>	Καλόγερος		II					LC/NE		Αυτό το είδος μπορεί να απαντηθεί σε άνυδρες περιοχές και καλλιεργημένες εκτάσεις.	Το είδος απαντάται σε ολόκληρη την Περιοχή Μελέτης.	Μάρτιος - Ιούνιος	*	*	*							
<i>Passer domesticus</i>	Σπιτοσπουργίτης		III					LC/NE		Αυτό το είδος μπορεί να απαντηθεί σε άνυδρες περιοχές, καλλιεργημένες εκτάσεις και αστικές περιοχές.	Το είδος απαντάται σε ολόκληρη την Περιοχή Μελέτης.	Μάρτιος - Ιούνιος	*	*								
<i>Passer hispaniolensis</i>	Χωραφοσπουργίτης							LC/NE		Αυτό το είδος απαντάται κυρίως σε υγρές περιοχές κοντά σε νερό με δέντρα και θάμνους. Συνήθως συνδέεται με τις καλλιέργειες, ενώ κατά τόπους επεκτείνεται και σε πιο άνυδρες στέπες και ημιερήμους ενώ διεισδύει και σε αστικές περιοχές εάν δεν υπάρχει παρουσία <i>Passer domesticus</i> .	Το είδος απαντάται σε ολόκληρη την Περιοχή Μελέτης.	Μάρτιος - Ιούνιος	*	*	*							*
<i>Passer italiae</i>	Ιταλικό σπουργίτι							VU/NE		Στρουθιόμορφο πουλί της οικογένειας των σπουργιτιών Passeridae, που απαντάται στην Ιταλία και σε άλλα μέρη της περιοχής της		Μάρτιος - Ιούνιος			*							

Επιστημονική ονομασία	Κοινή ονομασία	ΠΑ 67/1981	Βέρνη	Βόννη	Σύμβαση της Βαρκελώνης	Οδηγία 92/43/ΕΟΚ	Οδηγία 2009/147/ΕΟΚ	IUCN/Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων ζώων της Ελλάδας	CITES	Οικολογία	Παρουσία εντός της Περιοχής Μελέτης	Ευαίσθητη Οικολογική Περίοδος	Περιοχές έργου											
													Πελοπόννησος (Χερσαίο Τμήμα)	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Χερσαία Ζώνη)	Κρήτη (Χερσαίο Τμήμα)	Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)	Νότιο Κρητικό Πέλαγος	Νότιο Αιγαίο Πέλαγος	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια Ζώνη & LF5)	Πατραϊκός Κόλπος		
										Μεσογείου. Εμφανισιακά, είναι κάτι ανάμεσα στον σπιτοσπουργίτη και τον ισπανικό σπουργίτη, ένα είδος της Μεσογείου και της Κεντρικής Ασίας που είναι συγγενές με τον σπιτοσπουργίτη. Ο ιταλικός σπουργίτης εμφανίζεται στη βόρεια Ιταλία και στις γειτονικές περιοχές, με ενδιαμέσα πτηνά με τον σπιτοσπουργίτη σε μια πολύ στενή ζώνη επαφής στις Άλπεις, με αργή διαβάθμιση της εμφάνισης από τον ιταλικό σπουργίτη στον ισπανικό σπουργίτη στην κεντρική και νότια Ιταλία και περισσότερα πτηνά ενδιαμεσης εμφάνισης στη Μάλτα, την Κρήτη και άλλα μέρη της Μεσογείου. Ο ιταλικός σπουργίτης απαντάται στις ανθρώπινες κατοικίες, καθώς κατοικεί στις πόλεις, τις κωμοπόλεις και τις αγροτικές περιοχές.														
<i>Passer montanus</i>	Δεντροσπουργίτη ς							LC/NE		Ο δεντροσπουργίτης είναι ευρέως διαδεδομένος στις κωμοπόλεις και τις πόλεις της ανατολικής Ασίας, αλλά στην Ευρώπη προτιμά την ανοιχτή ύπαιθρο με ελαφρώς δασώδεις εκτάσεις.	Δασικές εκτάσεις	Μάρτιος - Ιούνιος	*	*	*									
<i>Pelecanus crispus</i>	Αργυροπελεκάνος		II	II			I	VU/VU	I	ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΕΙΔΟΣ ΠΟΥ ΦΩΛΙΑΖΕΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ, ΕΠΙΣΗΣ ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΟ. Ο αργυροπελεκάνος απαντάται σε λίμνες, ποτάμια, δέλτα και εκβολές ποταμών. Σε σύγκριση με τον ροδοπελεκάνο, ο αργυροπελεκάνος δεν είναι τόσο συσχετισμένος με τις πεδινές περιοχές και φωλιάζει σε κατάλληλους υγροτόπους με πολλές κλίσεις. Είναι λιγότερο ευκαιριακός στην επιλογή των οικοτόπων αναπαραγωγής του σε σχέση με τον ροδοπελεκάνο, ενώ συνήθως επιστρέφει σε μια παραδοσιακή περιοχή αναπαραγωγής χρόνο με τον χρόνο, εκτός εάν αυτή έχει καταστεί εντελώς ακατάλληλη. Κατά τη διάρκεια του χειμώνα, οι αργυροπελεκάνοι μένουν συνήθως σε λίμνες χωρίς πάγο στην Ευρώπη ή σε jheels (εποχιακές λίμνες) στην Ινδία. Επισκέπτονται επίσης, συνήθως κατά τη διάρκεια του χειμώνα, παράκτιες περιοχές κατά μήκος προστατευμένων ακτών για να αναζητήσουν τροφή.	Λίμνες. Μπορεί επίσης να αναζητήσει την τροφή του στην ακτογραμμή. Το πτηνό μπορεί να απαντηθεί και πάνω από ένα τμήμα της θαλάσσιας περιοχής μελέτης στο Νότιο Αιγαίο και τον Πατραϊκό Κόλπο.	Μάρτιος - Ιούνιος		*				*	*	*	*	*	*	

Επιστημονική ονομασία	Κοινή ονομασία	ΠΑ 67/1981	Βέρνη	Βόννη	Σύμβαση της Βαρκελώνης	Οδηγία 92/43/ΕΟΚ	Οδηγία 2009/147/ΕΟΚ	IUCN/Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων ζώων της Ελλάδας	CITES	Οικολογία	Παρουσία εντός της Περιοχής Μελέτης	Ευαίσθητη Οικολογική Περίοδος	Περιοχές έργου											
													Πελοπόννησος (Χερσαίο Τμήμα)	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Χερσαία Ζώνη)	Κρήτη (Χερσαίο Τμήμα)	Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)	Νότιο Κρητικό Πέλαγος	Νότιο Αιγαίο Πέλαγος	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια Ζώνη & LF5)	Πατραϊκός Κόλπος		
<i>Periparus ater</i>	Ελατοπαπαδίτσα							LC/NE		Είναι συνήθως ένα πτηνό που προτιμά τα εύκρατα υγρά δάση κωνοφόρων, ενώ παρουσιάζει επίσης μικρή ιδιαιτερότητα ως προς τον οικότοπό του.	Δάση κωνοφόρων	Μάρτιος - Ιούνιος	*	*										
<i>Pernis apivorus</i>	Σφηκιάρης			II			I	LC/LC	II	ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΟ: Αναπαράγεται σε δάση και είναι δυσδιάκριτος εκτός από την άνοιξη, όπου χτυπάει τα φτερά του για να ξευγαρώσει. Τα αρσενικά προστατεύουν έντονα την περιοχή τους κατά την περίοδο αναπαραγωγής.	Δασικές εκτάσεις	Μάρτιος - Ιούνιος	*	*										
<i>Petronia petronia</i>	Πετρόστρουθος		II				I	LC/NE		Αναπαράγεται σε διάφορους οικότοπους με γυμνές επιφάνειες: βράχους, χαράδρες, ρέματα, λατομεία, βραχώδεις εκτάσεις ερήμου, ανοιχτό έδαφος με τείχη, ερείπια ακόμη και κατειλημμένα κτίρια, τοπικά επίσης αλπικά λιβάδια με ογκόλιθους, καλλιέργειες. Μόνιμο είδος. Κοινωνικό πτηνό, που μπορεί να παρατηρηθεί σε μεγάλα σμήνη στη μη αναπαραγωγική του περίοδο. Φωλιάζει μέσα σε κοιλότητες βράχων ή σε σχισμές. Επισκέπτονται επίσης, συνήθως κατά τη διάρκεια του χειμώνα, παράκτιες περιοχές κατά μήκος προστατευμένων ακτών για να αναζητήσουν τροφή.	Το είδος μπορεί να απαντηθεί σε ολόκληρη την Περιοχή Μελέτης.	Μάρτιος - Ιούνιος	*	*										
<i>Phalacrocorax aristotelis desmarestii</i>	Θαλασσοκόρακας		II				I	LC/NT		ΘΑΛΑΣΣΙΟ. Αναπαράγεται γύρω από τις βραχώδεις ακτές της δυτικής και νότιας Ευρώπης, της νοτιοδυτικής Ασίας και της βόρειας Αφρικής, ενώ διαχειμάζει κυρίως στην περιοχή αναπαραγωγής του εκτός από τα βορειότερα πτηνά. Τρέφεται στη θάλασσα και, σε αντίθεση με τον Μεγάλο Κορμοράνο, εμφανίζεται σπάνια στην ενδοχώρα. Διαχειμάζει σε οποιαδήποτε ακτή όπου υπάρχουν άφθονα ψάρια. Διανύει πολλά χιλιόμετρα από τις τοποθεσίες που ζει για να αναζητήσει τροφή. Αναπαράγεται στις ακτές, φωλιάζει σε βραχώδεις προεξοχές ή σε σχισμές ή μικρές σπηλιές. Οι φωλιές	Το είδος μπορεί να απαντηθεί σε ολόκληρη την Περιοχή Μελέτης. Μπορεί επίσης να αναζητήσει την τροφή του στην ακτογραμμή. Το πτηνό μπορεί να απαντηθεί και πάνω από ένα τμήμα της θαλάσσιας περιοχής μελέτης στο	Μάρτιος - Ιούνιος				*	*	*	*	*	*	*	*	*

Επιστημονική ονομασία	Κοινή ονομασία	ΠΑ 67/1981	Βέρνη	Βόννη	Σύμβαση της Βαρκελώνης	Οδηγία 92/43/ΕΟΚ	Οδηγία 2009/147/ΕΟΚ	IUCN/Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων ζώων της Ελλάδας	CITES	Οικολογία	Παρουσία εντός της Περιοχής Μελέτης	Ευαίσθητη Οικολογική Περίοδος	Περιοχές έργου											
													Πελοπόννησος (Χερσαίο Τμήμα)	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Χερσαία Ζώνη)	Κρήτη (Χερσαίο Τμήμα)	Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)	Νότιο Κρητικό Πέλαγος	Νότιο Αιγαίο Πέλαγος	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια Ζώνη & LF5)	Πατραϊκός Κόλπος		
										τους είναι ακατάστατοι σωροί από σάπια φύκια ή κλαδάκια που ενώνει με το γκουανό του.	Νότιο Κρητικό Πέλαγος. Το είδος μπορεί επίσης να απαντηθεί σε ολόκληρη την παραθαλάσσια περιοχή μελέτης στην LF2 κατά τη μετανάστευση του. Μπορεί επίσης να αναζητά την τροφή του στην παραλία, αν και θεωρείται πολύ απίθανο. Το πτηνό μπορεί να απαντηθεί και πάνω από ένα τμήμα της θαλάσσιας περιοχής μελέτης στο Νότιο Αιγαίο και τον Πατραϊκό Κόλπο.													
<i>Phalacrocorax carbo</i>	Κορμοράνος							LC/NE		Τρέφεται στη θάλασσα, στις εκβολές ποταμών και σε λίμνες και ποτάμια γλυκού νερού. Ο κορμοράνος φωλιάζει συχνά σε αποικίες κοντά σε υγροτόπους, ποτάμια και προστατευμένα παράκτια νερά. Τα ζευγάρια χρησιμοποιούν την ίδια θέση για να αναπαράγονται κάθε χρόνο.	Λίμνες, εκβολές ποταμών	Μάρτιος - Ιούνιος		*										
<i>Phalacrocorax pygmaeus</i>	Λαγγόνα						I	LC/NE		Αναπαράγεται στη νοτιοανατολική Ευρώπη και τη νοτιοδυτική Ασία. Είναι εν μέρει μεταναστευτικό, με τους βόρειους πληθυσμούς να διαχειμάζουν νοτιότερα, κυρίως εντός της περιοχής αναπαραγωγής του. Σπανίως εντοπίζεται στη δυτική Ευρώπη. Στη λαγγόνα αρέσουν οι υδάτινοι όγκοι με άφθονη βλάστηση, οι λίμνες και τα δέλτα των ποταμών. Εγκαταλείπει τις ορεινές και ψυχρές και ξηρές περιοχές. Λατρεύει τους ορυζώνες ή άλλες πλημμυρισμένες περιοχές όπου μπορεί να βρει θάμνους και δέντρα. Κατά τη	Λίμνες	Μάρτιος - Ιούνιος	*	*										

Επιστημονική ονομασία	Κοινή ονομασία	ΠΑ 67/1981	Βέρνη	Βόννη	Σύμβαση της Βαρκελώνης	Οδηγία 92/43/ΕΟΚ	Οδηγία 2009/147/ΕΟΚ	IUCN/Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων ζώων της Ελλάδας	CITES	Οικολογία	Παρουσία εντός της Περιοχής Μελέτης	Ευαίσθητη Οικολογική Περίοδος	Περιοχές έργου										
													Πελοπόννησος (Χερσαίο Τμήμα)	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Χερσαία Ζώνη)	Κρήτη (Χερσαίο Τμήμα)	Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)	Νότιο Κρητικό Πέλαγος	Νότιο Αιγαίο Πέλαγος	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια Ζώνη & LF5)	Πατραϊκός Κόλπος	
										διάρκεια του χειμώνα απαντάται επίσης συχνά σε νερά με υψηλότερη αλατότητα, σε εκβολές ποταμών ή σε λίμνες φραγμάτων. Υπάρχουν πουλιά που μπορούν να ζουν μοναχικά ή σε ομάδες και είναι κατά κάποιο τρόπο προσαρμοσμένα στην ανθρώπινη παρουσία. Φτιάχνουν τη φωλιά από κλαδιά και καλάμια σε περιοχές με πυκνή βλάστηση, σε δέντρα, θάμνους, ιτιές αλλά σποραδικά σε καλάμια (πάνω σε μικρές πλωτές νησίδες). Συχνά μοιράζονται τον ίδιο τύπο οικοτόπου με τους τσικνιάδες, τους ερωδιούς και τις πλαταλείνες.													
<i>Phasianus colchicus</i>	Φασιανός						II	LC/CR		Απαντάται σε δασικές εκτάσεις, γεωργικές εκτάσεις, θάμνους και υγροτόπους. Στο φυσικό του περιβάλλον ο φασιανός ζει σε λιβάδια κοντά σε νερό με μικρά δέντρα. Μπορεί να απαντηθεί οριακά και σε γεωργικές εκτάσεις με χαμηλή βλάστηση όπου δεν μπορούν να επιβιώσουν αυτοσυντηρούμενοι πληθυσμοί για πολύ. Οι φασιανοί τρέφονται αποκλειστικά στο έδαφος, αλλά ζουν σε προστατευμένα δέντρα τη νύχτα. Τρώνε διάφορες τροφές ζωικού και λαχανικού τύπου, όπως φρούτα, σπόρους και φύλλα, καθώς και ένα ευρύ φάσμα ασπόνδυλων, καθώς και μικρά σπονδυλωτά όπως φίδια, σαύρες, μικρά θηλαστικά και πτηνά περιστασιακά.	Δασικές εκτάσεις	Μάρτιος - Ιούνιος											
<i>Philomachus pugnax</i>	Μαχητής			II				LC/NE		Μεσαίου μεγέθους πτηνό παρυδάτιο που αναπαράγεται σε έλη και υγρά λιβάδια	Έλη	Μάρτιος - Ιούνιος		*									
<i>Phoenicurus ochruros</i>	Καρβουνιάρης		II					LC/NE		Το είδος κατοικούσε αρχικά σε πετρώδη εδάφη σε βουνά, και ιδιαίτερα σε γκρεμούς	Γκρεμοί	Μάρτιος - Ιούνιος	*	*									
<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	Κοκκινούρης		II					LC/NE		Το είδος προτιμά τα ανοιχτά ώριμα δάση σημύδας και βελανιδιάς με υψηλή οριζόντια ορατότητα και μικρές ποσότητες θάμνων και χαμηλής βλάστησης, ειδικά εκεί όπου τα δέντρα είναι αρκετά μεγάλα ώστε να έχουν τρύπες κατάλληλες για να φτιάξει τη φωλιά του.	Δασικές εκτάσεις	Μάρτιος - Ιούνιος		*									

Επιστημονική ονομασία	Κοινή ονομασία	ΠΔ 67/1981	Βέρνη	Βόνη	Σύμβαση της Βαρκελώνης	Οδηγία 92/43/ΕΟΚ	Οδηγία 2009/147/ΕΟΚ	IUCN/Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων ζώων της Ελλάδας	CITES	Οικολογία	Παρουσία εντός της Περιοχής Μελέτης	Ευαίσθητη Οικολογική Περίοδος	Περιοχές έργου										
													Πελοπόννησος (Χερσαίο Τμήμα)	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Χερσαία Ζώνη)	Κρήτη (Χερσαίο Τμήμα)	Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)	Νότιο Κρητικό Πέλαγος	Νότιο Αιγαίο Πέλαγος	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια Ζώνη & LF5)	Πατραϊκός Κόλπος	
<i>Phylloscopus collybita</i>	Δενδροφυλλοσκόπος							LC/NE		ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΟ. Αυτό το είδος αναπαράγεται σε πεδινές περιοχές, σε υγρά και σκιερά φυλλοβόλα δάση, συνήθως οξιάς (Fagus), μικτής βελανιδιάς (Quercus), κουκουναριάς (Carpinus) και καστανιάς (Castanea), με κλειστό θόλο και αραιή χαμηλή βλάστηση. Απαντάται επίσης σε μικτές συστάδες ελάτης (Picea), σκλήθρας (Alnus), σημύδας (Betula), πεύκου (Pinus) ή περιστασιακά φράξινου (Fraxinus). Βέλτιστες περιοχές αναπαραγωγής του είναι οι μικτές συστάδες με δέντρα μικτής ηλικίας σε μεγάλη απόσταση μεταξύ τους.	Το είδος μπορεί να απαντηθεί σε ολόκληρη την περιοχή μελέτης κατά τη μετανάστευση του.	Μάρτιος - Ιούνιος	*	*									
<i>Phylloscopus orientalis</i>	Πευκογιαννούδι							LC/NE		ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΟ. Αυτό το είδος αναπαράγεται σε πεδινές περιοχές, σε υγρά και σκιερά φυλλοβόλα δάση, συνήθως οξιάς (Fagus), μικτής βελανιδιάς (Quercus), κουκουναριάς (Carpinus) και καστανιάς (Castanea), με κλειστό θόλο και αραιή χαμηλή βλάστηση. Απαντάται επίσης σε μικτές συστάδες ελάτης (Picea), σκλήθρας (Alnus), σημύδας (Betula), πεύκου (Pinus) ή περιστασιακά φράξινου (Fraxinus). Βέλτιστες περιοχές αναπαραγωγής του είναι οι μικτές συστάδες με δέντρα μικτής ηλικίας σε μεγάλη απόσταση μεταξύ τους.	Το είδος μπορεί να απαντηθεί σε ολόκληρη την περιοχή μελέτης κατά τη μετανάστευση του.	Μάρτιος - Ιούνιος		*									
<i>Phylloscopus sibillatrix</i>	Δασοψάλτης							NE/NE		ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΟ. Αυτό το είδος αναπαράγεται σε πεδινές περιοχές, σε υγρά και σκιερά φυλλοβόλα δάση, συνήθως οξιάς (Fagus), μικτής βελανιδιάς (Quercus), κουκουναριάς (Carpinus) και καστανιάς (Castanea), με κλειστό θόλο και αραιή χαμηλή βλάστηση. Απαντάται επίσης σε μικτές συστάδες ελάτης (Picea), σκλήθρας (Alnus), σημύδας (Betula), πεύκου (Pinus) ή περιστασιακά φράξινου (Fraxinus). Βέλτιστες περιοχές αναπαραγωγής του είναι οι μικτές συστάδες με δέντρα μικτής ηλικίας σε μεγάλη απόσταση μεταξύ τους.	Το είδος μπορεί να απαντηθεί σε ολόκληρη την περιοχή μελέτης κατά τη μετανάστευση του.	Μάρτιος - Ιούνιος	*								*		

Επιστημονική ονομασία	Κοινή ονομασία	ΠΔ 67/1981	Βέρνη	Βόννη	Σύμβαση της Βαρκελώνης	Οδηγία 92/43/ΕΟΚ	Οδηγία 2009/147/ΕΟΚ	IUCN/Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων ζώων της Ελλάδας	CITES	Οικολογία	Παρουσία εντός της Περιοχής Μελέτης	Ευαίσθητη Οικολογική Περίοδος	Περιοχές έργου									
													Πελοπόννησος (Χερσαίο Τμήμα)	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Χερσαία Ζώνη)	Κρήτη (Χερσαίο Τμήμα)	Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)	Νότιο Κρητικό Πέλαγος	Νότιο Αιγαίο Πέλαγος	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια Ζώνη & LF5)	Πατραϊκός Κόλπος
<i>Phylloscopus trochilus</i>	Θαμνοφυλλοσκόπος							LC/NE		ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΟ. Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγικής περιόδου, αυτό το είδος κατοικεί σε φυλλοβόλα και μικτά δάση στα οποία κυριαρχεί σε μεγάλο βαθμό η σημύδα (Betula), αλλά και σε αλσύλλια σημύδας και ιτιάς (Salix) και σε θάμνους στην αρκτική τούνδρα. Σε κεντρικές περιοχές απαντάται σε εύκρατα ερείκη, ξέφωτα δασών, υγρές περιοχές με σκλήθρα (Alnus) και ιτιές καθώς και δευτερευόντως σε θάμνους και θαμνώδεις περιοχές μακριά από δέντρα. Χρησιμοποιεί γενικά διάφορες τοποθεσίες, συμπεριλαμβανομένων μεγάλων κατάφυτων κήπων, οπωρώνων, φτακτών, αναχωμάτων σιδηροδρόμων και ανώμαλων βοσκοτόπων με χορτολιβαδικές εκτάσεις.	Το είδος απαντάται σε ολόκληρη την περιοχή μελέτης κατά τη μετανάστευση του. Μπορεί επίσης να αναζητήσει την τροφή του στην ακτογραμμή, αν και σπάνια.	Μάρτιος - Ιούνιος									*	
<i>Pica pica</i>	Καρακάξα		III				II	LC/NE		Αναπαράγεται συνήθως γύρω από αγροκτήματα και χωριά όπου υπάρχουν λίγα δέντρα και συχνά επίσης σε μικρές εκτάσεις με γρασίδι ή γυμνό έδαφος. Συνηθίζεται επίσης στις αστικές περιοχές. Για τον λόγο αυτόν, συνδέεται με την ανθρώπινη παρουσία, η οποία του προσφέρει το πλεονέκτημα να βρίσκει έτοιμη τροφή και καλή προστασία από τα αρπακτικά.	Το είδος απαντάται σε ολόκληρη την Περιοχή Μελέτης.	Μάρτιος - Ιούνιος	*	*								
<i>Picus viridis</i>	Πρασινοτσιλιτάρια							LC/NE		Φωλιάζει σε υπεραιωνόβια φυλλοβόλα δέντρα και σε σημεία όπου μπορεί να αναζητήσει σε κοντινή απόσταση την τροφή του με άφθονα μυρμήγκια. Αυτά είναι συνήθως ημι-ανοιχτά τοπία με μικρές δασικές εκτάσεις, φυτοφράκτες, διάσπαρτα υπεραιωνόβια δέντρα, άκρες δασών και αλλουβιακά δάση. Κατάλληλοι οικότοποι για αναζήτηση τροφής περιλαμβάνουν λιβάδια, ρείκια, φυτείες, οπωρώνες και εκτάσεις με γρασίδι	Δάση φυλλοβόλων	Μάρτιος - Ιούνιος	*	*								
<i>Platalea leucorodia</i>	Χουλιαρομούτα		II	II			I	LC/LC	II	Αναπαράγεται από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ισπανία στα δυτικά μέχρι την Ιαπωνία και επίσης στη Βόρεια Αφρική. Στην Ευρώπη, μόνο η Ολλανδία, η Ισπανία, η Αυστρία, η Ουγγαρία και η	Λίμνες	Μάρτιος - Ιούνιος										

Επιστημονική ονομασία	Κοινή ονομασία	ΠΔ 67/1981	Βέρνη	Βόννη	Σύμβαση της Βαρκελώνης	Οδηγία 92/43/ΕΟΚ	Οδηγία 2009/147/ΕΟΚ	IUCN/Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων ζώων της Ελλάδας	CITES	Οικολογία	Παρουσία εντός της Περιοχής Μελέτης	Ευαίσθητη Οικολογική Περίοδος	Περιοχές έργου														
													Πελοπόννησος (Χερσαίο Τμήμα)	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Χερσαία Ζώνη)	Κρήτη (Χερσαίο Τμήμα)	Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)	Νότιο Κρητικό Πέλαγος	Νότιο Αιγαίο Πέλαγος	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια Ζώνη & LF5)	Πατραϊκός Κόλπος					
										Ελλάδα έχουν μεγάλους πληθυσμούς. Τα περισσότερα πτηνά μεταναστεύουν στις τροπικές περιοχές τον χειμώνα, ενώ οι Ευρωπαϊκοί πληθυσμοί κατευθύνονται κυρίως στην Αφρική, αλλά μερικά άτομα παραμένουν σε περιοχές της δυτικής Ευρώπης με ήπιους χειμώνες νότια του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι χουλιαρομύτες δείχνουν προτίμηση στους εκτεταμένους ρηχούς, υγροτόπους με λασπώδη, αργιλώδη ή αμμώδη πυθμένα. Μπορούν να κατοικήσουν σε οποιονδήποτε τύπο ελών, ποταμών, λιμνών, πλημμυρισμένων περιοχών και μαγγρόβιων βάλτων, είτε γλυκού, υφάλμυρου ή αλμυρού νερού, αλλά ιδίως εκεί όπου υπάρχουν νησιά για να φωλιάσουν ή πυκνή αναδυόμενη βλάστηση (π.χ. καλαμιώνες) και διάσπαρτα δέντρα ή θάμνοι (ειδικά ιτιά Salix spp., δρυς Quercus spp. ή λεύκα Populus spp.). Οι χουλιαρομύτες μπορεί επίσης να συχνάζουν σε προστατευμένους θαλάσσιους οικοτόπους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, όπως δέλτα, εκβολές ποταμών, παλιρροιακούς κολπίσκους και παράκτιες λιμνοθάλασσες. Η διατροφή τους αποτελείται από ενήλικα και προνυμφικά υδρόβια έντομα, μαλάκια, μαλακόστρακα, σκουλήκια, βδέλλες, βατράχους, γυρίνους και μικρά ψάρια μήκους έως 10–15 cm. Μπορεί επίσης να τραφούν με φύκια ή κομμάτια υδρόβιων φυτών																	
Plegadis falcinellus	Χαλκόκοτα		II	II			I	LC/CR		ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΣΕ ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΖΩΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ. Είναι το πιο διαδεδομένο είδος ίβιδας, που αναπαράγεται σε διάσπαρτες τοποθεσίες σε θερμές περιοχές της Ευρώπης, της Ασίας, της Αφρικής, της Αυστραλίας και της περιοχής του Ατλαντικού και της Καραϊβικής. Αυτό το είδος είναι αποδημητικό. Τα περισσότερα ευρωπαϊκά πτηνά διαχειμάζουν στην Αφρική. Η χαλκόκοτα τρέφεται σε πολύ ρηχά νερά και φωλιάζει σε γλυκά νερά ή υφάλμυρους υγροτόπους με ψηλές πυκνές συστάδες αναδυόμενης βλάστησης όπως καλάμια, πάπυροι ή βούρλα) και χαμηλά δέντρα ή θάμνους. Δείχνει προτίμηση στα έλη στις άκρες	Το είδος μπορεί να απαντηθεί σε ολόκληρη την Περιοχή Μελέτης. Μπορεί επίσης να αναζητήσει την τροφή του στην ακτογραμμή. Το πτηνό μπορεί να απαντηθεί και πάνω από ένα τμήμα της θαλάσσιας	Μάρτιος - Ιούνιος															

Επιστημονική ονομασία	Κοινή ονομασία	ΠΔ 67/1981	Βέρνη	Βόνη	Σύμβαση της Βαρκελώνης	Οδηγία 92/43/ΕΟΚ	Οδηγία 2009/147/ΕΟΚ	IUCN/Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων ζώων της Ελλάδας	CITES	Οικολογία	Παρουσία εντός της Περιοχής Μελέτης	Ευαίσθητη Οικολογική Περίοδος	Περιοχές έργου										
													Πελοπόννησος (Χερσαίο Τμήμα)	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Χερσαία Ζώνη)	Κρήτη (Χερσαίο Τμήμα)	Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)	Νότιο Κρητικό Πέλαγος	Νότιο Αιγαίο Πέλαγος	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια Ζώνη & LF5)	Πατραϊκός Κόλπος	
										λιμνών και ποταμών, αλλά μπορεί να απαντηθεί επίσης σε λιμνοθάλασσες, κοίτες πλημμυρών, υγρά λιβάδια, βάλτους, ταμιευτήρες, τεχνητές λίμνες λυμάτων, ορυζώνες και αρδευόμενες γεωργικές εκτάσεις. Απαντάται λιγότερο συχνά σε παράκτιες τοποθεσίες όπως εκβολές ποταμών, δέλτα, αλμυρά έλη και παράκτιες λιμνοθάλασσες. Οι προτιμώμενες θέσεις ωοτοκίας του είναι συνήθως σε μεγάλα δέντρα που μπορεί να βρίσκονται μακριά από τις περιοχές σίτισης.	περιοχής μελέτης στο Νότιο Κρητικό Πέλαγος. Το είδος μπορεί επίσης να απαντηθεί σε ολόκληρη την παράκτια περιοχή μελέτης στο LF2 κατά τη μετανάστευση του. Μπορεί επίσης να αναζητά την τροφή του στην παραλία, αν και θεωρείται πολύ απίθανο. Το πτηνό μπορεί να απαντηθεί και πάνω από ένα τμήμα της θαλάσσιας περιοχής μελέτης στο Νότιο Αιγαίο και τον Πατραϊκό Κόλπο.												
<i>Podiceps cristatus</i>	Σκουφοβουτηχτάρι							LC/NE		Το σκουφοβουτηχτάρι αναπαράγεται σε περιοχές με βλάστηση όπου υπάρχουν λίμνες γλυκού νερού	Λίμνες	Μάρτιος - Ιούνιος		*									
<i>Podiceps nigricollis</i>	Μαυροβουτηχτάρι		II					LC/NE		Το σκουφοβουτηχτάρι αναπαράγεται σε περιοχές με βλάστηση όπου υπάρχουν λίμνες γλυκού νερού	Λίμνες	Μάρτιος - Ιούνιος		*									
<i>Poecile lugubris</i>	Κλειδωνάς		II					LC/NE		Ο κλειδωνάς εμφανίζεται σε περιοχές με χαμηλή πυκνότητα σε δασικές εκτάσεις με λεπτά δέντρα σε υψόμετρο μεταξύ 1000 και 1600 μέτρων πάνω από τη στάθμη της θάλασσας.	Δασικές εκτάσεις	Μάρτιος - Ιούνιος	*	*	*								
<i>Poecile montanus</i>	Βουνοπαπαδίτσα							LC/NE		Σκάβει τη δική της τρύπα για να φωλιάσει, τρυπώντας ακόμη και σκληρούς φλοιούς δέντρων, συνήθως σε σάπια κούτσουρα ή παλαιότερα δέντρα. Οι περισσότερες φωλιές που έχουν βρεθεί	Δασικές εκτάσεις	Μάρτιος - Ιούνιος											

Επιστημονική ονομασία	Κοινή ονομασία	ΠΔ 67/1981	Βέρνη	Βόνη	Σύμβαση της Βαρκελώνης	Οδηγία 92/43/ΕΟΚ	Οδηγία 2009/147/ΕΟΚ	IUCN/Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων ζώων της Ελλάδας	CITES	Οικολογία	Παρουσία εντός της Περιοχής Μελέτης	Ευαίσθητη Οικολογική Περίοδος	Περιοχές έργου											
													Πελοπόννησος (Χερσαίο Τμήμα)	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Χερσαία Ζώνη)	Κρήτη (Χερσαίο Τμήμα)	Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)	Νότιο Κρητικό Πέλαγος	Νότιο Αιγαίο Πέλαγος	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια Ζώνη & LF5)	Πατραϊκός Κόλπος		
										είναι κύπελλα από πιληματοποιημένα υλικά, όπως γούνα, τρίχες και ροκανίδια, αλλά μερικές φορές χρησιμοποιούνται και φτερά.														
<i>Poecile palustris</i>	Καστανοπαπαδίτσα								LC/NE	Αναπαράγεται κυρίως σε πεδινές περιοχές, αλλά μπορεί να φτάσει σε υψόμετρο έως και 1.300 m. Προτιμά τις μεγάλες εκτάσεις υγρών, πλατύφυλλων δασών, συχνά βελανιδιάς ή οξιάς, αν και μπορεί να κατοικήσει και σε υγρά δάση σκλήθρας, παραποτάμια δέντρα, πάρκα και κήπους ή περιβόλια.	Δάση φυλλοβόλων	Μάρτιος - Ιούνιος		*										
<i>Porzana porzana</i>	Στικτοπουλάδα		II	II			I		LC/DD	Ο βιότοπος αναπαραγωγής της είναι έλη και εκτάσεις με βούρλα σε όλη την εύκρατη Ευρώπη έως τη δυτική Ασία. Φωλιάζει σε ξηρές τοποθεσίες μέσα σε εκτάσεις με ελώδη βλάστηση. Αυτό το είδος είναι αποδημητικό και διαχειμάζει στην Αφρική και το Πακιστάν. Τα πουλιά αυτά ψάχνουν με το ράμφος τους μέσα στη λάσπη ή σε ρηχά νερά, εντοπίζοντας επίσης την τροφή τους με την όραση. Τρώνε κυρίως έντομα και υδρόβια ζώα.	Έλη	Μάρτιος - Ιούνιος		*										
<i>Prunella collaris</i>	Χιονοψάλτης								LC/NE	Απαντάται σε όλα τα βουνά της νότιας εύκρατης Ευρώπης, του Λιβάνου και της Ασίας σε υψόμετρα άνω των 2.000 μ. Είναι πουλί των γυμνών ορεινών περιοχών με λίγη χαμηλή βλάστηση.	Λιβάδια. Πιθανώς να μην απαντηθεί.	Μάρτιος - Ιούνιος	*											
<i>Ptyonoprogne rupestris</i>	Βραχοχελίδονο								LC/NE	Αναπαράγεται σε ξηρούς, ζεστούς και προστατευμένους βράχους σε ορεινές περιοχές με γκρεμούς και χαράδρες.	Γκρεμοί	Μάρτιος - Ιούνιος	*	*	*									
<i>Puffinus yelkouan</i>	Μύχος της Μεσογείου		II		II		I		LC (Ευρώπη), VU (Παγκοσμίως)/ NT	ΘΑΛΑΣΣΙΟ. Μεσαίου μεγέθους μύχος που ανήκει στην οικογένεια των θαλασσοπουλιών. Αναπαράγεται σε νησιά και παράκτιους βράχους στην ανατολική και κεντρική Μεσόγειο. Τα περισσότερα διαχειμάζουν εκεί, αν και κάποια εισέρχονται στον Ατλαντικό στα τέλη του καλοκαιριού. Αυτό το είδος φωλιάζει σε λαγούμια τα οποία επισκέπτονται μόνο τη νύχτα για να αποφύγουν τη θήρευσή τους από μεγάλους γλάρους.	Μπορεί να απαντηθεί σε όλη τη διαδρομή του υπεράκτιου αγωγού, αν και πιθανότατα κοντά στην ακτή.	Μάρτιος - Ιούνιος						*	*					

Επιστημονική ονομασία	Κοινή ονομασία	ΠΔ 67/1981	Βέρνη	Βόννη	Σύμβαση της Βαρκελώνης	Οδηγία 92/43/ΕΟΚ	Οδηγία 2009/147/ΕΟΚ	IUCN/Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων ζώων της Ελλάδας	CITES	Οικολογία	Παρουσία εντός της Περιοχής Μελέτης	Ευαίσθητη Οικολογική Περίοδος	Περιοχές έργου										
													Πελοπόννησος (Χερσαίο Τμήμα)	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Χερσαία Ζώνη)	Κρήτη (Χερσαίο Τμήμα)	Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)	Νότιο Κρητικό Πέλαγος	Νότιο Αιγαίο Πέλαγος	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια Ζώνη & LF5)	Πατραϊκός Κόλπος	
<i>Rallus aquaticus</i>	Νεροκοτσέλα						II	LC/NE		Αναπαράγεται σε υγροτόπους με καλή βλάστηση σε όλη την Ευρώπη, την Ασία και τη Βόρεια Αφρική. Η νεροκοτσέλα αναπαράγεται σε καλαμιώνες και σε άλλες ελώδεις τοποθεσίες με ψηλή, πυκνή βλάστηση, χτίζοντας τη φωλιά της λίγο πιο πάνω από τη στάθμη του νερού με ό,τι φυτά υπάρχουν τριγύρω. Αυτό το είδος μπορεί να αναπαραχθεί μετά το πρώτο έτος ζωής του και συνήθως γεννά δύο ομάδες αυγών σε κάθε εποχή. Είναι παμφάγο, αν και τρέφεται κυρίως με ζώα. Προστατεύει έντονα την περιοχή του ακόμη και μετά την αναπαραγωγή και υπερασπίζεται επιθετικά τις περιοχές σίτισής του τον χειμώνα.	Λίμνες	Μάρτιος - Ιούνιος	*	*									
<i>Regulus ignicapilla</i>	Πυροβασιλίσκος							LC/NE		Αναπαράγεται σε πεδινά πλατύφυλλα δάση, με προτίμηση στη φελλόδρου και τη σκλήθρα όπου υπάρχει, διαφορετικά την οξιά και το πουρνάρι. Χρησιμοποιεί επίσης μικτά δάση πλατύφυλλων και κωνοφόρων δέντρων και συστάδες από πικέα, λευκή ελάτη, κέδρο και πεύκα, συχνά με χαμηλή βλάστηση από άρκευθο, κισσό και άγριο τριαντάφυλλο. Σε ξηρότερους μεσογειακούς βιότοπους, απαντάται σε δάση με κωνοφόρα, αειθαλείς βελανιδιές και μικτά δάση έως 2.800 m.	Δάση φυλλοβόλων	Μάρτιος - Ιούνιος	*	*									
<i>Regulus regulus</i>	Χρυσοβασιλίσκος							LC/NE		Ο χρυσοβασιλίσκος αναπαράγεται σε ώριμα πεδινά και ορεινά κωνοφόρα δάση, κυρίως μέχρι τα 3.000 m. Προτιμά την πικέα, η λάριξ, το δασικό πεύκο, τη λευκή ελάτη και το ορεινό πεύκο, ενώ σε ανθρωπογενή τοπία κατοικεί επίσης και σε κωνοφόρα δέντρα όπως η ψευδοτσούγκα του Μένζιζ.	Δάση κωνοφόρων	Μάρτιος - Ιούνιος	*										
<i>Remiz pendulinus</i>	Υφάντρα							LC/NE		Ένα πολύ μικρό πουλί που κατοικεί σε πλούσια σε δέντρα όρια ελών όπου χτίζει χαρακτηριστικές φωλιές σε σχήμα θήκης, συχνά πάνω από το νερό. Διαθέτει αιχμηρό και μυτερό ράμφος, καφετί ράχη και μαύρη μουσούδα (στενή στα θηλυκά) που το κάνουν να μοιάζει με κεφαλά σε μικρογραφία. Στους νεοσσούς το σώμα είναι όλο καφέ	Έλη	Μάρτιος - Ιούνιος	*	*									

Επιστημονική ονομασία	Κοινή ονομασία	ΠΑ 67/1981	Βέρνη	Βόννη	Σύμβαση της Βαρκελώνης	Οδηγία 92/43/ΕΟΚ	Οδηγία 2009/147/ΕΟΚ	IUCN/Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων ζώων της Ελλάδας	CITES	Οικολογία	Παρουσία εντός της Περιοχής Μελέτης	Ευαίσθητη Οικολογική Περίοδος	Περιοχές έργου									
													Πελοπόννησος (Χερσαίο Τμήμα)	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Χερσαία Ζώνη)	Κρήτη (Χερσαίο Τμήμα)	Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)	Νότιο Κρητικό Πέλαγος	Νότιο Αιγαίο Πέλαγος	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια Ζώνη & LF5)	Πατραϊκός Κόλπος
										χωρίς τη μουσούδα. Εντοπίζεται συχνά από το χαρακτηριστικό έντονο κελάηδισμά του.												
<i>Riparia riparia</i>	Οχθοχελίδονο		II					LC/NE		Έχει παρατηρηθεί ότι το είδος προτιμά τα εδάφη με ασβεστούχο πηλό για να φωλιάσει. Το είδος απαντάται γενικά κοντά σε μεγαλύτερα υδάτινα σώματα, όπως ποτάμια, λίμνες ή ακόμα και στον ωκεανό, όλο το χρόνο.	Λίμνες	Μάρτιος - Ιούνιος		*								
<i>Saxicola rubetra</i>	Καστανολαίμης		II					LC/NE		ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΟ. Αυτό το είδος αναπαράγεται σε υγρά λιβάδια, βοσκοτόπια, βάλτους, ορεινά λιβάδια, πλαγιές που καλύπτονται από βραχώδεις λόφους, ρείκια, ξηρούς ή υγρούς ανοιχτούς θάμνους και στις παρυφές καλαμιώνων. Προτιμά γενικά τους διάσπαρτους θάμνους, τα δέντρα ή τις τεχνητές φωλιές, καθώς και εκτάσεις με χαμηλή βλάστηση με βότανα και γυμνές εκτάσεις για να αναζητήσει την τροφή του (για να φωλιάσει χρειάζεται επίσης θάμνους και εκτάσεις με βότανα).	Το είδος μπορεί να απαντηθεί σε ολόκληρη την περιοχή μελέτης κατά τη μετανάστευση του. Μπορεί επίσης να αναζητά την τροφή του στην παραλία, αν και θεωρείται πολύ απίθανο.	Μάρτιος - Ιούνιος	*	*						*		
<i>Saxicola torquatus</i>	Μαυρολαίμης		II					LC/NE		ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΟ. Αυτό το είδος αναπαράγεται σε υγρά λιβάδια, βοσκοτόπια, βάλτους, ορεινά λιβάδια, πλαγιές που καλύπτονται από βραχώδεις λόφους, ρείκια, ξηρούς ή υγρούς ανοιχτούς θάμνους και στις παρυφές καλαμιώνων. Προτιμά γενικά τους διάσπαρτους θάμνους, τα δέντρα ή τις τεχνητές φωλιές, καθώς και εκτάσεις με χαμηλή βλάστηση με βότανα και γυμνές εκτάσεις για να αναζητήσει την τροφή του (για να φωλιάσει χρειάζεται επίσης θάμνους και εκτάσεις με βότανα).	Το είδος μπορεί να απαντηθεί σε ολόκληρη την περιοχή μελέτης κατά τη μετανάστευση του. Μπορεί επίσης να αναζητά την τροφή του στην παραλία, αν και θεωρείται πολύ απίθανο.	Μάρτιος - Ιούνιος	*	*	*							
<i>Serinus serinus</i>	Σκαρθάκι		II					LC/NE		Αναπαράγεται στη νότια και κεντρική Ευρώπη και τη Βόρεια Αφρική. Οι πληθυσμοί των νότιων ακτών και του Ατλαντικού είναι σε μεγάλο βαθμό μόνιμοι, αλλά τα βόρεια πτηνά αναπαραγωγής	Δασικές εκτάσεις, καλλιέργειες	Μάρτιος - Ιούνιος	*	*	*							

Επιστημονική ονομασία	Κοινή ονομασία	ΠΔ 67/1981	Βέρνη	Βόνη	Σύμβαση της Βαρκελώνης	Οδηγία 92/43/ΕΟΚ	Οδηγία 2009/147/ΕΟΚ	IUCN/Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων ζώων της Ελλάδας	CITES	Οικολογία	Παρουσία εντός της Περιοχής Μελέτης	Ευαίσθητη Οικολογική Περίοδος	Περιοχές έργου											
													Πελοπόννησος (Χερσαίο Τμήμα)	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Χερσαία Ζώνη)	Κρήτη (Χερσαίο Τμήμα)	Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)	Νότιο Κρητικό Πέλαγος	Νότιο Αιγαίο Πέλαγος	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια Ζώνη & LF5)	Πατραϊκός Κόλπος		
										μεταναστεύουν νοτιότερα στην Ευρώπη για να διαχειμάσουν. Για την αναπαραγωγή του προτιμά τα ανοιχτά δάση και τις καλλιέργειες, συχνά με κάποια κωνοφόρα δέντρα. Φτιάχνει τη φωλιά του στους θάμνους ή τα δέντρα. Σχηματίζει σμήνη εκτός της αναπαραγωγικής περιόδου, μερικές φορές αναμειγμένα με άλλους σπίνους.														
<i>Sitta europaea</i>	Δεντροτοσποανάκο ς		II					LC/NE		Ο προτιμώμενος βιότοπός του είναι τα ώριμα φυλλοβόλα ή μικτά δάση με μεγάλα, υπεραιωνόβια δέντρα, κατά προτίμηση βελανιδιές. Τα ζευγάρια μένουν μόνιμα στο έδαφός τους και φωλιάζουν σε τρύπες δέντρων, συνήθως παλιές φωλιές δρυοκολάπτων, αλλά μερικές φορές και σε φυσικές κοιλότητες. Εάν η είσοδος στην τρύπα είναι πολύ μεγάλη, το θηλυκό την καλύπτει με λάσπη για να μειώσει το μέγεθός της και συχνά επικαλύπτει και το εσωτερικό της κοιλότητας. Τοποθετεί τα 6-9 λευκά αυγά του σε μια βαθιά βάση από πεύκο ή άλλα ροκανίδια.	Δάση φυλλοβόλων	Μάρτιος - Ιούνιος	*	*										
<i>Sitta neumayer</i>	Βραχοτοσποανάκο ς		II					LC/NE		Είναι ένα πουλί που κατοικεί σε γυμνούς βράχους, ειδικά σε ορεινές περιοχές. Όσα βρίσκονται στα υψηλότερα υψόμετρα μπορεί να μετακινηθούν χαμηλότερα τον χειμώνα. Τρέφεται με έντομα και αράχνες το καλοκαίρι, τα οποία συμπληρώνει με σπόρους και σαλιγκάρια τον χειμώνα. Αναζητεί την τροφή του στο έδαφος και σφηνώνει μεγαλύτερα αντικείμενα μέσα σε σχισμές στους βράχους χτυπώντας τα με το ισχυρό ράμφος του για να ανοίξουν. Επίσης, πιάνει μύγες στον αέρα.	Λιβάδια	Μάρτιος - Ιούνιος	*	*										
<i>Spatula clypeata</i>	Χουλιαρόπαπια						II	LC/NE		Κοινή και διαδεδομένη πάπια. Κατοικεί σε ανοιχτούς υγρότοπους, όπως υγρά λιβάδια ή έλη με μικρή αναδυόμενη βλάστηση.	Λίμνες	Μάρτιος - Ιούνιος		*										
<i>Spinus spinus</i>	Λούγαρο							LC/NE		Ο οικότοπός του είναι δασώδεις εκτάσεις σε συγκεκριμένο υψόμετρο σε πλαγιές βουνών και έχει συγκεκριμένη προτίμηση στις υγρές περιοχές. Για την αναπαραγωγή του, προτιμά δάση	Δάση κωνοφόρων	Μάρτιος - Ιούνιος		*										

Επιστημονική ονομασία	Κοινή ονομασία	ΠΔ 67/1981	Βέρνη	Βόνη	Σύμβαση της Βαρκελώνης	Οδηγία 92/43/ΕΟΚ	Οδηγία 2009/147/ΕΟΚ	IUCN/Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων ζώων της Ελλάδας	CITES	Οικολογία	Παρουσία εντός της Περιοχής Μελέτης	Ευαίσθητη Οικολογική Περίοδος	Περιοχές έργου									
													Πελοπόννησος (Χερσαίο Τμήμα)	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Χερσαία Ζώνη)	Κρήτη (Χερσαίο Τμήμα)	Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)	Νότιο Κρητικό Πέλαγος	Νότιο Αιγαίο Πέλαγος	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια Ζώνη & LF5)	Πατραϊκός Κόλπος
										κωνοφόρων, ιδιαίτερα ελάτης. Φτιάχνει τη φωλιά του σε δέντρα όπου γεννά 2-6 αυγά												
<i>Sterna hirundo</i>	Ποταμογλάρονο		II	II			I	LC/LC		Αναπαράγεται σε αποικίες ή μεμονωμένα τόσο στις ακτές όσο και σε εσωτερικά ύδατα (λίμνες, ποτάμια κ.λπ.). Καλοκαιρινός επισκέπτης (Απρ.-Οκτ.), διαχειμάζει στη Δ. και Ν. Αφρική. Τρώει ψάρια. Φτιάχνει τη φωλιά του ξύνοντας το έδαφος.	Λίμνες	Μάρτιος - Ιούνιος	*	*								
<i>Sternula albifrons</i>	Νανογλάρονο			II			I	LC/NT		ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΟ. Αναπαράγεται στις ακτές και τις εσωτερικές πλωτές οδούς της εύκρατης και τροπικής Ευρώπης και της Ασίας. Είναι έντονα μεταναστευτικό, διαχειμάζει στους υποτροπικούς και τροπικούς ωκεανούς μέχρι τη Νότια Αφρική και την Αυστραλία. Στις αρχές του 19ου αιώνα, το ναογλάρονο ήταν ένα κοινό πουλί των ευρωπαϊκών ακτών, ποταμών και υγροτόπων, αλλά τον 20ο αιώνα οι πληθυσμοί του στις παράκτιες περιοχές μειώθηκαν λόγω της απώλειας οικοτόπων, της ρύπανσης και της ανθρώπινης παρέμβασης.	Το είδος μπορεί να απαντηθεί σε ολόκληρη την Περιοχή Μελέτης. Μπορεί επίσης να αναζητήσει την τροφή του στην ακτογραμμή. Το πτηνό μπορεί να απαντηθεί και πάνω από ένα τμήμα της θαλάσσιας περιοχής μελέτης στο Νότιο Αιγαίο και τον Πατραϊκό Κόλπο.	Μάρτιος - Ιούνιος	*	*				*	*	*	*	*
<i>Streptopelia decaocto</i>	Δεκαοχτούρα							LC/NE		Πρόκειται για ένα πολύ κοινό είδος, που συναντάται σε αστικές περιοχές και καλλιέργειες	Εμφανίζεται εντός της περιοχής μελέτης	Μάρτιος - Ιούνιος	*	*								
<i>Streptopelia turtur</i>	Τρυγόνι		I				II	VU/NE		Το τρυγόνι, ένας από τους πιο όψιμους μετανάστες, σπάνια εμφανίζεται στη Βόρεια Ευρώπη πριν από τα τέλη Απριλίου, ενώ επιστρέφει ξανά στον νότο τον Σεπτέμβριο. Προτιμά τις ανοιχτές παρά τις πυκνές δασικές εκτάσεις και τρέφεται συχνά στο έδαφος. Περιστασιακά, φωλιάζει σε μεγάλους κήπους, συνήθως όμως είναι εξαιρετικά δειλό, πιθανώς λόγω της μεγάλης κυνηγετικής πίεσης που αντιμετωπίζει κατά τη	Αγροδασικές περιοχές, μεταβατικοί δασώδεις θάμνοι-δασικές εκτάσεις, σκληρόφυλλη βλάστηση Το είδος απαντάται σε ολόκληρη την Περιοχή Μελέτης.	Μάρτιος - Ιούνιος	*	*	*					*		

Επιστημονική ονομασία	Κοινή ονομασία	ΠΔ 67/1981	Βέρνη	Βόννη	Σύμβαση της Βαρκελώνης	Οδηγία 92/43/ΕΟΚ	Οδηγία 2009/147/ΕΟΚ	IUCN/Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων ζώων της Ελλάδας	CITES	Οικολογία	Παρουσία εντός της Περιοχής Μελέτης	Ευαίσθητη Οικολογική Περίοδος	Περιοχές έργου										
													Πελοπόννησος (Χερσαίο Τμήμα)	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Χερσαία Ζώνη)	Κρήτη (Χερσαίο Τμήμα)	Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)	Νότιο Κρητικό Πέλαγος	Νότιο Αιγαίο Πέλαγος	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια Ζώνη & LF5)	Πατραϊκός Κόλπος	
										μετανάστευση. Η πτήση του θυμίζει συχνά βέλος, αν και δεν είναι εντυπωσιακά γρήγορη.													
<i>Strix aluco</i>	Χουχουριστής							LC/NE	II	Αυτό το είδος απαντάται σε δάση φυλλοβόλων και μικτά δάση, και μερικές φορές σε ώριμες φυτείες κωνοφόρων, ενώ προτιμά τοποθεσίες με πρόσβαση στο νερό. Στις αστικές περιοχές, απαντάται συχνά σε νεκροταφεία, κήπους και πάρκα	Δάση	Μάρτιος - Ιούνιος	*	*									
<i>Sturnus vulgaris</i>	Ψαρόνι		III				II	LC/NE		Το ψαρόνι αναπαράγεται σε υποαρκτικούς υγροτόπους από τα Highlands της Σκωτίας έως όλη την Ευρώπη και την Ασία. Μεταναστεύει στην Αφρική, τη Νότια Ασία, ιδιαίτερα την Ινδία και την Αυστραλία. Αυτό το πουλί εντοπίζεται συνήθως σε γλυκά ύδατα κατά τη μετανάστευση και τον χειμώνα. Αναζητεί την τροφή του ανιχνεύοντάς την σε ρηχά νερά ή σε υγρή λάσπη και τρώει κυρίως έντομα και παρόμοια μικρά θηράματα. Φωλιάζει στο έδαφος ή χρησιμοποιεί μια εγκαταλελειμμένη παλιά φωλιά άλλων πουλιών, όπως η κεдрότσιχλα (Turdus pilaris), μέσα σε δέντρα. Γεννά τέσσερα ωχροπράσινα αυγά μεταξύ Μαρτίου και Μαΐου.	Εμφανίζεται εντός της περιοχής μελέτης	Μάρτιος - Ιούνιος	*	*									
<i>Sylvia atricapilla</i>	Μαυροσκούφης							LC/NE		ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΟ: Είναι δραστήριο είδος της οικογένειας των Συλβιδών που συνήθως συνδέεται με τα ανοιχτά δάση, τους θάμνους ή τους φράκτες. Η διατροφή του περιλαμβάνει κυρίως εντομοφάγα είδη.	Δασικές εκτάσεις	Μάρτιος - Ιούνιος	*	*									
<i>Sylvia borin</i>	Κηποτσιροβάκος							LC/NE		ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΟ: Είναι δραστήριο είδος της οικογένειας των Συλβιδών που συνήθως συνδέεται με τα ανοιχτά δάση, τους θάμνους ή τους φράκτες. Η διατροφή του περιλαμβάνει κυρίως εντομοφάγα είδη.	Δασικές εκτάσεις	Μάρτιος - Ιούνιος	*	*									
<i>Sylvia cantillans</i>	Μαυροπτέρι							LC/NE		ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΟ:	Δασικές εκτάσεις	Μάρτιος - Ιούνιος	*	*	*								

Επιστημονική ονομασία	Κοινή ονομασία	ΠΔ 67/1981	Βέρνη	Βόννη	Σύμβαση της Βαρκελώνης	Οδηγία 92/43/ΕΟΚ	Οδηγία 2009/147/ΕΟΚ	IUCN/Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων ζώων της Ελλάδας	CITES	Οικολογία	Παρουσία εντός της Περιοχής Μελέτης	Ευαίσθητη Οικολογική Περίοδος	Περιοχές έργου									
													Πελοπόννησος (Χερσαίο Τμήμα)	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Χερσαία Ζώνη)	Κρήτη (Χερσαίο Τμήμα)	Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)	Νότιο Κρητικό Πέλαγος	Νότιο Αιγαίο Πέλαγος	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια Ζώνη & LF5)	Πατραϊκός Κόλπος
										Είναι δραστήριο είδος της οικογένειας των Συλβιίδων που συνήθως συνδέεται με τα ανοιχτά δάση, τους θάμνους ή τους φράκτες. Η διατροφή του περιλαμβάνει κυρίως εντομοφάγα είδη.												
<i>Ferula communis</i>	Νάρθηκας							LC/NE		ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΟ: Είναι δραστήριο είδος της οικογένειας των Συλβιίδων που συνήθως συνδέεται με τα ανοιχτά δάση, τους θάμνους ή τους φράκτες. Η διατροφή του περιλαμβάνει κυρίως εντομοφάγα είδη.	Δασικές εκτάσεις	Μάρτιος - Ιούνιος	*	*	*							
<i>Sylvia crassirostris</i>	Μελωδοτσιροβάκ ος							LC/NE		ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΟ: Είναι δραστήριο είδος της οικογένειας των Συλβιίδων που συνήθως συνδέεται με τα ανοιχτά δάση, τους θάμνους ή τους φράκτες. Η διατροφή του περιλαμβάνει κυρίως εντομοφάγα είδη.	Δασικές εκτάσεις	Μάρτιος - Ιούνιος	*	*	*							
<i>Sylvia curruca</i>	Λαλοτσιροβάκος							LC/NE		ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΟ: Είναι δραστήριο είδος της οικογένειας των Συλβιίδων που συνήθως συνδέεται με τα ανοιχτά δάση, τους θάμνους ή τους φράκτες. Η διατροφή του περιλαμβάνει κυρίως εντομοφάγα είδη.	Δασικές εκτάσεις	Μάρτιος - Ιούνιος		*								
<i>Sylvia melanocephala</i>	Sylvia melanocephala							LC/NE		ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΟ: Είναι δραστήριο είδος της οικογένειας των Συλβιίδων που συνήθως συνδέεται με τα ανοιχτά δάση, τους θάμνους ή τους φράκτες. Η διατροφή του περιλαμβάνει κυρίως εντομοφάγα είδη.	Δασικές εκτάσεις	Μάρτιος - Ιούνιος	*	*	*							
<i>Sylvia nisoria</i>	Ψαλτοτσιροβάκος						I	LC/NT		ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΟ. Αναπαράγεται σε ψηλούς θάμνους με διάσπαρτα δέντρα στην ανοιχτή ύπαιθρο, αλλά και σε θαμνώδη ξέφωτα σε ανοιχτά δάση. Μοιράζεται τον οικότοπο, και συχνά το έδαφός του, με τον αετομάχο. Καλοκαιρινός επισκέπτης που μεταναστεύει σαν τον	Το είδος μπορεί να απαντηθεί σε ολόκληρη την περιοχή μελέτης κατά τη μετανάστευση του.	Μάρτιος - Ιούνιος						*	*	*	*	*

Επιστημονική ονομασία	Κοινή ονομασία	ΠΑ 67/1981	Βέρνη	Βόννη	Σύμβαση της Βαρκελώνης	Οδηγία 92/43/ΕΟΚ	Οδηγία 2009/147/ΕΟΚ	IUCN/Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων ζώων της Ελλάδας	CITES	Οικολογία	Παρουσία εντός της Περιοχής Μελέτης	Ευαίσθητη Οικολογική Περίοδος	Περιοχές έργου											
													Πελοπόννησος (Χερσαίο Τμήμα)	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Χερσαία Ζώνη)	Κρήτη (Χερσαίο Τμήμα)	Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)	Νότιο Κρητικό Πέλαγος	Νότιο Αιγαίο Πέλαγος	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια Ζώνη & LF5)	Πατραϊκός Κόλπος		
										κηποτσιροβάκο. Κατά τη μετανάστευσή του, διασχίζει τη Βρετανία, κυρίως την ανατολική ακτή (Αύγουστος-μέσα Οκτώβρη, σπάνια την άνοιξη). Του αρέσει να στήνει ενέδρα, ενώ κάποιες φορές παρατηρείται να πετάει ανάμεσα σε θάμνους.	Μπορεί επίσης να αναζητά την τροφή του στην παραλία, αν και θεωρείται πολύ απίθανο. Το πτηνό μπορεί να απαντηθεί και πάνω από ένα τμήμα της θαλάσσιας περιοχής μελέτης στο Νότιο Αιγαίο και τον Πατραϊκό Κόλπο.													
<i>Sylvia ruppeli</i>	Μουστακοτσιροβάκος						I	LC/NE		ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΟ: Είναι δραστήριο είδος της οικογένειας των Συλβιδίων που συνήθως συνδέεται με τα ανοιχτά δάση, τους θάμνους ή τους φράκτες. Η διατροφή του περιλαμβάνει κυρίως εντομοφάγα είδη.	Δασικές εκτάσεις	Μάρτιος - Ιούνιος	*						*					
<i>Tachybaptus ruficollis</i>	Νανοβουτηχτάρι							LC/VU		ΕΠΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟ. Αυτό το πουλί αναπαράγεται σε μικρές αποικίες σε περιοχές με έντονη βλάστηση και λίμνες γλυκού νερού σε όλη την Ευρώπη, μεγάλο μέρος της Ασίας μέχρι τη Νέα Γουινέα και το μεγαλύτερο μέρος της Αφρικής. Τα περισσότερα πουλιά μετακινούνται σε πιο ανοιχτά ή παράκτια ύδατα τον χειμώνα, αλλά είναι αποδημητικά μόνο σε εκείνα τα μέρη της εμβέλειάς τους όπου τα νερά παγώνουν. Εκτός της αναπαραγωγικής περιόδου, μετακινούνται σε πιο ανοιχτά ύδατα, ενώ περιστασιακά εμφανίζονται ακόμη και στην ακτή σε μικρούς κόλπους. Απαντώνται συνήθως σε ανοιχτά υδάτινα σώματα στο μεγαλύτερο μέρος της εμβέλειάς τους. Όπως όλα τα βουτηχτάρια, φωλιάζουν στην άκρη του νερού, αφού τα πόδια τους είναι πολύ πίσω και δεν μπορούν να περπατήσουν καλά.	Το είδος μπορεί να απαντηθεί σε ολόκληρη την Περιοχή Μελέτης. Μπορεί επίσης να αναζητήσει την τροφή του στην ακτογραμμή. Το πτηνό μπορεί να απαντηθεί και πάνω από ένα τμήμα της θαλάσσιας περιοχής μελέτης στο Νότιο Αιγαίο και τον Πατραϊκό Κόλπο.	Μάρτιος - Ιούνιος	*	*					*	*	*	*	*	*

Επιστημονική ονομασία	Κοινή ονομασία	ΠΑ 67/1981	Βέρνη	Βόννη	Σύμβαση της Βαρκελώνης	Οδηγία 92/43/ΕΟΚ	Οδηγία 2009/147/ΕΟΚ	IUCN/Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων ζώων της Ελλάδας	CITES	Οικολογία	Παρουσία εντός της Περιοχής Μελέτης	Ευαίσθητη Οικολογική Περίοδος	Περιοχές έργου											
													Πελοπόννησος (Χερσαίο Τμήμα)	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Χερσαία Ζώνη)	Κρήτη (Χερσαίο Τμήμα)	Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)	Νότιο Κρητικό Πέλαγος	Νότιο Αιγαίο Πέλαγος	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια Ζώνη & LF5)	Πατραϊκός Κόλπος		
<i>Tachymarptis melba</i>	Σκεπαρνάς							LC/NE		ΘΑΛΑΣΣΙΟ: Απαντώνται συνήθως σε ανοιχτά υδάτινα σώματα στο μεγαλύτερο μέρος της εμβέλειάς τους. Όπως όλα τα βουτηχτάρια, φωλιάζουν στην άκρη του νερού.	Το είδος μπορεί να απαντηθεί σε ολόκληρη την Περιοχή Μελέτης. Μπορεί επίσης να αναζητήσει την τροφή του στην ακτογραμμή.	Μάρτιος - Ιούνιος	*	*	*									
<i>Tichodroma muraria</i>	Σβαρνίστρα							LC/NE		Πουλί των ψηλών βουνών που αναπαράγεται σε υψόμετρα τα οποία κυμαίνονται μεταξύ 1.000 και 3.000 μέτρων	Λιβάδια	Μάρτιος - Ιούνιος	*											
<i>Tringa glareola</i>	Λασπότρυγγας		II	II			I	LC/LC		ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΟ: Αυτό το πουλί απαντάται συνήθως στο γλυκό νερό κατά τη διάρκεια της μετανάστευσης και της διαχείμασης. Αναζητεί την τροφή του ανιχνεύοντάς την σε ρηχά νερά ή σε υγρή λάσπη και τρώει κυρίως έντομα και παρόμοια μικρά θηράματα. Φωλιάζει στο έδαφος ή χρησιμοποιεί μια εγκαταλελειμμένη παλιά φωλιά άλλων πουλιών.	Το είδος μπορεί να απαντηθεί σε ολόκληρη την Περιοχή Μελέτης.	Μάρτιος - Ιούνιος	*											
<i>Tringa ochropus</i>	Δασότρυγγας		II	II				LC/NE		ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΟ: Αυτό το πουλί απαντάται συνήθως στο γλυκό νερό κατά τη διάρκεια της μετανάστευσης και της διαχείμασης. Αναζητεί την τροφή του ανιχνεύοντάς την σε ρηχά νερά ή σε υγρή λάσπη και τρώει κυρίως έντομα και παρόμοια μικρά θηράματα.	Το είδος μπορεί να απαντηθεί σε ολόκληρη την Περιοχή Μελέτης.	Μάρτιος - Ιούνιος			*									
<i>Tringa totanus</i>	Κοκκινোসκέλης			II				LC/NE		ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΟ: Αυτό το πουλί απαντάται συνήθως στο γλυκό νερό κατά τη διάρκεια της μετανάστευσης και της διαχείμασης. Αναζητεί την τροφή του ανιχνεύοντάς την σε ρηχά νερά ή σε υγρή λάσπη και τρώει κυρίως έντομα και παρόμοια μικρά θηράματα.	Το είδος μπορεί να απαντηθεί σε ολόκληρη την Περιοχή Μελέτης.	Μάρτιος - Ιούνιος	*	*										

Επιστημονική ονομασία	Κοινή ονομασία	ΠΔ 67/1981	Βέρνη	Βόννη	Σύμβαση της Βαρκελώνης	Οδηγία 92/43/ΕΟΚ	Οδηγία 2009/147/ΕΟΚ	IUCN/Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων ζώων της Ελλάδας	CITES	Οικολογία	Παρουσία εντός της Περιοχής Μελέτης	Ευαίσθητη Οικολογική Περίοδος	Περιοχές έργου									
													Πελοπόννησος (Χερσαίο Τμήμα)	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Χερσαία Ζώνη)	Κρήτη (Χερσαίο Τμήμα)	Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)	Νότιο Κρητικό Πέλαγος	Νότιο Αιγαίο Πέλαγος	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια Ζώνη & LF5)	Πατραϊκός Κόλπος
<i>Troglodytes troglodytes</i>	Τρυποφράχτης		II					LC/NE		Καταλαμβάνει διάφορα είδη οικοτόπων, συνήθως κάθε είδους καλλιεργούμενη ή ακαλλιεργητη έκταση με θάμνους και χαμηλή εδαφική κάλυψη, κήπους, φράχτες, αλσύλλια, φυτείες, δασικές εκτάσεις και καλαμιώνες. Κατοικεί σε πιο ανοιχτές τοποθεσίες με συστάδες από βατομουριές ή σχοίνους, τραχιά βοσκοτόπια, ρεικότοπους, πλαγιές με ογκόλιθους, βραχώδεις ακτές και θαλάσσιους βράχους.	Το είδος μπορεί να απαντηθεί σε ολόκληρη την Περιοχή Μελέτης.	Μάρτιος - Ιούνιος	*	*	*							
<i>Turdus merula</i>	Κότσυφας						II	LC/NE		Ο κότσυφας αναπαράγεται στην εύκρατη Ευρασία, τη Βόρεια Αφρική, τις Κανάριες Νήσους και τη Νότια Ασία. Κοινός στο μεγαλύτερο μέρος της εμβέλειάς του στις δασικές εκτάσεις, ο κότσυφας προτιμά τα φυλλοβόλα δέντρα με πυκνή χαμηλή βλάστηση. Ωστόσο, οι κήποι παρέχουν τον καλύτερο οικότοπο αναπαραγωγής με έως και 7,3 ζεύγη ανά εκτάριο (σχεδόν τρία ζεύγη ανά στρέμμα), ενώ στις δασικές εκτάσεις παρατηρείται συνήθως περίπου το ένα δέκατο αυτής της πυκνότητας και σε ανοιχτούς και πολύ δομημένους οικοτόπους ακόμη λιγότερο.	Το είδος μπορεί να απαντηθεί σε ολόκληρη την Περιοχή Μελέτης.	Μάρτιος - Ιούνιος	*	*	*							
<i>Turdus philomelos</i>	Κελαηδότσιχλα						II	LC/NE		Αναπαράγεται σε δάση, πάρκα και κήπους με πλούσια βλάστηση. Οι βόρειοι πληθυσμοί είναι αποδημητικοί και διαχειμάζουν στη Δ. και Ν. Ευρώπη. Αρκετά εξημερωμένο είδος. Τρέφεται με σαλιγκάρια, έντομα, σκουλήκια. Κρύβει καλά τη φωλιά του, π.χ. σε κισσούς, φράχτες, σε όχθες, η οποία μοιάζει με ένα κύπελλο καλυμμένο από βρύα με λείο γκρι εσωτερικό (από πηλό και σάπια ξύλα).	Το είδος μπορεί να απαντηθεί σε ολόκληρη την Περιοχή Μελέτης.	Μάρτιος - Ιούνιος	*	*								
<i>Turdus viscivorus</i>	Τσαρτσάρα							LC/NE		Το είδος απαντάται σε διάφορα είδη οικοτόπων όπου υπάρχουν δέντρα, συμπεριλαμβανομένων δασών, φυτειών, φραχτών και αστικών πάρκων. Στα νότια και ανατολικά της εμβέλειάς του, κατοικεί σε ορεινά δάση κωνοφόρων και η εμβέλειά του εκτείνεται	Το είδος μπορεί να απαντηθεί σε ολόκληρη την Περιοχή Μελέτης.	Μάρτιος - Ιούνιος	*	*								

Επιστημονική ονομασία	Κοινή ονομασία	ΠΑ 67/1981	Βέρνη	Βόννη	Σύμβαση της Βαρκελώνης	Οδηγία 92/43/ΕΟΚ	Οδηγία 2009/147/ΕΟΚ	IUCN/Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων ζώων της Ελλάδας	CITES	Οικολογία	Παρουσία εντός της Περιοχής Μελέτης	Ευαίσθητη Οικολογική Περίοδος	Περιοχές έργου										
													Πελοπόννησος (Χερσαίο Τμήμα)	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Χερσαία Ζώνη)	Κρήτη (Χερσαίο Τμήμα)	Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)	Νότιο Κρητικό Πέλαγος	Νότιο Αιγαίο Πέλαγος	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια Ζώνη & LF5)	Πατραϊκός Κόλπος	
										πάνω από την κύρια δεντροστοιχία όπου υπάρχουν αγριοκυπαρίσσια.													
<i>Tyto alba</i>	Τυτώ							LC/NE	II	Όπως οι περισσότερες κουκουβάγιες, έτσι και η τυτώ είναι νυκτόβια και στηρίζεται στην οξεία αίσθηση της ακοής της όταν κυνηγά στο απόλυτο σκοτάδι. Συνήθως δραστηριοποιείται πριν από το σούρουπο, αλλά μερικές φορές μπορεί να τη δει κανείς κατά τη διάρκεια της ημέρας όταν μετακινείται για να βρει άλλο μέρος να κουρνιάσει.	Το είδος μπορεί να απαντηθεί σε ολόκληρη την Περιοχή Μελέτης.	Μάρτιος - Ιούνιος	*	*	*								
<i>Urupa erops</i>	Τσαλαπετεινός							LC/NE		Ο τσαλαπετεινός έχει δύο βασικές απαιτήσεις για τον οικότοπό του: να έχει γυμνό ή ελαφρά φυτεμένο έδαφος στο οποίο μπορεί να αναζητήσει τροφή και κατακόρυφες επιφάνειες με κοιλότητες (όπως δέντρα, γκρεμούς ή ακόμα και τοίχους, φωλιές, θημωνιές και εγκαταλελειμμένα λαγούμια) στις οποίες μπορεί να φωλιάσει. Αυτά μπορεί να τα βρει σε διάφορα είδη οικοσυστημάτων, επομένως κατοικεί σε ένα ευρύ φάσμα οικοτόπων όπως ερείκη, δασώδεις στέπες, σαβάνες και λιβάδια, καθώς και σε ξέφωτα δασών.	Το είδος μπορεί να απαντηθεί σε ολόκληρη την Περιοχή Μελέτης.	Μάρτιος - Ιούνιος	*	*	*								
<i>Zapornia pusilla</i>	Νανοπουλάδα			II			I	LC/NE		ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΟ: Ο οικότοπος αναπαραγωγής του είναι οι εκτάσεις κύπερης στην Ευρώπη, κυρίως στα ανατολικά και σε ολόκληρη την Ασία. Φωλιάζει σε ξηρές τοποθεσίες μέσα σε υγρούς βάλτους με κύπερη. Αυτό το είδος είναι αποδημητικό και διαχειμάζει στην Αφρική και στη νότια Ασία.	Λίμνες, καλαμιώνες	Μάρτιος - Ιούνιος											
Υπόμνημα																							
- Δ/Υ: Δεν υφίσταται, μη διαθέσιμη πληροφορία. - ΠΑ 67/1981: Προεδρικό Διάταγμα περί προστασίας της αυτοφυούς χλωρίδος, και αγρίας πανίδος.																							

Επιστημονική ονομασία	Κοινή ονομασία	ΠΔ 67/1981	Βέρνη	Βόννη	Σύμβαση της Βαρκελώνης	Οδηγία 92/43/ΕΟΚ	Οδηγία 2009/147/ΕΟΚ	IUCN/Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων ζώων της Ελλάδας	CITES	Οικολογία	Παρουσία εντός της Περιοχής Μελέτης	Ευαίσθητη Οικολογική Περίοδος	Περιοχές έργου									
													Πελοπόννησος (Χερσαίο Τμήμα)	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Χερσαία Ζώνη)	Κρήτη (Χερσαίο Τμήμα)	Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)	Νότιο Κρητικό Πέλαγος	Νότιο Αιγαίο Πέλαγος	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)	Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια Ζώνη & LF5)	Πατραϊκός Κόλπος

- Σύμβαση της Βέρνης για τη διατήρηση της ευρωπαϊκής άγριας ζωής και των φυσικών οικοτόπων: Παράρτημα Ι – Αυστηρά προστατευόμενα είδη χλωρίδας | Παράρτημα ΙΙ – Αυστηρά προστατευόμενα είδη πανίδας | Παράρτημα ΙΙΙ – Προστατευόμενα είδη πανίδας.
- Σύμβαση της Βόννης για τη διατήρηση των αποδημητικών ειδών της άγριας πανίδας: Προσάρτημα Ι – Απειλούμενα αποδημητικά είδη | Προσάρτημα ΙΙ – Αποδημητικά είδη που διατηρούνται μέσω Συμφωνιών.
- Σύμβαση της Βαρκελώνης: Η περιοχή στην οποία εφαρμόζεται το παρόν Πρωτόκολλο θα είναι η περιοχή της Μεσογείου Θάλασσας όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Σύμβασης. Μεταξύ άλλων, η σύμβαση αποσκοπεί α) στην προστασία, διατήρηση και διαχείριση με βιώσιμο και περιβαλλοντικά ορθό τρόπο περιοχών ιδιαίτερης φυσικής ή πολιτιστικής αξίας, ιδίως με τη δημιουργία ειδικά προστατευόμενων περιοχών· β) στην προστασία, διατήρηση και διαχείριση απειλούμενων ή υπό εξαφάνιση ειδών χλωρίδας και πανίδας CITES – Σύμβαση διεθνούς εμπορίας ειδών της άγριας πανίδας και χλωρίδας που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν: Προσάρτημα Ι – Κάθε είδος που απειλείται με εξαφάνιση και που είναι ή θα μπορούσε να είναι αντικείμενο εμπορίου. Το εμπόριο των δειγμάτων των εν λόγω ειδών πρέπει να διέπεται από ιδιαίτερα αυστηρούς κανόνες, ώστε να μην απειλείται περισσότερο η επιβίωσή τους, και δεν πρέπει να επιτρέπεται παρά μόνο σε εξαιρετικές περιστάσεις| Προσάρτημα ΙΙ – α) Κάθε είδος το οποίο, αν και προς το παρόν δεν απειλείται κατ'ανάγκη με εξαφάνιση, θα μπορούσε να απειληθεί στο μέλλον αν το εμπόριο των δειγμάτων του είδους αυτού δεν υπαχθεί σε ιδιαίτερα αυστηρούς κανόνες, ώστε να αποφεύγεται η ασυμβίβαστη με την επιβίωσή τους εκμετάλλευση· και β) Ορισμένα είδη που πρέπει να υπαχθούν σε κανόνες ώστε το εμπόριο δειγμάτων των ειδών που περιλαμβάνονται στο στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου να τεθεί υπό αποτελεσματικό έλεγχο| Προσάρτημα ΙΙΙ – Κάθε είδος που ένα συμβαλλόμενο μέρος, στο πλαίσιο της δικαιοδοσίας του, ορίζει ότι το υπάγει σε κανόνες με σκοπό να εμποδίσει ή να περιορίσει την εκμετάλλευσή του, και ότι χρειάζεται τη συνεργασία άλλων συμβαλλόμενων μερών για τον έλεγχο του εμπορίου.
- Οδηγία 92/43/ΕΟΚ: Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας: Παράρτημα Ι – Τύποι οικοτόπων κοινοτικού ενδιαφέροντος / (*) Οικότοποι προτεραιότητας | Παράρτημα ΙΙ – Ζωικά και φυτικά είδη κοινοτικού ενδιαφέροντος των οποίων η διατήρηση επιβάλλει τον χαρακτηρισμό ειδικών ζωνών διατήρησης / (*) Είδη προτεραιότητας | Παράρτημα ΙV – Ζωικά και φυτικά είδη κοινοτικού ενδιαφέροντος που χρήζουν αυστηρής προστασίας | Παράρτημα V – Ζωικά και φυτικά είδη κοινοτικού ενδιαφέροντος των οποίων η απόσπαση από το φυσικό τους περιβάλλον και η εκμετάλλευση είναι δυνατό να ρυθμίζονται με διαχειριστικά μέτρα.
- Οδηγία 79/409/ΕΟΚ: Οδηγία του Συμβουλίου περί της διατηρήσεως των άγριων πτηνών: Παράρτημα Ι – Είδη που υπόκεινται σε ειδικά μέτρα διατήρησης σχετικά με τον οικότοπό τους, ώστε να εξασφαλισθεί η επιβίωση και η αναπαραγωγή τους στην περιοχή εξαπλώσεώς τους» | Παράρτημα ΙΙ – Είδη που είναι δυνατόν να θηρεύονται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η θήρα αυτών των ειδών να μην υπονομεύει τις προσπάθειες διατηρήσεως που αναλαμβάνονται στη ζώνη εξαπλώσεώς τους. Παράρτημα ΙΙΙ – Είδη των οποίων η πώληση, η μεταφορά προς πώληση, η κατοχή προς πώληση και η διάθεση προς πώληση ζωντανών ή νεκρών πτηνών και οιουδήποτε μέρους ή προϊόντος που προέρχεται από το πτηνό και που αναγνωρίζεται εύκολα απαγορεύονται, υπό τον όρο ότι τα πτηνά έχουν φονευθεί ή συλληφθεί νόμιμα ή έχουν με άλλο νόμιμο τρόπο αποκτηθεί.
- IUCN/Βιβλίο δεδομένων κινδύνου: Διεθνής Ένωση Προστασίας της Φύσης (International Union for Conservation of Nature) / Το κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων ζώων της Ελλάδας (2009): CR: Κρισίμως Κινδυνεύον| EN: Κινδυνεύον| VU: Ευάλωτο| NT: Σχεδόν Απειλούμενο| LR: Χαμηλότερου Κινδύνου | LC: Μειωμένου Ενδιαφέροντος | DD: Ανεπαρκώς γνωστό| NE: Μη αξιολογηθέν.

Εκπονήθηκε από: ASPROFOS και ECOMED, 2022